



BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XX XIV

F

51

NAPOLI

~~XXVII. IV. 5.~~
~~12. 3. 17. a 62~~
~~B. S. O. M.~~
N

XXXIV 7 51-52.

R E N A T I
D E S - C A R T E S
G E O M E T R I A .

E D I T I O T E R T I A ,

*Multis accessionibus exornata, & plus
alterâ sui parte adauctâ.*



*Primus inaccessum qui per tot sæcula verum
 Eruit è tetrìs longæ caliginis umbris,
 Mysta sagax, Natura tuus, sic cernitur Orbi
 Cartesius. Voluit sacros in imagine vultus
 Jungere victuræ artificis pia dextera famæ,
 Omnia ut aspicerent quem sæcula nulla tacebunt.*

CONSTANTINI HUGENII F.¹²



GEOMETRIA,
à
RENATO DES CARTES

Anno 1637 Gallicè edita; postea autem
Vnà cum NOTIS

FLORIMONDI DE BEAUNE,

In Curia Blesensi Consilarii Regii, Gallicè conscriptis in
Latinam linguam versa, & Commentariis illustrata,


Operâ atque studio

FRANCISCI à SCHOOTEN,

in Acad. Lugd. Batava Matheseos Professoris.

*Nunc demum ab eodem diligenter recognita, locupletioribus Commen-
tariis instructa, multisque egregiis accessionibus, tam ad ulteriorem
explicationem, quam ad ampliandam hujus Geometriae
excellentiâ facientibus, exornata,*

Quorum omnium Catalogum pagina versa exhibet.



AMSTELÆDAMI,
Ex Typographia BLAVIANA, MDC LXXXIII.
Sumptibus Societatis.

C A T A L O G V S

corum,

Quæ hoc Opere continentur.

RENATI DES CARTES Geometria, tribus libris comprehensa.

FLORIMONDI DE BEAVNE in illam NOTÆ BREVES.

FRANCISCI à SCHOOTEN in eandem Commentarii recogniti & aucti.

— Ejusdem APPENDIX, de Cubicarum Æquationum Resolutione.

— item ADDITAMENTVM, in quo continetur solutio artificiosissima difficilis cujusdam Problematis; & Generalis Regula de extrahendis quibuscunque Radicibus Binomiis.

JOHANNIS HVDDENII Epistolæ duæ, quarum altera de Æquationum Reductione, altera de Maximis & Minimis agit.

HENRICI VAN HEVRAET Epistola, de Curvarum Linearum in Rectas transmutatione.

FRANCISCI à SCHOOTEN Principia Matheſeos Vniuersalis, seu Introductio ad CARTESIANÆ GEOMETRIÆ Methodum.

FLORIMONDI DE BEAVNE duo Tractatus posthumi. Alter de Natura & Constitutione, alter de Limitibus Æquationum.

JOHANNIS DE WITT de Elementis Curvarum Linearum libri duo.

FRANCISCI à SCHOOTEN Tractatus de concinnandis Demonstrationibus Geometricis ex Calculo Algebraico.

S E R I E.

SERENISSIMÆ PRINCIPI
ELISABETHÆ.
FRIDERICI BOHEMIÆ REGIS,
Comitis Palatini, & Electoris Sacri Ro-
mani Imperii, Filix natu maximæ:

SERENISSIMA PRINCEPS,



Vm ea Celsitudinis tuæ
sit claritas, ut maximo-
rum hominum monu-
menta, tanti nominis
splendore illustrata, in
lucem jam pridem prodierint; quid
mirum, si & ego lucubrationes haf-
ce Celsitudini tuæ consecrandas ef-
se duxerim? Nam, ut reliquas vir-
tutes, quæ in Te eximiæ sunt, ta-
ceam, tantâ cum prudentiâ singu-
laris ingenii tui perspicacia conjun-

E P I S T O L A

cta est , ut , spretis illis artibus & scientiis , quæ inanis potiùs gloriæ , altercandique studio , quàm veri inquisitionis causâ addiscuntur , eas solas amplexa fueris , quæ placidè philosophantes , nihilque nisi evidens admittentes , continuâ simplicium rationum serie ad abstrusissimarum rerum cognitionem perducunt. Vnde fieri non potuit, quin ad sublimem illam sapientiam, quam in Te suspicimus ac veneramur , felicissimè tempore brevissimo perveneris. Singularem tuum in Mathematicis profectum non est quòd hic commemorem; cum majorum tuorum exemplo , laudatissimæque memoriæ Principum , qui sanguinis vinculo tibi fuère juncti , atque ex
harum

DEDICATORIA.

harum artium cultura immortalem sibi gloriam reportarunt, eas non minùs colas, quàm hæreditatis jure in iisdem excellas. Quippe quæ in earum adyta ita penetrafti, ut Artem Analyticam, ipsam in Mathematicis inveniendi viam, in qua ingenii præsertim acumen requiritur, optimè cognoveris, eaque ratione, quantum incomparabilis ingenii tui industria præstare valeat, satis superque ostenderis. Quæ cum ita sint, atque insuper in me ipso compertum habeam, quanto favore Matheseos cultores prosequaris; jure meritissimo effecère, ut publicum hoc tanti beneficii, tantorumque meritorum tuorum testimonium extare vellem, atque hoc quaecun-

EPISTOLA DEDICATORIA.

lecuque, five grati animi monu-
mentum, five observantiæ in Cel-
situdinem tuam meæ pignus, offer-
rem. Quod, ut solito favore exci-
piat, submisè rogo,

SERENISSIMÆ CELSITVDINIS TVÆ

Dabam Leydæ, xii Cal. Julii
Anni cId Idc xlix.

Devotissimus cliens

FR. à SCHOOTEN.

FRAN-

LECTORI

S.

Novernium est, & quod excurret, Benevole Lector, cum Geometria hac Nobilissimi atque incomparabilis Viri RENATI DES CARTES, quam vernaculâ linguâ anno 1637 inter Philosophia sua specimina in lucem edidit, è Gallica a me in Latinam linguam versa commentariisque illustrata primum prodit. Interea autem temporis cum operam, quam hoc in negotio collocâram, Viris literatis & ingeniosis pluribus, quos stupenda Auctoris nostri eruditio latere non potuit, haud ingratam fuisse compererim; non potui non, distractis exemplaribus, cum novam editionem Typographus adornaret, quin honesta ipsius petitioni locum darem, eaque flagitanti concederem, qua ad Operis huius commendationem illustrare vel addere valebam. Quid hic autem nunc demum praestuerim, sic candido Lectoris iudicio relinquam, facile ex utriusque editionis inter se collatione dignoscei. Cujus etiam laboris nunquam me penituit, tum quod regiam hic ad pauciora universa Matheseos adyta viam, quam cuique ingredi licet, patere sciebam, tum quod hanc summi Viri Geometriam publici interesse, & è reorum fore, qui Mathematicis operam dant, in me ipso cum aliis strenuis Methodi nostra cultoribus, non sine voluptate indies experiebar. Verum enimvero cum illius utilitas tanta sit ut, si eam vel paucis describerem, pagina, quae praefationi hic interservient, deficerent, indicasse suffecerit, vix quicquam in universa Mathesi ita difficile aut arduum occurrere posse, quò non inoffenso pede per hanc Methodum penetrare liceat, quodvè Geometria huius legibus non subjici solvique possit. Accedit, quòd nullis Problematum finibus aut numero coercetur, sed fructum, qui vel à Veterum Analysis vel à Recentiorum Algebra expectandus erat, omnem in se contineat, nec quicquam hic desiderari posse videatur; atque adeò frustra sit, quod de aliâ sibi quis exoptandâ Methodo, ad Matheseos culturam perfectionemque in

**

post-

P R A E F A T I O

posterum cogitet. Quippe hac illa est, cuius exercitio Author mentem excolendo, non modo in Mathematicis Scientiis summas difficultates adolescens adhuc superavit, aliusque in inveniendo palmam praeipuit; sed tantam quoque ingenii promptitudinem facilitatemque sibi deinceps conciliavit, ut primus clavem, quâ mysteria Universi referenda sunt, & cuius ope natura naturae ac lux orbi magis magisque reddatur, invenerit: adeo ut eorum, quae lumine naturali cognosci queunt, nihil tam abditum, densisque immersum fuisse tenebris, putandum sit, quod ingenii sui felicitate erueret ipse defferrasset. Versionem quod attinet, cum fidelissimus ubique verborum interpret, salvo rerum pondere, esse studuerim, vix est, quod censuram aliquorum metum; praesertim ubi illam ab Authore, cui pro jure integrum fuit suum ubique sensum vel interpretari vel clariorem reddere, postea recognitam fuisse scriberint. Verum cum hac Geometria à paucis, cum propter eruditam brevitatem, tum propter quaestionum, quae inibi petraebantur, difficultatem, non sine abstrusa attentione, ac indefesso studio per se intelligi potuerit, periculum erat, ne laborum impatientes Lectores, cum metam vel ipsi ignorarent, vel improbi negarent, arenam desererent. Conscius itaque ego illam non in eum finem ab Authore conscriptam esse, quasi ipsius Methodum ex ea unusquisque quam facillime haurire posset, sed tantum ut eximia aliquot ejus specimina ederet: opere pretium duxi in commune consilere, & difficiliora loca passim à me explicata uberioribus hinc inde exemplis altius illustrare. Scopum Authoris quod spectat, cum hoc loco exponere haudquaquam duxi necessarium, cum cujusque libri argumentum commentarius meus praemisero, veterumque circa Geometria Problemata opiniones ac decreta, scitu non injucunda, ibidem explicaverim, quò operis summam atque adeo commentariorum nostrorum usum breviter complecterer. Porro ne quid deesse videretur, unde hac Geometria majorem adhuc lucem sortiretur, addita etiam sunt Notae à Clarissimo atque Amplissimo Viro D. FLORIMONDO DE BEAUVNE, Consiliario Blesensi, in eandem olim Gallicè conscriptae. Quae eodem modo in Latinam linguam à me translatae, postquam huic Geometria primò ejus permissu essent annexae, dein ab ipso recognitae & emendatae, nunc denno vel hoc nomine, ni fallor, acceptiores sunt accessurae. Praeterea, quò unusquisque institutus sit, quibus ad adyta ejus Methods perducatur, se ad ipsam Geometriam legendam accingere possit; haud omittendum duxi, quin simul.

AD LECTOREM.

simul Introductionem nostram, quam Kir Clarissimus, mihiq; amicusissimus, D. ERASMIUS BARTHOLINUS, nunc Medicina & Mathematicos in Academia Hafniensi Professor Regius, in eum finem olim conscripsit ac anno 1651 publici juris fecit, prout illam uterque jam demum recognovimus, editioni huic adjungerem. Quo quidem negotio futurum spero, ut, quod proprius condimus horreus, ex aliena non opus sit messe emendicare, licet Auctor antebac, tum ad suam Geometriam intelligendam Lectorem in alia Geometria libris jam versatum praeassupposuerit, nequa inibi dila sunt & demonstrata repetere cogere; tum etiam ad suam Methodum addiscendam leviozem vulgaris Algebra cognitionem requisiverit. Nec enim video, quid impresentiarum, post medicrem in Arithmetica & Geometria elementis exercitationem, calculique, eadem Introductione explicati, notitiam, Lectori moram injicere possit, quo minus inoffenso pede ad hanc Geometriam accedat. Et quanquam optandum fuisset, hec omnia ab Autore ipso fuisse praestita; quippe qui tantum regulas sua Methodi maxime necessarias hic exposuit; attamen quia animadvertit laborem atque industriam, quam Lector in investigandis reliquis, demonstrandisque is, quae tantum intento digito indicavit, impenderet, praecipuum esse in hac Scientia, quo cujusque ingenium excolatur: a semetipso impetrare non potuit, ut ea fusius pertraheret. Hunc cum successu temporis inter eos, quibus hanc Geometriam sedulo versare ejusque arcana penitissime rimari cordi fuit, non pauci reperti sint, qui, Auctoris vestigiis arte insistentes, praeflora multa, ad excellentiam illius Methodi plurimum facientia, invenerint, omnesque inter, praecopia inventorum eorumque dignitate, subtilissimus ac praestantissimus D. IOHANNES HVDDENIVS, Amstelodamensis, amicus meus integerrimus, primas facile obtineat: visum fuit ea, quae ab ipso de Aequationum Reductione ac de Maximis & Minimis, maximam partem Belgice conscripta, inter alia per literas mihi sunt communicata, postquam a me Latine essent reddita, Geometria huic pariter subiungere. Quibus tanquam colophonem addere placuit Epistolam, quam acutissimus, mihiq; ut HVDDENIO nostro conjunctissimus, D. HENRICVS VAN HEVRAET, Harlemensis, Salmutio nuper ad me transmisit. In qua cum brevem exponat Methodum, inter peregrinandum a se novissime excogitatam, transmu-

P R A E F A T I O

randi complures curvas lineas in rectas, quod ipsum à nemine (quantum novi) in hunc usque diem ostensum est, quin inio à multis ut insolubile habitum: id mihi agendum putavi, ne eximium adeo inventum occultaretur, ut, impetrato ad id ejus consensu, illud hic loci in lucem producerem. Eadem ratione ductus, ne sparta, quam Vir Amplissimus, nunc pia memoria, D. DE BEAUNE in excolenda propagandaque hujus Geometria Methodo susceperat, præcipiti ejus fato interiret; ex officio atque publica Matheseos amantium utilitate fore existimavi, si Clarissimum Virum D. ERASMIUM BARTHOLOMÆUM nostro rogatu adigerem, ut, qua de Natura, Constitutione, ac Limitibus Aequationum D. DE BEAUNE vernaculâ suâ linguâ in lucem dare constituerat, cum in manus ipsius incidissent, publico non invideret. Nec frustra in eo fui, nactus enim sum, ut, qua ex ejus adversariis, non sine indefesso labore ac difficili fortuna, ad umbilicum perduxerat, Latine redderet, nobisque, quò unâ cum his à me typis mandarentur, concederet. Caterùm ad Artis Analytica præstantiam uberius exhibendam, & ad meum rei literaria inserviendi studium comprobandum, non abs re fore judicavi, si Geometriam hanc non modò fortè illo posthumo ac advenâ, sed alio etiam primogenito eoque indigenâ adangere satagerem; nisi fortè hunc alium quoque posthumum ac advenam dixeris, eo nomine atque intuitu, quòd parens jam totus Reipublica vivat, nobisque & studiis nostris civiliter mortuus, & quasi peregrinus factus sit. Etenim cum aliquot abhinc mensibus occasio mihi data fuerit, ut in eum quem de Locorum Planorum & Solidorum per Artem Analyticam inventionem tractatum Nobilissimus atque Amplissimus Vir D. IOHANNES DE WITT, Consiliarius & Pensionarius, sive minister primarius Hollandia West-Frisiaque, concinnaverat, opportunus inciderim: non potui non, cum Authoris permissa inspicendi potestas mihi facta esset, quin sententiam, quid de illo videretur, rogatus, coram lubens exponerem. Hunc itaque quia admodum sublimem, tantoque Viro dignâ ingeniositate conscriptum, ac insuper ad penitiorem hujus Geometria intellectum haud parum facere posseprehenderam, (quippe qui subtilissimam illam de Locis materiam, in secundo Geometria libro paulo succinctius pertractatam, de integro resumit, alioque pacto componit:) consul-

tum duxi, ut in publicum emolumentum editionis adornanda auctor essem. At verò facile praevidebam, saltem suprema, quibus funguntur, Reipublica munera, gravesque hominis curas, impedimento fore, quo minus tam splendida proles, quae jam ante decennium formata in conceptu huc usque deliuerat, absque obstetricis auxilio, in lucem unquam produceretur. Quocirca cum eam mei juris facere non dedignatus fuerit, neque etiam copiam eorum, quae de Elementis Curvarum Linearum jam pridem conscripsit, mihi facere recusaverit: rem ubique gratam me facturum credidi, si tam hunc quam illum tractatum ab ulteriori oblivione vindicandi operam darem; praesertim cum id iis, qui Mathematicis serio excolunt, acceptum fore perspexerim, quod curvarum primi generis ortum longè simplicius generaliusque ab ipso quam à veteribus, absque ulla solidi consideratione, inspectum fuisse, reperturi sint. Quas itaque curvas eà ratione pertractavit, ut non solum inde dimanet ortus secundi generis curvarum (quas quidem omnes simili methodo in plano delineavit ac per species distinxit,) verum etiam ulteriorum graduum curva sponte quasi ex eodem fonte fluant atque deriventur. Futurum speravi, ut si primitia hujus factus ad illas viam sternentes opera mea in lucem emitterentur, iisque extrema imponeretur manus, quilibet judicaturus sit, & Litteratorum commodo, & hujus Viri otio in absolvendis, quae de Super-solidis Locis adinvenit, omni nisu à me fuisse consultum ac prospectum. Denique ut Methodi hujus Geometria dignas splendorque omni ex parte in aperto esset, & cuique etiam pateret ejusdem calculi demonstrationes quoque Geometricas inniti aut ex eo elici posse, quales à Veteribus introducta adhuc apud Recentiores passim in usu sunt, atque longà propositionum serie ac lemmatum permixtione afferti solent, continua schematum animadversioni obnoxia: placuit coronidis loco & in operis complementum subnectere tractatum, in quo artem, iisdem Veteribus in difficultiorum hujusmodi demonstrationum compositione usitatum, occasione diversarum questionum, exponerem. ut, scilicet, his similibusque exemplis viam praenndo, non tantum ejusmodi demonstrationes alias ex calculo facile depromi ostenderem; verum etiam hoc pacto inventionis modum, quem in majorem admirationem suorum inventorum artificiose suppresserant, indicarem, atque Mathematicos studiosos ad hujus Methodi calculum cens

PRÆFATIO AD LECTOREM.

demonstrationum amussim, omni ambage ac ingenii defatigatione evitata, ablegarem. Quibus quidem omnibus, si singulis satisfacere non licet, habeo saltem de quo abunde mihi gratuler, quod nostros in hoc studiorum genere labores rerum aestimatoribus haud displicuisse nec displicere sciam. Vale. Scripsi Leida, anno reparata salutis MDCLIX.



INDEX MATERIARVM, IN HAC G E O M E T R I A C O N T E N T A R V M.

LIBER I.

De Problematis, quæ construi possunt;
adhibendo tantum rectas li-
neas & circulos.

- Q**uomodo computatio Arithmetica
referatur ad operationes Geome-
tricas. Pag. 1
Quomodo Geometricè fiat Multiplicatio, Di-
visio, & radicis Quadrata Extractio. 2
Quo pacto notis uti liceat in Geometria. ib.
Quomodo ad Equationes perveniendum sit,
quæ resolvendis Problematis inserviunt. 4
Quenam sint Problemata Plana, & quo-
modo ipsa resolvantur. 5 & 6
Quæstio desumpta ex Pappo. 7
Responsum ad Questionem Pappi. 11
Quomodo pœundi sint termini in hac Que-
stione, ut ad Equationum deveniatur. 13
Quo pacto cognoscatur Problema hoc esse
planum, quando illud in quinque tan-
tum lineis est propositum. 15

LIBER II.

De natura linearum curvarum.

- Q**uenam sint curvæ lineæ, quæ in Geo-
metriam recipi possunt. 17
Ratio distinguenda eas in septa genera: Et
cognoscendi relationem, quæ omnia il-
larum puncta habent ad puncta linea-
rum rectarum. 21
Continuatio explanationis Questionis, quæ
precedenti libro ex Pappo, ut allata. 24
Solutio hujus Questionis, cum ipsa in 3 aut
4 tantum lineis est proposita. 25
Demonstratio ejusdem solutionis. 32
Quid intelligendum sit per loca Plana, &
Solida: Et ratio ipsa inveniendi. 34

Quenam sit prima & simplicissima linea-
rum curvarum, Veterum Questioni in-
servientium, cum ipsa Quæstio in 5 li-
neis est proposita. 35

Quenam curvæ lineæ in Geometriam sint
recipiendæ, quæ describuntur, inveniendæ
plura earum puncta. 38

Quam etiam illa sint, quæ opo sibi descri-
buntur, & ibidem recipi possunt. 39

Quid, ad inveniendum omnes linearum
curvarum proprietates, sufficiat scire re-
lationem, quam omnia illarum puncta
habent ad puncta linearum rectarum, &
modum ducendi lineas rectas; quæ ipsas
secant in omnibus illis punctis ad angu-
los rectos. 40

Modus generalis inveniendi lineas rectas,
quæ secant datas curvas, vel earum con-
tingentes, ad angulos rectos. ibid.

Exemplum hujus operationis in Ellipsi; Et
in Parabola secundi generis. 41 & 42

Aliud exemplum in Ellipsi secundi ge-
neris. 42

Exemplum constructionis hujus Problema-
tis in Conchoide. 49

Explicatio quatuor generum novarum O-
valium, Optica inservientium. 50

Proprietates harum Ovalium, concernentes
reflexiones & refractiones. 55

Demonstratio harum proprietatum. 57

Quomodo vitrum sibi possit, cujus una su-
perficie tam convexa aut concava sit,
quàm hinc erit, quod radius omnes, qui
ex uno dato puncto prodeunt, colligat
rursus in altero dato puncto. 61

Quomodo aliquid sibi possit, quod idem præ-
stet, cujus convexitas unius superficiei
datam rationem habeat ad concavitatem
vel concavitatem alterius. 63.

Quæ-

Quomodo id omne, quod hic de lineis curvis, in plana superficie descripsis, dictum fuit, applicari possit ad illas, quae describuntur in spatio trium dimensionum sive superficie aliqua curva. 65.

LIBER III.

De constructione Problematum Solidorum, & Solida excedentium.

Quoniam curva linea adhiberi possint ad constructionem cujusque Problematis. 67

Exemplum concernens inventionem plurium mediarum proportionalium. ibid.

De natura Aequationum. 69

Quot haberi possint radices in qualibet Aequatione. ibid.

Quoniam sint falsae radices. ibid.

Quomodo diminui possit dimensionem numerus alicujus Aequationis, quando cognoscitur aliqua ex ejus radicibus. ibid.

Qua ratione indagari queat, non data quantitas sit valor alicujus radicis. 70

Quot haberi possint verae radices in qualibet Aequatione. ibid.

Quomodo faciendum sit, ut falsae radices Aequationis evadant verae, & verae falsae. ibid.

Quomodo augeri vel diminui possint Aequationis radices, ipsis non cognitis. 71

Quid, augendo veras radices, falsae diminiuntur, & contra. 72

Qua ratione secundus terminus Aequationis tolli possit. ibid.

Quo pacto fiat ut falsae radices Aequationis evadant verae, nec tamen verae fiant falsae. 74

Quomodo faciendum sit, ut loca omnia Aequationis sint completa. ibid.

Quomodo multiplicari vel dividi possint Aequationis radices, ipsis incognitis. 75

Qua ratione fracti numeri alicujus Aequationis reducantur ad integros. ibid.

Quo pacto quantitas cognita alicujus terminus Aequationis aequalis fiat cuicunque alteri datae. 76

Quod radices tam verae quam falsae possint esse reales, vel imaginariae. ibid.

Reductio Aequationum Cubicarum, cum Problema est Planum. ibid.

Modus dividendi Aequationem per binomium, quod illius consistit radicem. 77

Quoniam Problemata sint Solida, Aequatione existente Cubica. 79

Reductio Aequationum quatuor dimensionum, cum Problema est Planum. Et quoniam illa sint, quae Solida sunt dicenda. ibid.

Reductio Aequationis Quadrato-quadratae ad Cubicam. ibid.

Exemplum ostendens usum huiusmodi reductionum. 8a

Regula generalis reducendi Aequationes omnes, quae Quadrato-quadratum excedunt. 84

Modus generalis construendi omnia Problemata Solida, reducta ad Aequationem trium, quatuorve dimensionum. 85

Inventio duarum mediarum proportionalium. 91

Ratio dividendi angulum in tres partes aequales. ibid.

Quod omnia Solida Problemata reduci possint ad hasce duas constructiones. 92

Modus exprimendi valorem radicem omnium, Aequationum Cubicarum, ac per consequens illarum omnium, quae Quadrato-quadratum non excedunt. 94

Cum Problemata Solida construuntur non possint absque sectionibus Conicis, nec quae magis composita sint sine aliis lineis, magis compositis. 96

Modus generalis construendi Problemata omnia, reducta ad Aequationem, sex dimensionum non excedentem. 97

Inventio quatuor mediarum proportionalium. 104.

RENATI DESCARTES GEOMETRIÆ

LIBER PRIMVS.

De Problematibus, quæ construi possunt, adhibendo tantum rectas lineas & circulos.



Mnia Geometriæ Problemata facile ad hujusmodi terminos reduci possunt, ut deinde ad illorum constructionem, opus tantum sit rectarum quarundam linearum longitudinem cognoscere.

Et quemadmodum Arithmetica tota ex quatuor aut quinque solummodo operationibus constat, quæ sunt Additio, Subtractio, Multiplicatio, Divisio, & Radicum Extractio, (quæ pro quadam Divisionis specie haberi potest:) Ita similiter in Geometria, quod spectat ad lineas, quæ quærentur, præparandas, ut cognitæ fiant, aliud faciendum non est, quam ut vel ipsis addantur, vel ab iisdem subtrahantur aliæ; vel etiam si una sit, (quæ vocetur unitas, ut eodemmodi ad numeros referatur, quamque communiter pro libitu assumere licet) atque præter hanc adhuc aliæ duæ, ut ad ipsas inveniatur quarta, quæ sit ad alterutram, ut est altera ad unitatem, quod idem est, atque Multiplicatio; vel ut per ipsas inveniatur quarta, quæ sit ad unam ex illis duabus, ut unitas ad alteram, quod convenit cum Divisione; vel denique, ut inter unitatem & aliam quandam rectam inveniatur una, aut duæ, plu-

Quomodo computatio Arithmetica referatur ad operationes Geometricas.

A

B, C

D

E


A

rescve

*Quomodo
Geometrice fiat.*

*Multipli-
catio.*

resve mediæ proportionales, quod idem est, quod radicis Quadratæ, aut Cubicæ, &c. extractio. Neque enim hosce Arithmetices terminos, ut facilius intelligi possim, in Geometriam introducere verebor.




Sit, exempli gratiâ, A B unitas, oporteatque multiplicare B D per B C : jungo puncta A & C, ductâque D E parallelâ A C, erit B E productum hujus multiplicationis.

Divisio.

Vel si dividenda sit B E per B D, junctis punctis E & D, duco A C parallelam ipsi D E, eritque B C quotiens hujus Divisionis.

*Extractio
radicis
Quadratæ.*



Vel denique si ex G H extrahere oporteat radicem Quadratam, adjungo ipsi in directum lineam rectam F G, quæ unitas est; divisâque F H bifariam in puncto K, centro K interval-

lo F K seu K H describo circulum. quo facto, erit G I, quæ ex puncto G perpendicularis ducitur super F H usque ad I, radix quæsitâ.

*Quo pacto
notis uti
liceat in
Geometria.*

Nihil hîc de radice Cubicâ, nec de aliis dico, quòd de iis in sequentibus commodius sim acturus.

At verò sæpe non est opus, hæce lineas ita in charta ducere, sed sufficit illas litteris quibusdam designare, singulas singulis. Ut ad addendam lineam B D lineæ G H, voco unam a & alteram b , scriboque $a + b$; Et $a - b$, ad subtrahendam b ex a ; Et $a b$, ad multi-

tiplicandam unam per alteram ; Et $\frac{a}{b}$, ad dividendam a per b ; Et aa , seu a^2 , ad multiplicandam a in se ; Et a^3 , ad eandem adhuc semel multiplicandam per a , atque ita in infinitum ; Et $\sqrt{a^2 + b^2}$, ad extrahendam radicem Quadratam ex $a^2 + b^2$; Et $\sqrt[3]{C.a^3 - b^3 + abb}$, ad extrahendam radicem Cubicam ex $a^3 - b^3 + abb$, & sic de cæteris.

Vbi notandum est, quòd per a^2 vel b^3 , similesve, communiter, non nisi lineas omnino simplices concipiam, licèt illas, ut nominibus in Algebra usitatis utar, Quadrata aut Cubos, &c. appellem.

Deinde etiam notandum, quòd omnes ejusdem lineæ partes, quando unitas in quæstione non est determinata, æque-multis semper dimensionibus exprimi debeant, ut hîc a^3 tot habet dimensiones, quot abb , aut b^3 , ex quibus composita est linea, quam nominavi $\sqrt[3]{C.a^3 - b^3 + abb}$; Sed hoc non est necesse, cùm unitas determinata existit, quoniam illa ubique subintelligi potest, ubi vel nimis multæ, vel nimis paucae dimensiones reperiuntur. Vt si radix Cubica sit extrahenda ex $aaabb - b$, cogitandum est, quantitatem $aaabb$ semel divisam esse per unitatem, atque alteram quantitatem b bis per eandem esse multiplicatam.

Cæterùm ut quis facîle linearum nominum recorderetur, oportet semper illa in catalogum referre, prout supponuntur vel mutantur, scribendo exempli causâ

$AB \propto 1$, hoc est, AB æqualis est 1, seu unitati.

$GH \propto n$

$BD \propto b$, &c.

Resoluturus igitur aliquod Problema, considerabit illud primâ fronte, ut jam factum, nominaque imponent lineis omnibus, quæ ad constructionem ipsius necessarium

A 2

cessa-

G
Quomodo
ad Equa-
tiones per-
uenien-
dum

*fit, quæ re-
solvendis
Proble-
matis in-
serviunt.*

cessariæ videbuntur, tam iis, quæ incognitæ sunt, quàm quæ cognitæ. Deinde nullo inter lineas hæscæ cognitæ & incognitas facto discrimine, evolvenda est Problematis difficultas, eo ordine, quo omnium naturalissimè pateat, quâ ratione dictæ lineæ à se invicem dependant, donec inventâ fuerit via eandem quantitatem duobus modis exprimendi, id quod Æquatio vocatur; æquales enim sunt termini modi unius terminis modi alterius. Iam verò tot hujusmodi Æquationes invenire oportebit, quot suppositæ fuerunt incognitæ lineæ.

GG Vel si totidem non inveniantur, nec tamen quidquam eorum, quæ in quæstione desiderantur, omittatur, argumentum est, illam non penitus esse determinatam. Tunc enim ad arbitrium assumi possunt lineæ cognitæ pro incognitis, quibus non responderet aliqua Æquatio.

GGG Postea verò si plures adhuc supersint, ordine quoque utendum erit unaquâque Æquationum reliquarum, sive illam considerando separatim, sive ipsam comparando cum aliis, ad explicandam unamquamque ex incognitis

H lineis; atque ita, reduciendo illas, efficere oportet, ut tantum una remaneat, æqualis alteri cognitæ, aut cujus quadratum, sive cubus, sive quadrato-quadratum, sive surde-solidum, sive quadrato-cubus, &c. æqualis sit ei, quod provenit ex additione vel subtractione duarum, pluriumve aliarum quantitatum, quarum una quidem cognita sit, reliquæ autem compositæ ex quibusdam mediis proportionalibus inter unitatem & dictum quadratum, sive cubum, sive quadrato-quadratum, &c. multiplicatis per alias cognitæ. Quod hoc pacto designo.

$$z \propto b, \text{ aut}$$

$$z^2 \propto -az + b^2, \text{ aut}$$

$$z^3 \propto +az^2 + b^2z - c^3, \text{ aut}$$

$$z^4 \propto +az^3 + b^2z^2 - c^3z + d^4, \text{ \&c.}$$

Hoc

Hoc est, z , quam pro quantitate incognita sumo, est æqualis ipsi b ; aut quadratum à z æquale est quadrato ex b , minus producto ex a in z ; aut cubus à z æqualis est producto ex a in quadratum ipsius z , plus quadrato ex b ducto in z , minus cubo ex c . & sic de cæteris.

Possunt autem semper quantitates incognitæ ita ad unam solam reduci, atque tum Problema construi per rectas lineas & circulos, aut per sectiones Conicas, aut denique per aliam quandam lineam, quæ nonnisi uno duobusve gradibus magis sit composita.

Sed nolo hic prolixus esse, ut hoc magis particulatim explicem, cò quod vobis voluptatem præperem discendi id ipsum vestro marte, & utilitatem ingenium vestrum excolendi, dum vos in eo exercetis, quæ, meo quidem iudicio, præcipua est, quam ex hæc scientia percipere licet. Deinde etiam, quod nihil hic adeò difficile deprehendam, ut ab illis, qui utcumque in Geometria communi atque Algebra versati sunt, & observaturi porro sunt, quæ tractatu hoc continentur, inveniri non possit.

Atque ideo sufficiet, Vos monere, si quis in reducendis hisce Æquationibus non omiserit uti divisionibus omnibus quæ fieri possunt, ipsum quoque infallibiliter habiturum simplicissimos terminos, ad quos quæstio reduci possit.

Iam verò si illa per Geometriam communem resolvitur potest, hoc est, utendo tantum rectis lineis & circularibus, in plana aliqua superficie descriptis, postquam ultima Æquatio omnino fuerit reducta, relinquetur nil præter quadratum aliquod incognitum, æquale ei, quod provenit ex additione vel subtractione ejus radices, multiplicatæ per quantitatem ali-

*Quænam
sint Pro-
blemata
Plana.*


quam cognitam, & alterius cujusdam quantitatis cognitæ.

Quomodo
ipſa reſol-
vantur.

Tuncque radix illa, ſive incognita linea, facilè invenitur. Nam ſi, exempli gratià, habeatur

$$zz \propto az + bb,$$

facio triangulum re-
ctangulum N L M,
cujus unum latus L M
ſit æquale b , radi-
ci videlicet quadratæ
quantitatis cognitæ
 bb , alterum autem
latus L N æquale $\frac{1}{2}a$,
ſemiſſi nimirum reli-
quæ quantitatis co-




gnitæ, quæ multiplicata eſt per z , quam ſuppono lineam
eſſe incognitam. Deinde productâ MN, baſe ejusdem
trianguli, uſque ad O, ita ut NO ſit æqualis NL: erit
tota O M æqualis z , lineæ quaſitæ. Quæ quidem ſic
exprimitur

$$z \propto \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}.$$

Quodd ſi verò habeatur $yy \propto -ay + bb$, atque y ſit
quantitas, quam invenire oportet, facio rurfus idem
triangulum N L M, & à baſe ejus M N aufero NP, æqua-
lem NL, eritque reliqua P M, æqualis y , radii qua-
ſitæ. Ita ut fiat $y \propto -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. Nec aliter ſit,
ſi proponatur $x^2 \propto -ax + b^2$. P M enim eſſet x , &
haberetur $x \propto \sqrt{-\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}}$: atque ita de
aliis.

Deni-



Denique si habeatur

$$zz \propto az - bb:$$

facio NL æqualem $\frac{1}{2}a$, & LM æqualem b , ut ante. Deinde non duco lineam per puncta M & N, ut in duobus aliis casibus, sed duco MQR parallelam ipsi LN; centroque N descripto per L circulo, secante MQR in punctis Q & R, erit MQ vel MR æqualis lineæ quæsitæ z . Hoc enim casu illa duobus mo-

dis exprimitur, nimirum $z \propto \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$, vel etiam $z \propto \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$.

Quòd si circulus centrum suum habens in puncto N, transiensque per punctum L, non secet nec tangat lineam rectam MQR, nullam itidem Aequatio radicem admittet, ita ut inde asserere liceat constructionem Problematis propositi esse impossibilem.

Cæterum possunt hæ ipsæ radices infinitis fermè aliis modis inveniri; sed prædictos tantum in medium asserere volui, velut admodum simplices; ut hæc ratione pateat, Problemata omnia Geometriæ communis construi posse, faciendo tantum ea pauca, quæ quatuor præcedentibus figuris exposui. Quod quidem non credo à Veteribus fuisse animadversum, cum aliàs laborem eà de re tantos libros conscribendi non suscepissent, in quibus vel solus ordo propositionum satis nobis ostendit, quòd ipsis non constiterit vera ratio inveniendi omnes, sed quòd solummodo collegerint illas, in quas fortè inciderunt.

Quod etiam ex iis, quæ Pappus initio sui septimi libri scribit, evidentissimè liquet. Vbi postquam aliquamdiu in recensendis illis omnibus, quæ ab antecessoribus suis in

*Questio.
descripta
ex Pappo.*

Geo.^o

Geometria scripta sunt, occupatus fuit, tandem de quaestione quadam loquitur, quam nec Euclides, nec Apollonius, nec quisquam alius penitus resolvere potuerat, his verbis:

Quem autem dicit (Apollonius) in tertio libro locum ad tres, & quatuor lineas ab Euclide perfectum non esse, neque ipse perficere poterat, neque aliquis alius: sed neque paululum quid addere iis, quæ Euclides scripsit, per ea tantum Conica, quæ usque ad Euclidis tempora præmonstrata sunt, &c.

Paulò autem post explicat, quaestionem illam esse hanc sequentem.

At locus ad tres & quatuor lineas, in quo (Apollonius) magnificè se jactat, & ostentat, nullà habitàgratià ei, qui prius scripserat, est hujusmodi. Si positione datis tribus rectis lineis ab uno & eodem puncto, ad tres lineas in datis angulis rectæ lineæ ducantur, & data sit proportio rectanguli contenti duabus ductis ad quadratum reliquæ: punctum contingit positione datum solidum locum, hoc est, unam ex tribus conicis sectionibus. Et si ad quatuor rectas lineas positione datas in datis angulis lineæ ducantur; & rectanguli duabus ductis contenti ad contentum duabus reliquis proportio data sit: similiter punctum datam conicam sectionem positione continget. Si quidem igitur ad duas tantum, locus planus ostensus est. Quid si ad plures quàm quatuor, punctum continget locos non adhuc cognitos, sed lineas tantum dictas; quales autem sint, vel quam habeant proprietatem, non constat: earum unam, neque primam, & quæ manifestissima videtur, composuerunt, ostendentes utilem esse, propositiones autem ipsarum hæ sunt.

Si ab aliquo puncto, ad positione datas rectas lineas, quinque ducantur rectæ lineæ in datis angulis, & data sit

fit proportio solidi parallelepipedo rectanguli, quod tribus ductis lineis continetur, ad solidum parallelepipedum rectangulum, quod continetur reliquis duabus, & datâ quâpiam lineâ, punctum positione datam lineam continget. Si autem ad sex, & data sit proportio solidi tribus lineis contenti ad solidum, quod tribus reliquis continetur; rursus punctum continget positione datam lineam. Quod si ad plures quàm sex, non adhuc habent dicere, an data sit proportio cuiuspiam contenti quatuor lineis, ad id, quod reliquis continetur: quoniam non est aliquid contentum pluribus quàm tribus dimensionibus.

Vbi velim ut ex occasione notetis, Veteres Mathematicos, ex eo, quod vocabulis in Arithmetica usitatis, ad operationes Geometricas significandas, liberè uti noluerint, sæpe in modos eas explicandi valde intricatos & obscuros incidisse, cujus rei non alia potuit causa esse, quàm quod non satis accuratè perceperint, quænam sit inter illas duas scientias affinitas. Pergit enim Pappus hoc modo.

Acquiescunt autem his, qui paulò ante talia interpretati sunt, neque unum aliquo pacto comprehensibile significantes, quod his continetur. Licebit autem per conjunctas proportionibus hæc, & dicere, & demonstrare universè in dictis proportionibus, atque his in hunc modum. Si ab aliquo puncto ad positione datas rectas lineas ducantur rectæ lineæ in datis angulis, & data sit proportio conjuncta ex ea, quam habet una ductarum ad unam, & altera ad alteram, & alia ad aliam, & reliqua ad datam lineam, si sint septem; si verò octo, & reliqua ad reliquam: punctum continget positione datas lineas. Et similiter quotcunque sint impares vel pares multitudine, cum hæc, ut dixi, loco ad quatuor lineas respondeant, nullum igitur posuerunt, ita ut linea nota sit &c.

B

Quæ-

Quæstio itaque quam Euclides resolvere inceperat atque Apollonius continuaverat, sed quæ à nemine fuit perfecta, erat huiusmodi.

Datis positione tribus, quatuorve, aut pluribus rectis lineis; quæritur primò punctum, à quo totidem aliæ rectæ lineæ, singulæ ad singulas datarum duci possint, quæ cum ipsis datos efficiant angulos, & quarum rectangulum, sub duabus contentum, datam habeat rationem ad quadratum tertiæ, si sint tres; vel ad rectangulum reliquarum duarum, si sint quatuor; Aut si quinque sint, ut parallelepipedum, quod sub tribus ex illis comprehenditur, datam habeat rationem ad parallelepipedum, quod sub duabus reliquis comprehenditur & alia quadam data; Aut si sex sint, ut parallelepipedum sub tribus contentum datam habeat rationem ad parallelepipedum sub tribus reliquis comprehensum; Aut si sint septem, ut hoc, quod producit ex multiplicatione quatuor ductarum in se invicem, datam habeat rationem ad illud, quod ex mutua multiplicatione reliquarum trium & alia quadam data producit; Aut si sint octo, ut id, quod ex quatuor ductis inter se multiplicatis producit, datam habeat rationem ad productum ex reliquis quatuor. Atque ita porro quæstionem hanc, ad omnem alium linearum numerum, extendere licet.

Deinde, quia semper infinita sunt puncta, quæ satisfacere possunt iis, quæ hîc quærentur, requiritur insuper, ut cognoscatur atque describatur linea, in quâ illa omnia reperiantur.

Dicit autem Pappus, si tantum 3 aut 4 lineæ dentur, lineam illam tunc aliquam ex sectionibus Conicis existere. Verum non suscipit ipsam determinare neque describere, non magis quam explicare lineas illas, in quibus quæsitæ puncta inveniri debent, quando quæstio propo-

ta est in pluribus lineis. Tantum addit, quod Veteres unam ex illis sibi imaginati fuerint, quam ibidem utilem esse monstrarunt, sed quæ manifestissima videretur, nec tamen prima existeret. Quod occasionem mihi præbuit tentandi, num illâ. quâ utor, methodo, æquè longè, quàm illi pervenerunt, progredi liceret.

Primò autem inveni, quòd, dum hæc quæstio in tri-
bus, quatuorve, aut quinque duntaxat lineis proponi-
tur, puncta quæ sita per simplicem semper Geometriam <sup>Respon-
sum ad
Quæstio-
nem Pap-
pi.</sup> inveniri queant; hoc est, ut non nisi regulâ atque circi-
no utamur; nec aliud quidquam, quàm quod jam tradi-
tum est, faciamus. Præterquam si quinque lineæ dantur,
quæ omnes inter se parallelæ fuerint. Quo casu, ut &
quum quæstio in 6, 7, 8, aut 9 lineis proponitur, quæ sita
puncta per Solidorum Geometriam inveniri possunt;
hoc est, adhibendo, ad constructionem, aliquam ex tri-
bus Conicis sectionibus. Excepto tantum, si novem li-
neæ datæ fuerint, quæ omnes inter se parallelæ existant.
Quo casu, ut & quum quæstio in 10, 11, 12, aut 13 lineis
proposita est, quæ sita puncta per curvam lineam, quæ
uno tantum gradu magis composita est, quàm sectiones
Conicæ, inveniri possunt. Excepto in 13, quæ omnes in-
ter se sint parallelæ. quo casu, ut & in 14, 15, 16, & 17 li-
neis, linea curva adhiberi debet, quæ uno gradu supra
præcedentem composita est. Atque ita in infinitum.

Deinde inveni quoque, si tantum tres aut quatuor li-
neæ datæ fuerint, quæ sita puncta, non modò in aliqua
trium Conicarum sectionum, sed interdum etiam in cir-
culi circumferentia, aut in recta linea reperiri. Et si 5,
6, 7, aut 8 lineæ datæ fuerint, tum puncta illa incidere in
aliquam ex lineis, uno gradu magis compositis, quàm
sectiones Conicæ. Quarum quidem nullam, quæ ad
hanc quæstionem non sit utilis, imaginari licet: Sed pos-

à quo si ducantur totidem aliæ ad positione datas; ut CB, CD, CF, & CH, in datis angulis CBA, CDA, CFE, CHG, &c. ut hoc, quod producit ex multiplicatione certarum quarundam harum linearum, sit æquale illi, quod producit ex multiplicatione reliquarum; vel etiam ut unum ad alterum datam habeat rationem. id enim quæstionem difficiliorem non reddit.

Primò itaque rem ut jam factam suppono, atque ut ex harum omnium linearum confusione me expediam, considero unam ex datis, atque unam ex quæsitis, exempli gratiâ, AB & CB, velut præcipuas, & ad quas reliquas omnes referre conor. Ponendo nimirum segmentum lineæ AB, quod intra puncta A & B continetur, vocari x . BC autem vocari y , aliasque lineas datas omnes productas esse, donec secent hæc duas, etiam productas; si opus fuerit, & ipsis non sint parallelæ. quemadmodum hîc apparet illas secare, lineam quidem AB in punctis A, E, & G; BC verò in punctis R, S, & T. Deinde quia omnes anguli trianguli ARB dati sunt, data quoque erit ratio, quæ est inter ejus latera AB & BR, quam pono ut z ad b , ita ut, cum AB sit x , BR futura sit $\frac{bx}{z}$, CR autem $y + \frac{bx}{z}$: siquidem punctum B cadit inter puncta C & R; nam si R caderet inter C & B, CR esset $y - \frac{bx}{z}$; sin verò C caderet inter B & R, CR foret $-y + \frac{bx}{z}$. Similiter, dantur quoque tres anguli trianguli DRC, unde & ratio, quæ est inter latera CR & CD, quam pono ut z ad c , ita ut, cum CR sit $y + \frac{bx}{z}$, CD futura sit $\frac{cy}{z} + \frac{bcx}{zz}$. Postea, quia lineæ AB, AD, & EF positione datæ sunt, data quoque erit distantia puncti A à puncto E: quæ si nominetur k , habebitur EB æqualis $k + x$; foret autem ipsa $k - x$,

B 3

si pun-

*Quomodo
ponendi
sint ser-
mini in
hac Quæ-
stione, ut
ad Equa-
tionem de-
rivenatur.*

si punctum B caderet inter E & A; at verò $-k+x$, si E caderet inter A & B. Rursus, quoniam anguli trianguli E S B omnes dantur, dabitur quoque ratio lateris B E ad B S: quam si ponam esse ut z ad d , B S fiet $\frac{dk+dx}{z}$, C S verò $\frac{zy+dk+dx}{z}$; quæ quidem foret $\frac{zy-dk-dx}{z}$, si punctum S caderet inter B & C; at verò $\frac{-zy+dk+dx}{z}$, si C caderet inter B & S. Porro dantur tres anguli trianguli F S C, & consequenter ratio ipsius C S ad C F, quæ sit ut z ad e , unde tota C F erit $\frac{exy+dek+dx}{zz}$. Eodem modo, data est A G, quam voco l , unde B G erit $l-x$, & quia in triangulo B G T ratio ipsius B G ad B T data est, quæ sit ut z ad f , erit B T $\propto \frac{fl-fx}{z}$, & C T $\propto \frac{zy+fl-fx}{z}$. Rursus, propter triangulum T C H, data est ratio ipsius C T ad C H: quam si ponamus ut z ad g , habebitur C H $\propto \frac{+gzy+fgl-fgx}{zz}$.

Atque ita videre est, quòd, positione datis quocunque lineis, ex puncto C semper totidem aliæ ad illas duci possint in datis angulis, (juxta quæstionis tenorem;) quæ singulæ exprimantur ad summum per tres terminos; quorum quidem unus compositus sit ex quantitate incognitâ y , multiplicatâ aut divisâ per aliam quandam cognitâ; secundus verò ex incognitâ quantitate x , etiam multiplicatâ aut divisâ per aliam quandam cognitâ; ac tertius denique ex quantitate aliquâ omnino cognitâ. Excepto tantum, si datæ lineæ sint omnes parallelæ, vel lineæ A B, (quo casu terminus ex quantitate x compositus evanescet;) vel etiam lineæ C B, (quo casu terminus ex quantitate y compositus evanescet;) quemadmodum id plus satis per se manifestum est, nec prolixiori explicatione eget. Quod autem spectat ad signa

gna + & —, quibus hi termini junguntur, ipsa quidem variari possunt modis omnibus, quos imaginari licet.

Deinde videre etiam licet, quòd multiplicando ita hæc lineas in se invicem, quantitates x & y , quæ in producto reperiuntur, singulæ non plures dimensiones habere possint, quàm extiterint lineæ, (quarum explicationi inserviunt.) quæ ita sunt multiplicatæ. Adedò ut nunquam plures duabus habituræ sint dimensiones, ubi productum illud ex duarum tantùm linearum multiplicatione nascitur; nec plures tribus; cùm productum illud ex trium tantùm linearum multiplicatione genitum fuerit, & sic in infinitum.

Cæterùm quia ad determinandum punctum C una *Quo pacto*
duntaxat conditio adimplenda est, nimirum ut hoc quod *cognosca-*
ex multiplicatione certi numeri harum linearum produ- *tur, Pro-*
citur sit æquale, vel (quod nihilo difficilius) datam ha- *blema hoc*
beat rationem ad illud quod provenit ex reliquarum mul- *esse pla-*
tiplicatione: possumus ad libitum assumere alterutram *nam,*
quantitatem incognitam x vel y ; atque alteram inveni- *quando il-*
re per hanc Equationem. Vbi liquet, si quæstio in quin- *lud in*
que tantum lineis propòsita fuerit, quantitatem x , quæ *quingue*
quidem expressioni primæ lineæ non inservit, posse sem- *tantum*
per non plures quàm duas dimensiones recipere. Ita ut, *lineis est*
si pro y sumatur quantitas aliqua cognita; relinquatur *propòsi-*
tantùm $xx \infty +$ vel $-ax +$ vel $-bb$. Et tum quidem *tionem.*
quantitatem x invenire poterimus regulæ atque circini beneficio, quemadmodum superiùs explicatum fuit. Adeoque si in infinitum alia atque alia magnitudo sumatur pro linea y , invenietur quoque in infinitum alia atque alia pro linea x , atque ita obtinebitur infinitus numerus punctorum, cujusmodi est punctum C, quorum ope quæsitæ curvæ lineæ describetur.

Fieri

Fieri etiam potest, quum quæstio in sex aut pluribus lineis proponitur, si inter datas fuerint, quæ ipsi $A B$ vel $B C$ parallelæ existant, ut una duarum quantitatum, x, y , duas tantum aut etiam unam in Æquatione dimensiones habeat, aded ut punctum C regulæ ac circini beneficio inveniri possit. Sed contra, si omnes sint parallelæ, etiam si quæstio in quinque tantum lineis proposita fuerit; non poterit tamen punctum C dictâ ratione inveniri: quia, dum quantitas x nusquam in Æquatione reperitur, permissum non erit amplius pro illa, quæ y vocata fuit, quantitatem cognitam assumere, cum hæc ea ipsa futura sit, quam quærere oportet. Et quandoquidem illa tres dimensiones habebit, non poterit ipsa nisi radicem ex Cubica Æquatione eliciendo inveniri. Quod quidem in genere, nisi ad id aliqua ad minimum Conica sectio adhibeatur, fieri nequit. Rursus, licet lineæ ad novem usque datæ sint, dummodo non sint omnes parallelæ, semper fieri potest, ut Æquatio non altius quam ad quadrato-quadratum ascendat. quare ipsa per Conicas sectiones resolvi quoque semper poterit, eo modo, quem postea sum explicaturus. Ac denique, licet habeantur usque ad 13. lineas, efficere semper possumus, ut Æquatio quadrato-cubum non excedat. Ita ut illam deinde resolvere queamus beneficio lineæ, quæ uno duntaxat gradu supra sectiones Conicas est composita, quemadmodum etiam post explicabitur. Atque hoc primum est, quod hîc eram demonstraturus; sed antequam ad secundum progrediar, opus est ut in genere aliquid de curvarum linearum natura dicam.

G E O M E T R I Æ

LIBER SECVNDVS.

De natura linearum curvarum.


V Eteres optimè considerârunt , quòd Geometriæ ^{Quædam} Problematum alia sint Plana ; alia Solida ; alia ^{sint curvæ} denique Linearia ; hoc est , quòd quædam eorum ^{lineæ, quæ} ^{in Geometria re-} ^{cipi pos-} ^{sunt.} construi possint , ducendo tantùm rectas lineas & circulos ; cum alia constriui nequeant , nisi ad minimum adhibeatur Conica aliqua sectio ; ac reliqua denique , quin ad constructionem eorum assumatur alia quædam linea magis composita.

Verùm satis mirari non possum , quòd non ulteriùs progressi lineas hæc magis compositas in certos distinxerint gradus ; neque etiam planè capio , cur illas potiùs Mechanicas , quàm Geometricas nominaverint. Etenim , si dicâtur , ideo id fuisse factum , quòd instrumento quodam , ad illas in plano describendas , uti opus sit , circuli quoque & rectæ lineæ ob eandem rationem rejiciendæ essent : cum absque circino & regula , quæ non minùs instrumenta dicenda sunt , in charta describi non possint. Neque etiam ideo , quòd instrumenta , quæ describendis illis inserviunt , utpote magis composita quàm regula & circinus , nequeant esse tam exacta : quandoquidem ob hanc rationem potiùs repudiandæ forent ex Mechanicâ , ubi tantùm accurata operis convenientia , quæ à manu proficiscitur , desideratur , quàm ex Geometria , ubi solùm spectatur exacta ratiocinatio. quippe quæ proculdubio , tam hæc lineas quàm illas concernens , æquè perfecta esse potest. Neque tandem

ea de caussa, quòd numerum postulatorum suorum augere noluerint; quòdque contenti fuerint, modò liceret; data duo puncta rectâ conjungere lineâ, atque ex dato centro circulum describere, transeuntem per datum punctum: cum ulterius, ut de Conicis sectionibus tractarent, supponere veriti non fuerint, datum Conum dato plano secare. Vbi sanè ad describendum lineas omnes curvas, quas hîc introducere instituo, nihil aliud supponere est opus: quàm ut duarum pluriumve linearum una per alteram moveri possit, ita ut illarum intersectiones alias designent; siquidem id nihilo difficilius mihi videtur. Verum equidem est, quòd sectiones Conicas non omnino in Geometriam suam receperint; neque etiam nomina, quæ usu approbata sunt, immutare volo; veruntamen evidens admodum est, ut mea fert opinio, quòd, si Geometricum censeamus illud, (ut fieri solet) quod omnino perfectum atque exactum est, & Mechanicum quod ejusmodi non existit; atque Geometriam consideremus ut scientiam, quæ generaliter mensuras omnium corporum cognoscere docet, non magis ex ea excludendæ erunt lineæ maximè compositæ, quàm omnium simplicissimæ: siquidem illas, per motum aliquem continuum, aut per plures, qui se mutuo consequantur, quorumque posteriores à prioribus regantur, imaginari possumus. Hâc enim ratione exactam semper illarum mensuræ cognitionem habere licet. Verum enimverò fieri potest, ut scrupulus, quem sibi Vereres Geometræ in recipiendis lineis, magis quàm sectiones Conicæ compositis, iniecerunt, fuerit, quòd primæ, quas considerarunt, fortè extiterint Spiralis, Quadratrix, atque similes; quæ reverâ non nisi ad Mechanicas pertinent, nec ex illarum numero sunt, quas hîc recipiendas autumo: quandoquidem illas duobus

bus motibus describi imaginamur, qui à se invicem sunt diversi, nec ullam inter se relationem habent, quæ exactè mensurari possit. Nam licèt postea examinaverint quoque Conchoïdem, Cissoïdem, & alias quasdam; tamen, quia fortè illarum proprietates non satis perspectas habuerunt, neque etiam majorem earum quàm præcedentium rationem habuère. Vel etiam videntes, quòd nondum nisi pauca, quæ ad Conicas sectiones pertinerent cognoscerent, & quòd multa illorum, quæ regulæ ac circini ope perfici possunt, quæ ignorarent, superessent, crediderunt, non oportere, ut materiam aliquam difficiliorem aggredirentur. Sed quoniam spero, quòd, qui in utendo calculo Geometrico, hîc proposito, exercitati erunt, non facilè quid in posterum reperiunt sint, in quo hæreant, quod ad Plana, & Solida Problemata attinet: confido, non abs re fore, si illos ad alia investiganda, ubi ipsis nunquam materia se exercendi defutura sit, invitem.

Sunto lineæ AB , AD , AF , & similes, quas suppono descriptas esse ope instrumenti XYZ , quod compositum est ex pluribus regulis, ita junctis, ut, cum illa, quæ designatur per YZ , super lineam AN immota manet, angulus XYZ aperiri claudique possit; & illo omnino clauso existente, puncta B , C , D , E , F , G , H omnia in punctum A cadant; Sed prout aperitur, ut regula BC , quæ ipsi XY in puncto B normaliter adfixa est, propellat versùs Z regulam CD , quæ super YZ incedit, faciens continuò cum illa angulos rectos; & rursus, ut CD propellat DE , quæ similiter super YX incedit, parallela manens ipsi BC ; deinde ut DE propellat EF ; EF verò ipsam FG ; hæcque denuo ipsam GH . Atque ita in infinitum, concipiendo semper alias atque alias, quarum successivè una



alteram eodem modo propellit, & quarum aliz eisdem perpetuò angulos faciunt cum YX , atque aliz cum YZ .

Iam verò dum sic aperitur angulus XYZ ; punctum B describit lineam AB , quæ circulus est; puncta autem D, F, H , ubi cæterarum regularum intersectiones fiunt, describunt alias curvas AD, AF, AH , quarum posteriores ordine magis compositæ sunt quàm prima, hæcque magis quam circulus. Verùm non video quid impedire possit, quò minùs accuratè atque distinctè hujus primæ descriptionem concipiamus quàm circuli, aut Conicarum saltem sectionum; neque etiam quid impedire queat, cur non secundam, tertiam, cæterasque omnes, quæ sic describi possunt, æquè bene concipiamus atque primam; nec per consequens cur non omnes recipiantur, ut Geometriæ contemplationibus inserviant.

*Ratio distinguendi
ear in cer-*

Possẽm huc adferre plures alios modos describendi atque concipiendi lineas curvas, quæ magis magisque gra-

gradatim in infinitum essent compositæ; verum ut has omnes, quæ in rerum natura sunt, simul comprehendam, easque in certa genera ordine distinguam: aptius quidquam afferre nescio, quàm ut dicam, quòd puncta omnia illarum, quæ Geometricæ appellari possunt, hoc est, quæ sub mensuram aliquam certam & exactam cadunt, necessariò ad puncta omnia lineæ rectæ, certam quandam relationem habeant, quæ per æquationem aliquam, omnia puncta respicientem, exprimi possit. Et quòd, cum æquatio hæc non ultra rectangulum duarum quantitatum indeterminatarum, aut non ultra quadratum unius ex illis ascendit, linea curva tunc primi & simplicissimi sit generis; (sub quo tantum Circulus, Parabola, Hyperbola, & Ellipsis sunt comprehensæ:) sed quòd, postquam æquatio ad tertiam aut quartam dimensionem duarum, aut unius è duabus quantitativibus indeterminatis ascendit, (siquidem hinc duæ ad relationem unius ad alterum punctum explicandam requiruntur) linea illa tunc secundi sit generis; & quòd, prout æquatio ad quintam aut sextam dimensionem ascendit, illa tunc sit tertii generis; & sic in infinitum de aliis.

Vt si scire cupiam cuius generis sit linea EC, quam suppono descriptam esse per intersectionem regulæ GL & plani rectilinei CNKL; cuius latus KN indefinitè productum est versùs C; quodque, dum movetur supra planum deorsum in recta linea, (hoc est, ut diameter ejus KL perpetuò applicata reperiatur alicubi lineæ BA, utrinque indefinitè continuatæ,) facit, ut regulà GL rotetur circa punctum G, quoniam ipsi continuo sic admovetur, ut simul quoque semper transeat per punctum L: eligo rectam aliquam lineam, veluti AB, ut ad diversa ejus puncta referam omnia puncta

NL parallelam ipsi GA, quam voco c . Tum dico, ut NL est ad LK, vel c ad b , ita CB, vel y , est ad BK, quæ ideo erit $\frac{by}{c}$; ac proinde $BL \frac{by}{c} - b$, & $AL x + \frac{by}{c} - b$.

Denique ut CB est ad BL, vel y ad $\frac{by}{c} - b$, ita est GA, vel a , ad LA, vel $x + \frac{by}{c} - b$. adeò ut, si multiplicem secundam lineam per tertiam, producat^{ur} $\frac{aby}{c} - ab$, quod æquale erit $xy + \frac{by}{c} - by$, ei scilicet, quod producit^{ur} multiplicando primam lineam per ultimam. Atque ita æquatio, quæ invenienda erat, est hujusmodi, $y^2 \propto cy - \frac{cy^2}{b} + ay - ac$. Ex qua cognoscitur, lineam EC esse primi generis, quemadmodum illa re ipsâ nulla alia est quàm Hyperbola.

Quòd si in instrumento, quod ipsi describendæ inservit, loco rectæ lineæ CNK sumatur inventa hæc Hyperbola, aut alia quæpiam primi generis curva linea, quæ planum terminet CNKL; intersectio hujus lineæ & regulæ GL, loco Hyperbolæ EC, aliam curvam describet, quæ secundi erit generis. Vt si CNK fuerit Circulus, cujus centrum L, describetur prima Conchoïdes Veterum; & si Parabola fuerit, cujus diameter KB, describetur curva linea, quam paulò antedixi primam esse ac simplicissimam pro quæstione Pappi, cum quinque tantùm lineæ positione datæ sunt. Sed si loco alicujus harum linearum primi generis sumatur quædam secundi, quæ terminet planum CNKL, describetur ejus ope alia tertii generis; aut si quædam tertii generis sumatur, describetur aliqua quarti, & sic in infinitum. Vt faciliè ex calculo est cognoscere. Et sanè quocunque tandem modo curvæ alicujus lineæ descriptionem quis imaginatus fuerit, modò ipsa ex illarum numero, quas Geometricas voco, extiterit, poterit:

Vide Pappum ad prop. 22. lib. 4; & Eutocium in commentariis in secund. librum Archimedis de sphaera & cylindro.

rit semper inveniri æquatio, quâ omnia ejus puncta hæc ratione determinentur.

Cæterùm lineas curvas, quæ faciunt ut æquatio hæc ad Quadrato-quadratum adscendat, ejusdem generis esse pono cum illis, quæ ipsam tantùm ad Cubum perducunt. Atque illas, quarum æquatio ad Quadrato-cubum adscendit, ejusdem generis cum illis, quæ ipsam tantùm ad Surdesolidum perducunt. Et sic de cæteris.

Cujus rei ratio est, quòd generalis regula habeatur reducendi ad Cubum difficultates omnes, quæ ascendunt ad Quadrato-quadratum; & ad Surdesolidum omnes illas, quæ ascendunt ad Quadrato-cubum, ita ut magis compositæ censerì non debeant.

Notandum autem est, quòd inter lineas cujusque generis, licèt major pars æqualiter sit composita, ita ut ad eorundem punctorum determinationem servire possint, atque ad eadem Problemata construenda; tamen quædam illarum sint, quæ simpliciores existant, quæque non tantam in sua potentia extensionem habeant. Vt, inter lineas primi generis, præter Ellipsin, Hyperbolam, & Parabolam, quæ æqualiter sunt compositæ, etiam Circulus est comprehensus, qui manifestò simplicior est. Et inter illas secundi generis, numeratur quoque Conchoïdes vulgaris, quæ suam originem ex Circulo ducit; quemadmodum & aliæ præterea reperiuntur, quæ, etiamsi non tantam extensionem habeant, quantum maxima illarum pars, quæ ejusdem generis sunt, tamen inter lineas primi generis poni non possunt.

*Continuatio
explicationis
questionis, quæ
precedenti
libro ex
Pappo fuit
allata.*

Reductis igitur curvis lineis ad certa genera, facile erit progredi in demonstratione responsi, quod paulò ante dedi ad quæstionem Pappi. Primum enim, cum supra ostenderim, quòd, quando tantùm 3 aut 4 lineæ rectæ dantur, æquatio, quæ ad quæsita puncta determinanda

nanda inservit, non ultra quadratum ascendat: evidens est, lineam curvam, in qua hæc puncta reperiuntur, necessariò aliquam esse primi generis: quandoquidem hæc æquatio relationem, quam omnia linearum primi generis puncta habent ad puncta linearum rectarum, explicat. Et quòd, cum non plures quàm 8 linearum rectarum datae sunt, æquatio hæc tum ad summum non ultra Quadrato-quadratum ascendat, ac per consequens quæsitæ linea non nisi secundi aut inferioris generis esse possit. Et quòd, cum non plures quàm 12 linearum rectarum datae sunt, æquatio tum non ultra Quadrato-cubum ascendat, ac per consequens, quæsitæ linea solummodo tertii aut inferioris generis existat. Atque ita de reliquis. Quin etiam, quoniam datarum rectarum positio omnifariam variari potest, & per consequens mutare tam quantitates cognitæ, quàm signa $+$ & $-$ ipsius æquationis, modis omnibus, quos sibi quis imaginari queat: evidens est, nullam primi generis curvam lineam reperiri, quæ ad hanc quæstionem non sit utilis, quando illa in 4 lineis est proposita; neque ullam secundi, quæ ibidem non inserviat, quando illa in 8 lineis est proposita; neque etiam ullam tertii, quando illa in 12 lineis est proposita. Et sic de reliquis.

Adeo ut nulla curva linea, quæ sub calculum cadit, atque in Geometriam recipi potest, reperiatur, quæ ibidem ad aliquem linearum numerum non sit utilis.

Sed oportet ut de his specialius agam; atque rationem inveniendi lineam quæsitam, cuilibet casui inservientem, exhibeam, quando tantum 3 aut 4 linearum datae sunt; atque eadem opera videbitur, quòd primum linearum curvarum genus alias nullas, præter tres Sectiones Conicas & Circulùm, complectatur.

*Solutio
huius
quæstio-
nis, cum
ipsa in 3
aut 4 tan-
tum lineis
est propo-
sita.*

Repetamus itaque quatuor lineas AB, AD, EF, &

D

GH,

DAE, aut EAR, aut etiam RAG, mutando signa + & —, prout ad effectum hunc requireretur. Quòd si verò in quatuor hisce positionibus valor ipsius y nullus reperiretur, indicio esset, quæstionem casu proposito esse impossibilem. Sed supponamus illam hîc possibilem esse, & ad abbreviandum ejus terminos, loco quantitatum $\frac{efglx - dekkz}{ez^1 - egzz}$ scribamus $2m$, & loco $\frac{dezz + efgz - bczx}{ez^1 - egzz}$ scribamus $\frac{2n}{z}$; sicque habebimus $y \propto 2my - \frac{2n}{z}xy + \frac{bcfglx - bcfgxx}{ez^1 - egzz}$, cujus æquationis radix est

$$y \propto m - \frac{nx}{z} + \sqrt{mm - \frac{2mnx}{z} + \frac{nnxx}{zz} + \frac{bcfglx - bcfgxx}{ez^1 - egzz}}$$

Rursus autem abbreviandi causâ, pro $-\frac{2mn}{z} + \frac{bcfgl}{ez^1 - egzz}$ scribamus 0, & pro $\frac{nn}{zz} - \frac{bcfg}{ez^1 - egzz}$ scribamus $\frac{p}{m}$.

Cum enim quantitates hæ omnes datæ sint, illas, ut placuerit, nominare possumus. Atque ita habebimus

$y \propto m - \frac{n}{z}x + \sqrt{mm + 0x - \frac{p}{m}xx}$. quæ longitudo esse debet lineæ BC, relinquendo AB, seu x , indeterminatam.

Vbi patet, si quæstio in tribus aut quatuor tantum lineis est proposita, semper ejusmodi terminos inveniri posse; præterquam quòd quidam ex illis interdum abesse possint, signaque + & — diversimodè mutari.

His peractis, duco KI parallelam & æqualem ipsi AB, ita ut ex BC segmentum auferat BK, æquale ipsi m : quandoquidem hîc habetur + m ; quod quidem aliàs addidissem ipsi BC, ducendo hanc lineam IK ad alteram partem, si illic fuisset — m ; eamque nullo modo duxissem, si quantitas m prorsus defuisset. Deinde duco IL, ita ut linea IK sit ad KL, sicut z ad n . hoc

D 2

est,

figno $+$ notatis, oo fuisset \propto qualis $4pm$, sive etiam termini $mm \& ox$, aut $ox \& \frac{p}{m}xx$ nihilo fuissent \propto uales, punctum hocce C in aliam rectam lineam cecidisset, quæ quidem inventu difficilior non fuisset quàm IL. Sed si hoc non fiat, punctum C reperietur semper in aliqua trium Conicarum sectionum, aut in Circulo, cujus una ex diametris sit in linea IL, & linea LC una ex iis, quæ ad hanc diametrum ordinatim adplicantur; vel contra, LC erit parallela diametro, ad quam illa, quæ est in linea IL, ordinatim adplicatur. Nimirum, si terminus $\frac{p}{m}xx$ non reperiat, erit Conica hæc sectio Parabola; at verò si denotetur signo $+$, erit Hyperbola; ac denique si signo $-$, erit Ellipsis. Excepto tantum, cum quantitas aam est \propto qualis quantitati pzz , & angulus ILC rectus: quo casu, loco Ellipsis Circulus obtinebitur.

CC

Quod si hæc sectio Parabola existit, latus rectum \propto uale erit $\frac{az}{a}$, diameterque semper in linea IL. atque ad inveniendum punctum N, quod illius vertex est, oportebit IN \propto qualem sumere $\frac{amm}{oz}$; ita ut punctum I cadat inter L & N, si termini fuerint $+mm+ox$; aut etiam, ut punctum L cadat inter I & N, si illi fuerint $+mm-ox$; aut denique ut N cadat inter I & L, si habeatur $-mm+ox$. Sed nunquam illic haberi potest $-mm$, eo modo, quo termini hic sunt positi. Postremo verò punctum N erit idem quod punctum I, si quantitas mm nulla sit. Quæ quidem ratione inde facile est invenire hanc Parabolam per Problema 1^{mm} primi libri Conicorum Apollonii.

ccc

Quod si quæsitæ linea est Circulus, aut Ellipsis, aut denique Hyperbola, oportet primò invenire punctum

aut Ellipsis, & habetur $-mm$; vel etiam quando Hyperbola, & quantitas oo major est quàm $4mp$, & cùm habetur $+mm$. Quòd si verò quantitas mm non reperiatur, latus hocce rectum erit $\frac{oz}{a}$, & si ox nulla sit,

id ipsum erit $\sqrt{\frac{4mpz}{aa}}$. Deinde ad inveniendum latus transversum, debet inveniri linea, quæ sit ad hoc latus rectum, ut aa ad pzz , nimirum si latus hocce rectum statuatur $\sqrt{\frac{ozz}{aa} + \frac{4mpz}{aa}}$, transversum erit

$\sqrt{\frac{aaomm}{ppzz} + \frac{4aam}{pzz}}$. Atque in omnibus hisce casibus sectionis diameter erit in linea IM, eritque LC una earum, quæ ad ipsam ordinatim applicantur. Ita ut, si fecerimus MN æqualem dimidio lateris transversi, atque illam ex eadem parte puncti M sumpserimus quâ punctum L, habebitur punctum N pro vertice ipsius diametri. Vnde porro facile est dictam sectionem invenire, per 2^{am} & 3^{iam} Problema 1^{mi} Libri Conicorum Apollonii.

Sed si, sectione Hyperbolæ existente, habeatur $+mm$; & quidem quantitas oo nulla sit, aut minor quàm $4p$; oportebit ex centro M lineam ducere MOP parallelam ipsi LC, nec non CP ipsi LM, atque MO æqualem facere $\sqrt{mm - \frac{oom}{4p}}$; aut etiam æqualem m , si non reperiatur quantitas ox . Deinde considerare oportebit punctum O tanquam verticem Hyperbolæ, cujus diameter sit OP, & linea CP, quæ ad illam sit ordinatim applicata, cujusque latus rectum sit $\sqrt{\frac{4a^4m^4}{ppz^2} - \frac{a^4oom^4}{p^2z^2}}$, transversum verò $\sqrt{4mm - \frac{oom}{p}}$. Excepto tantùm cùm ox nulla est: siquidem eo casu latus rectum fit.

$\frac{a}{z}x - \frac{aam}{2pz} + \frac{am}{2pz}\sqrt{00+4mp}$. Hæc autem multiplicata per $\frac{z}{a}\sqrt{00+4mp}$, quæ est figuræ latus rectum, provenit $x\sqrt{00+4mp} - \frac{am}{2p}\sqrt{00+4mp} + \frac{mms}{2p} + 2mm$, pro rectangulo. A quo auferendum est spatium, quod sit ad quadratum ex NL, ut latus rectum ad latus transversum. Hinc cum quadratum ex NL sit $\frac{aa}{xz}xx - \frac{aam}{pzz}x + \frac{am}{pzz}x\sqrt{00+4mp} + \frac{aamm}{2ppzz} + \frac{aam^2}{pzz} - \frac{aamm}{2ppzz}\sqrt{00+4mp}$, oportebit id ipsum dividere per aam , & multiplicare per pzz , propterea quòd hi termini rationem, quæ est inter latus transversum & rectum, explicent, fietque $\frac{p}{m}xx - ox + x\sqrt{00+4mp} + \frac{am}{2p} - \frac{am}{2p}\sqrt{00+4mp} + mm$. Hoc ergo si auferatur ex rectangulo præcedenti, inveniatur $mm + ox - \frac{p}{m}xx$, pro quadrato lineæ CL: quæ proinde una est ex ordinati adplicatis in Ellipsi, aut Circulo, ad segmentum diametri NL.

Iam verò si datas omnes quantitates numeris velimus explicare, ponendo, exempli gratiâ, EA $\propto 3$, AG $\propto 5$, AB \propto BR, BS $\propto \frac{1}{2}$ BE, GB \propto BT, CD $\propto \frac{1}{2}$ CR, CF $\propto 2$ CS, CH $\propto \frac{1}{2}$ CT; & quòd angulus ABR sit 60 graduum; ac denique quòd rectangulum sub duabus lineis CB & CF, sit æquale rectangulo sub duabus reliquis CD & CH; (quandoquidem hæc omnia data requiruntur, ut quæstio sit penitus determinata;) & quòd præterea AB sit $\propto x$, & CB $\propto y$: inveniemus per modum, supra explicatum, $yy \propto 2y - xy + 5x - xx$, & $y \propto 1 - \frac{1}{2}x + \sqrt{1+4x - \frac{1}{2}xx}$: Ita ut BK fieri de-

E

beat

beat 1 , & $K L$ semissis ipsius $K I$ vel $A B$. Cumque angulus $I K L$ sit 60 graduum, angulus $I L K$ erit rectus. Quoniam autem $I K$ seu $A B$ vocata est x , $K L$ erit $\frac{1}{2}x$, $I L$ verò $x\sqrt{\frac{3}{4}}$; & quantitas, quæ paulò ante nominabatur z , erit 1 ; quæ autem a , erit $\sqrt{\frac{3}{4}}$; quæ m , erit 1 ; quæ o , erit 4 ; & quæ appellabatur p , erit $\frac{1}{2}$: ita ut habeatur $\sqrt{\frac{3}{4}}$ pro $I M$, & $\sqrt{\frac{3}{4}}$ pro $N M$. Et quia $a a m$, quæ est $\frac{1}{2}$, hîc æquatur $p z z$, atque angulus $I L C$ est rectus, linea curva $N C$ invenitur esse circulus. Eodem modo reliqui casus omnes faciliè examinari possunt.

Quid intelligendum sit per loca Plana, & Solida; Et ratio ipsa invenendi.

Cæterùm, quia æquationes, quæ ultra Quadratum non ascendunt, omnes in eo sunt comprehensæ, quod jam explicavi; non solum Veterum Problema in 3 & 4 lineis hîc penitus ad finem perductum est; sed etiam illud, quod ad id, quod Solidorum Locorum Compositionem vocabant, pertinet; adeoque etiam locorum Planorum, cum illa in Solidis contineantur. Quippe hæc loca nihil aliud sunt, quàm cùm in quæstione aliqua est inveniendum punctum, in quâ una deficit conditio, ut ipsa prorsus sit determinata. Quemadmodum in hoc exemplo, ubi omnia ejusdem lineæ puncta pro eo accipi possunt, quod est quæsitum. Etenim lineâ illâ existente rectâ aut circulari, locus vocatur Planus. At si illa est Parabola, vel Hyperbola, vel Ellipsis, tum locus ille nominatur Solidus. Quotiescunque autem id evenit, potest perveniri ad æquationem, quæ duas quantitates incognitas continet, quæque alicui ex illis, quas jam resolvî, similis existit. Quod si verò linea, quæ sic quæsitum punctum determinat, uno gradu magis quàm sectiones Conicæ sit composita, ipsam eodem modo locum Surfolidum appellare licebit, atque ita de cæteris. At verò duabus conditionibus deficientibus ad hujus puncti determinationem, locus, in quo illud

lud reperitur, superficies est, quæ similiter aut plana, aut sphærica, aut magis composita esse potest. Verum summus scopus, quem sibi in hac materia Veteres præfixere, fuit, ut ad Solidorum Locorum compositionem pervenirent; Et verisimile est, omne illud, quod Apollonius de Conicis sectionibus scripsit, eò tantum, ut illam indagaret, respexisse.

Præterea apparet etiam, illud, quod pro primo linearum curvarum genere sumpsi, non posse alias ullas præter Circulum, Parabolam, Hyperbolam, & Ellipsim complecti. Quod quidem id omne est, quod demonstrare susceperam.

Quod si Veterum quæstio in 5 lineis est proposita, quæ omnes sunt parallelæ; evidens est, quæsitum punctum semper in linea recta fore. Sed si in 5 lineis proposita fuerit, ita ut 4 illarum sint parallelæ, & quæ à quinta ad angulos rectos secentur; tum etiam, ut lineæ omnes à quæsito puncto ad angulos rectos illis occurrant; ac demum ut parallelepipedum ex tribus lineis ita ductis ad tres ex iis, quæ parallelæ sunt, sit æquale parallelepipedo ex duabus ad reliquas ductis, & ex tertia quadam data linea: (qui, ut videtur, post præcedentem simplicissimus casus est, quem quis concipere potest:)


Quenam sit prima & simplicissima linearum curvarum, Verum quæstioni inserui, cum ipsa quæsitum in 5 lineis est proposita.

punctum quæsitum cadet in lineam curvam, quæ motu Parabolæ describitur, quemadmodum superius est explicatum.

Sint, exempli gratiâ, datæ lineæ AB, IH, ED, GF, & GA; & oporteat invenire punctum C; ita ut, ducendo CB, CF, CD, CH, & CM ad angulos rectos ad positione datas, parallelepipedum ex tribus CF, CD, & CH compositum, sit æquale parallelepipedo composito ex duabus reliquis CB, CM, & tertia data linea, quæ sit AI.

Pono $CB \propto y$, $CM \propto x$, AI vel AE vel $GE \propto a$; ita ut, existente puncto C inter lineas AB & DE , habeam $CF \propto 2a - y$, $CD \propto a - y$, & $CH \propto y + a$; & multiplicando hæc tres in se invicem, habeam $y^3 - 2ayy - aay + a^3$, æquale producto trium reliquarum, quod est axy .

Post hæc confidero lineam curvam $C E G$, quam



imaginor descriptam esse per intersectionem Parabolæ CKN, interea dum movebatur in linea recta AB, atque secabatur à regula GL, rotata circa punctum G, semperque transeunte per punctum L, in plano Parabolæ.

bolæ. Et facio $KL \propto a$, latusque principale, hoc est, quod ad axem Parabolæ pertinet, itidem æquale a , GA verò $\propto 2a$, CB seu MA $\propto y$, & CM seu AB $\propto x$. Deinde propter similitudinem triangulorum GMC & CBL, GM seu $2a - y$ est ad MC seu x , ut CB seu y ad BL, quæ ideo est $\frac{xy}{2a - y}$. Unde cum LK sit a , BK erit $a - \frac{xy}{2a - y}$, seu $\frac{2aa - ay - xy}{2a - y}$. Denique, quoniam eadem BK, quæ diametri Parabolæ est segmentum, se habet ad BC, quæ ipsi ordinatim est adplicata, ut BC se habet ad latus rectum, quod est a : calculus monstrat, quòd $y^3 - 2a yy - a ay + 2a^3$ æquabitur $ax y$, & per consequens, quòd punctum C erit illud, quod quærebatur. Quod quidem, ubicunque libuerit, in linea CEG assumi potest; vel etiam in ejus adjuncta cEGc, quæ eodem modo describitur, præterquam quòd Parabolæ vertex versùs alteram partem vergat; vel denique in earundem oppositis NIO, nIO, quæ per intersectionem, quam linea GC facit in altero Parabolæ latere KN, describuntur.

Iam verò etiamsi datæ parallelæ AB, IH, ED, & GF non æqualiter inter se distantes essent, nec GA ipsas ad rectos angulos secaret, neque etiam lineæ à puncto C ad easdem ductæ; tamen non minùs hocce punctum C reperiretur semper in linea curva, quæ ejusdem esset naturæ. Quemadmodum id etiam aliquando contingere potest, licet nullæ ex datis lineis sint parallelæ. Sed quando ita quatuor parallelæ sunt, & quinta easdem secans; & quidem parallelepipedum ex tribus, à quæsito puncto ductis, quarum una super quintam cadat, & aliæ duæ super duas ex parallelis, æquetur parallelepipedo sub duabus ad duas reliquas parallelas, & tertia quadam data linea: punctum quæsitum

reperietur in linea curva, quæ alterius erit natura. scilicet in una, cujus omnes ordinatim adplicate ad diametrum æquales sunt ordinatim adplicate ad diametrum sectionis Conicæ, cujusque segmenta diametri inter verticem & ordinatim adplicas interjecta; eandem rationem habent ad datam aliquam lineam, quam hæc ipsa ad similia diametri segmenta sectionis Conicæ, quibus illæ lineæ ordinatim sunt adplicate. Neque asseverare ausim, hanc lineam non simpliciore esse præcedenti; quam tamen pro prima sumendam putavi: propterea quod descriptio ejus ac calculus aliquo modo sint faciliore.

Quod ad lineas attinet, quæ reliquis casibus inferviunt, non immorabor iis per species distinguendis, neque enim omnia dicere suscepi: Sed quia modum inveniendi infinita puncta, per quæ transire debent, explicui, simul modum, quo describendæ sunt, me satis ostendisse puto.

*Quenam
curvæ li-
neæ in
Geome-
triam sint
recipien-
dæ, quæ
describun-
tur inve-
niendo
plura ca-
rum pun-
cta.*

Ac proinde non è re fuerit, hæc considerare, magnum esse discrimen, inter hunc modum inveniendi plura puncta, ad describendam aliquam curvam lineam; atque illum; quo utimur in descriptione Spiralis & similibus. Quandoquidem hoc posteriore modo, non indifferenter, omnia quæsitæ lineæ puncta inveniuntur; sed tantum ea, quæ per mensuram aliquam simpliciore determinari possunt, quàm est ea, quæ ad illam componendam requiritur. Atque ita propriè loquendo nullum ex ejus punctis invenitur, hoc est, nullum eorum, quæ ipsi ita propria sunt, ut non nisi per illam inveniri possint. Sed è contra nullum habetur punctum in lineis, quæ quæstioni propositæ inserviunt, quod non inter illa, quæ modo supra explicato determinantur, inveniri queat. Cum autem modus describendi lineam curvam,

curvam, indifferenter plura ejus puncta inveniendò, ad illas tantùm se extendat, quæ itidem per motum aliquem ordinatum & continuum describi possunt, non erit is omninò à Geometria rejiciendus.

Quemadmodum non magis etiam ex ea rejiciendus est modus, in quo filo seu chordâ complicatâ utimur, ad determinandam summam vel differentiam duarum pluriumve linearum rectarum, quæ à quolibet quævis curvæ puncto duci possunt ad certa quædam alia puncta, vel lineas in certis angulis, sicut in Dioptrica fecimus, ad explicandam Ellipsin & Hyperbolam. Nam licèt in Geometria nullæ lineæ, quæ chordis similes videntur, hoc est, quæ modò rectæ, modò curvæ sunt, recipi possint; (cum ratio, quæ inter rectas & curvas existit, non cognita sit, nec etiam ab hominibus (ut arbitror) cognosci queat; nihilque inde, quod exactum atque certum est, concludere possimus;) Tamen, quia non aliter chordis illis in dictis constructionibus utimur, quàm ut earum beneficio lineas rectas determinemus, quarum longitudo exactè cognoscitur, efficere hoc non debet ut rejiciantur.

Iam verò ex hoc solo, quòd scitur relatio, quam omnia lineæ curvæ puncta habent ad puncta omnia lineæ rectæ, modo illo, quem supra explicavi; facile quoque est invenire relationem, quam habent ad omnia alia puncta & datas lineas: atque exinde cognoscere diametros, axes, centra, aliasque lineas, & puncta, ad quæ unaquæque curva linea relationem habebit specialio-
H
 Quid, ad
 inveniendū om-
 nes li-
 nearum
 curvarum
 proprieta-
 tes, suffi-
 ciat scire
 relatio-
 nem, quam
 omnia il-
 larum
 puncta
 habent ad
 puncta li-
 nearum
 rectarum;
 rem vel simplicio-
 rem quàm ad alia: atque ita imaginari di-
 versos modos illas describendi, ex quibus facilio-
 res eligi possunt. Immo verò, potest quoque ex hoc solo
 inveniri propemodum omne id, quod determinari po-
 test, atque ad spaciū, quod comprehendunt, magnitudi-


*Et modum
ducendi
lineas re-
ctas, quæ
ipsas se-
cent in
omnibus
illis pun-
ctis ad
angulos
rectos.*

I

nem spectat : ita ut non opus sit de his agere apertius. Et denique quantum ad omnes reliquas proprietates, quas lineis curvis attribuire possumus, ipsæ tantummodo ab angulorum, quos cum certis quibusdam aliis lineis efficiunt, amplitudine dependent. Sed si lineæ rectæ duci possint, quæ illas in punctis, ubi aliæ, cum quibus angulos faciunt, quos mensurare volumus, ipsis occurrunt, secent ad angulos rectos, vel, quod hîc pro eodem haberi volo, quæ earum contingentes secent : magnitudo horum angulorum non erit inventu difficilius, quàm si à duabus rectis lineis comprehensi essent. Atque ideo confidam, me exposuisse hîc omnia illa, quæ pro curvarum linearum elementis requiruntur, postquam generalem modum ducendi rectas lineas, quæ eas ad rectos angulos in quibusvis ipsarum punctis secent, ostendero. Nec verebor dicere, Problema hoc, non modò eorum, quæ scio, utilissimum & generalissimum esse ; sed etiam eorum, quæ in Geometria seire unquam desideraverim.

K


*Modus ge-
neralis in-
veniendi
lineas re-
ctas, quæ
secent da-
tas cur-
vas, vel
eorum
contingen-
tes, ad an-
gulos re-
ctos.*



Sit CE linea curva, oporteatque per punctum C rectam lineam ducere, facientem cum ipsa angulos rectos.

Suppono rem tanquam jam factam, lineamque quæ sitam esse CP, quam produco usque ad punctum P, ut occurrat rectæ GA, quam suppono illam esse, ad cuius puncta referenda sunt puncta omnia lineæ CE: ita ut faciendo MA seu CB $\propto y$, & CM seu BA $\propto x$, habeam æquationem aliquam, quæ mihi relationem, quæ est inter x & y , explicet. Deinde facio PC $\propto s$, & PA $\propto v$, seu PM $\propto v - y$. Vnde propter trian-
gulum

lum rectangulum PMC inuenio ss , quod est quadratum basis, æquale $xx + vv - 2vy + yy$, quadratis duorum laterum, hoc est, inuenio $x \propto \sqrt{ss - vv + 2vy - yy}$, aut $y \propto v - \sqrt{ss - xx}$. Cujus æquationis ope aufero ex æquatione altera, (quæ mihi relationem explicat, quam puncta curvæ CE habent ad puncta rectæ GA) alterutram è duabus quantitatibus indeterminatis x vel y . Quod quidem facile est, si ubique pro x ponamus $\sqrt{ss - vv + 2vy - yy}$, & quadratum hujus summæ pro xx ,



& ejus cubum pro x^3 , & ita porro; si fuerit x , quam tollere velimus; aut si fuerit y , ponendo ejus loco $v - \sqrt{ss - xx}$, & quadratum, cubumve, &c. hujus summæ, loco yy , aut y^3 , &c. Ita ut inde semper restet æquatio, in qua non nisi una habeatur quantitas

indeterminata x , vel y .


Quemadmodum si CE est Ellipsis, in qua MA ^L fit segmentum diametri ad quam CM fit ordinatim ^{Exemplum hujus Operationis in Ellipfi.} adplicata, quodque pro latere recto habeat r ; pro transverso autem q : fiet per 13^{ium} Theorema 1^{mi} libri Conicorum Apollonii: $xx \propto ry - \frac{r}{q}yy$. Vnde tollendo xx , restabit $ss - vv + 2vy - yy \propto ry - \frac{r}{q}yy$, vel $yy + \frac{qrr - 2qvy + qvv - qss}{q - r}$ æquale nihilo.

F

Præ-

hic datae sunt, quia punctum C est datum, sed ad inveniendam quantitatem x vel y , quæ quæsitum punctum P determinant. In quem finem considerari debet: si punctum P tale est, quale desideratur, quod circulus, cuius id ipsum est centrum, quique per punctum C transit, tangat ibidem curvam lineam CE , nec ipsam secet. Sed quod, si idem punctum P propius aut remotius sumatur à puncto A , quàm oportet, circulus hic non solum in puncto C , sed etiam necessario in alio quodam puncto curvam CE sit secturus.

Deinde considerandum quoque est, quod, quando hic circulus lineam curvam CE secat, æquatio, per quam quantitas x vel y , vel quædam alia similis quæritur, supponendo PA & PC esse cognitæ, necessario duas contineat radices, quæ sunt inæquales. Nam si, exempli gratiâ, circulus hic secet curvam CE , in punctis C & E , ac ducatur EQ parallela ipsi CM : nomina quantitatum indeterminatarum x & y æquè bene convenient lineis EQ & QA , atque ipsis CM & MA , existente PE æquali PC , propter circulum. Aded, ut quærendo



lineas EQ & QA , per PE & PA , (quæ tanquam cognitæ supponuntur) eandem habaturi simus æquationem, quam si quærerentur CM & MA per PC & PA . Vnde liquidò constat, ipsius x , vel y , vel

alterius ejusmodi quantitatis, quam supposuerimus, valorem, in hac æquatione fore duplicem, hoc est, æquationem duas admissuram radices, quæ sunt inæquales; quarum quidem una futura est CM , & altera EQ , si fue-

est, secundus, qui in una est $\frac{yy - 2yv}{q - r}$, sit æqualis secundo alterius, qui est $-2ey$. Vnde quærendo quantitatem v , quæ quantitatem lineæ P A designat, inveniatur $v \propto e - \frac{r}{q}e + \frac{1}{2}r$. vel quia e æqualem supposuimus ipsi y , habebitur $v \propto y - \frac{r}{q}y + \frac{1}{2}r$. Non secus inveniri quoque posset s per tertium terminum $ee \propto \frac{vv - 2vs}{q - r}$; sed quia quantitas v satis determinat punctum P, quod solum quærebamus, necesse non erit ulterius progredi.

Eâdem ratione secunda æquatio superius inventa: nempe,

$$y^4 - 2by^3 + \left\{ \begin{matrix} -2cd \\ +bb \\ +dd \end{matrix} \right\} y^2 + \left\{ \begin{matrix} 4bcd \\ -2ddv \end{matrix} \right\} y + \left\{ \begin{matrix} -2bbcd \\ +ccdd \\ -ddss \\ +ddvv \end{matrix} \right\} yy - 2bccddy + bbccdd,$$

eandem debet habere formam, quam summa, quæ producitur multiplicando $yy - 2ey + ee$ per $y^2 + fy^3 + ggyy + h^3y + k^4$, quæ est

$$y^4 + \left\{ \begin{matrix} f \\ -2e \end{matrix} \right\} y^3 + \left\{ \begin{matrix} +gg \\ -2ef \\ +ee \end{matrix} \right\} y^2 + \left\{ \begin{matrix} +b^3 \\ -2eg \\ +ef \end{matrix} \right\} y + \left\{ \begin{matrix} +k^4 \\ -2ek \\ +eeb \end{matrix} \right\} yy + \left\{ \begin{matrix} -2ek^2 \\ +eeb^2 \end{matrix} \right\} y + eeek^4.$$

ita ut ex binis hisce æquationibus alias sex eliciam, quæ ad inveniendas sex quantitates f, g, h, k, v , & s inserviunt.

Vnde facillè est intelligere, quòd, cujuscunque generis linea curva proposita esse possit, tot semper hoc procedendi modo æquationes resultent, quot quantitates incognitas supponere coacti fuerimus. Verùm ut ordine æquationes hæc disjungamus, tandemque quantitatem v (quæ quidem ea sola est, qua indigemus, & cujus occasione cæteræ quærentur) inveniamus: oportet primò per secundum terminum quærere f , primam quantitatum incognitarum ultimæ summæ, inveniaturque $f \propto 2e - 2b$.


Dein-

Deinde per ultimum quærenda est k , ultima quantitas, & fit $gg \propto 3ee - 4be - 2cd + bb + dd$.
 $\frac{bbccdd}{ee}$

Porro per tertium terminum quærenda est g , secunda quantitas, & fit $gg \propto 3ee - 4be - 2cd + bb + dd$.

Denique per penultimum inveniendâ est b , penultima quantitas, & fit $b^3 \propto \frac{2bbccdd}{e^2} - \frac{2bbccdd}{ee}$. Atque ita eodem ordine usque ad ultimam progrediendum esset, si plures ejusmodi quantitates in eadem summa haberentur: siquidem hoc eodem semper modo fieri potest.

Præterea per terminum, qui in hoc ipso ordine sequitur, atque hinc quartus est, oportet investigare v , & fit



$$v \propto \frac{3e^3}{dd} - \frac{4bee}{dd} + \frac{bbe}{dd} - \frac{2ce}{d} + e + \frac{2be}{d} + \frac{bee}{ee} - \frac{bbce}{e^2}$$

vel, ponendo y loco e , quæ ipsi est æqualis, habebitur

$$v \propto \frac{3y^3}{dd} - \frac{4byy}{dd} + \frac{bby}{dd} - \frac{2cy}{d} + y + \frac{2be}{d} + \frac{bee}{yy} - \frac{bbce}{y^2}$$


pro linea A P.

Simi-

mus. Attamen obiter vos monere volo, quòd inventio hæc supponendi duas ejusdem formæ æquationes, ad comparandum separatim omnes terminos unius cum omnibus terminis alterius, ut inde ex una sola nascantur plures aliæ, (cujus hîc exempla vidistis,) infinitis aliis Problematis inservire possit, neque una ex minimis, methodi, quâ utor, existat.

Non adjungo construcciones, secundum quas contingentes, sive perpendiculares quæsitæ, post calculum, quem jam explicavi, sunt ducendæ: quandoquidem illæ semper faciliè inveniri possunt; etiamsi aliquâ sæpe industriâ, ut breves atque simplices reddantur, opus sit.

Vt, exempli causâ, si CE est prima Conchoïdes V-
terum, cujus G sit Polus, & A B regula, cujus ope ducta N




Exem-
plum con-
structionis
hujus Pro-
blematis
in Cen-
cride.

est; adeò ut lineæ omnes rectæ, quæ tendunt versùs G,
atque intra curvam CE, & rectam AB continentur,
G (ut


secantibus in puncto A, ad quoslibet angulos, sumo ad arbitrium in una ex ipsis punctum F, hoc est, propius aut remotius ab A puncto, prout Ouales hasce majores aut minores describere animus est; atque ex puncto F, cœ centro, describo circulum, transeuntem aliquantulum ultra A, ut per punctum 5. Deinde ex hoc puncto 5 duco lineam rectam 5, 6, secantem alteram in puncto 6; ita ut A 6 minor sit quàm A 5, juxta quamlibet rationem datam, nimirum eam, quæ refractiones mensurat, si eâ in Dioptrica uti velimus. Quo facto, ad libitum quoque sumo punctum G in linea F A, ex eadem parte, quâ punctum 5 est sumptum, hoc est, faciendo, ut lineæ A F & G A eam inter se rationem habeant, quam volumus. Postea positâ R A æquali G A in linea A 6, describo alium circulum ex centro G, cujus radius æqualis sit lineæ R 6, priorem ab utraque parte lineæ F G in puncto 1 secantem; quod quidem unum est ex illis, per quæ prima quæsitum Ovalium transire debet. Similiter, describo rursus circulum ex centro F, qui transeat aliquantulum ultra citraue punctum 5, ut per punctum 7; ductâque lineâ rectâ 7, 8, parallellâ ipsi 5, 6, ex centro G describo alium circulum intervallo lineæ R 8, priorem, qui per punctum 7 transit, secantem in puncto 1, quod aliud præterea punctum est ejusdem Ovalis. Atque ita invenire licet tot alia puncta, quot voluerimus, ducendo semper alias atque alias lineas ipsi 7, 8 parallelas, nec non alios aliosque circulos ex centris F & G.

Quod ad secundæ Ovalis descriptionem attinet, ibi nulla quidem alia differentia advertendâ occurrit, quàm quòd loco A R sumere oporteat A S ipsi A G æqualem, ex altera parte puncti A, & quòd radius circuli, ex centro G descripti, ad secandum eum, qui ex centro F per


punctum 5 descriptus est, æqualis sumendus sit lineæ S 6; aut etiam æqualis lineæ S 8, si illum, qui per punctum 7 transit, secare debeat. Atque ita de aliis. Quæ
 00 quidem ratione hi circuli in punctis 2, 2 sese interfec-
 bunt, per quæ secunda hæc Ovalis erit ducenda.



Porro quod spectat ad tertiam & quartam, loco lineæ A G sumenda erit A H ex altera parte puncti A, nimirum ex eadem parte, qua punctum F est sumptum. Vbi amplius observandum venit, lineam hanc A H excedere debere ipsam A F, quæ quoque nulla esse potest, ita ut punctum F idem sit, quod punctum A, in descriptione omnium harum Ovalium. Deinde postquam lineæ A R & A S sic ipsi A H sunt æquales factæ, ad describendam tertiam Ovalem A 3 Y, describo circulum ex centro H, cujus radius sit æqualis lineæ S 6, circulum ex centro F, descriptum per punctum 5, secantem



tem in puncto 3; similiterque alium ex centro H, intervallo lineæ S 8, qui circulum ex centro F, descriptum per punctum 7, secet in puncto itidem notato 3. atque ita de aliis. Denique pro ultima, describo circulos ex




G 3

centro

centro H, quorum radii sint æquales lineis R 6, & R 8, atque similibus, qui reliquos circulos secant in punctis notatis 4.

Possent præterea infiniti alii modi excogitari ad describendas hæc Ouales. Vt, exempli causâ, ad describendam primam A V, quando lineæ F A & A G ponuntur æquales: divido totam F G in puncto L; ita ut F L sit




ad L G, sicut A 5 ad A 6. hoc est, ut ipsæ inter se rationem servant, quæ refractiones metitur. Deinde sectâ A L bifariam in K, facio rotare regulam aliquam, ut F E, circa punctum F, interea dum juxta ipsam velut agglutinata tenetur chorda E C, quæ, uno extremo annexa extremitati regulæ versùs E, se flectit à C versùs K, atque deinde rursus à K versùs C, ac denuo à C versùs G, ubi alterum ejus extremum est alligatum; sic ut longitudo ipsius composita sit ex longitudine lineæ G A plus A L, plus F E, minus A F, & motus puncti C Ovale hanc describat: ad imitationem ejus, quod in Dioptrica de Ellipsi & Hyperbola dictum fuit. Sed nolo huic argumento diutius immorari.

Ad hæc, etiam si hæc Ouales ejusdem fermè naturæ viden-

videntur, ipsæ nihilominus quatuor diversorum sunt generum, quorum unumquodque sub se infinita alia genera continet, & unumquodque rursus tot diversas species, quot facit Ellipsium aut Hyperbolarum genus. Etenim prout ratio, quæ inter lineas A 5 & A 6, similesve, consistit, diversa est, genus quoque subalternum harum Ovalium sit diversum. Deinde prout ratio inter lineas A F & A G vel A H mutatur, Ouales quoque cujusque subalterni generis mutantur specie. Prout autem A G vel A H major vel minor est, ipsæ magnitudine quoque differunt. Quod si verò lineæ A 5 & A 6 æquales sumantur, loco Ovalium primi aut tertii generis, describentur tantum lineæ rectæ; sed loco secundi, omnes Hyperbolæ; & loco ultimi, omnes Ellipses.

Uterius in qualibet harum Ovalium consideranda sunt etiam duæ partes, quæ diversas proprietates habent; quippe in prima pars illa, quæ est versùs A, facit ut radii, qui in aëre existentes ex puncto F prodeunt, detorqueantur omnes versùs G punctum; postquam in convexam vitri superficiem inciderunt, qualis hîc est 1 A 1. Et in quo vitro refractiones sic fiunt, ut juxta ea,

Proprietates harum Ovalium concernentes refractiones.



quæ

quæ in Dioptricis dicta sunt, illæ omnes per rationem, quæ inter lineas A 5 & A 6, aut similes, quarum ope hæc Ovalis descripta est, obtinetur, mensurari possint.

P Verùm pars illa, quæ est versùs V, facit ut radii, qui ex puncto G prodeunt, omnes versùs F reflectantur, si in superficiem concavam speculi inciderint, cujus figura sit I V I; & quod ex tali materia constet, ut vim horum radiorum, secundùm rationem, quæ inter lineas A 5 & A 6 reperitur, diminuat. Quandoquidem ex eo, quod in Dioptrica demonstravimus, liquet, hoc posito, futurum, ut etiam reflexionum anguli non secus ac refractionum inæquales existant, atque eodem modo mensurari possint.

In secunda Ovali, pars 2 A 2 similiter reflexionibus inservit, quarum anguli inæquales supponuntur. Si enim illa superficiem speculi, ex eadem materia, qua præcedens, confecti, referret, faceret ut radii omnes, qui ex puncto G venirent, sic reflecterentur, perinde ac si post reflexionem illam viderentur procedere ex puncto F. Et notandum est, quòd, si linea A G multò major sit assumpta quàm A F, speculum hoc in medio versùs A concavum sit futurum, atque concavum in extremitatibus. Quippe hujus lineæ figura talis existit, ut potiùs cor quàm Ovalem repræsentet.

At verò altera ejus pars 2 X 2 refractionibus inservit, facitque ut radii, qui in aëre sunt, ac tendunt versùs F, se omnes incurvent versùs G, transeundo superficiem vitri, quod figuram illam habet.


PP Tertia Ovalis tota refractionibus inservit, facitque ut radii, qui in aëre existentes versùs F tendunt, in vitro se omnes versùs H recipiant, postquam superficiem ejus transierunt, cujus figura est A 3 Y 3, quæ undique est convexa; præterquam versùs A, ubi paululùm concava

cava existit, ita ut ipsa pariter atque præcedens cordi haud sit absimilis. Differentia autem, quæ est inter duas ejus partes, in eo consistit, quòd punctum F uni ex illis propius sit, quàm punctum H; quodque ab altera remotius quàm idem punctum H existat.

Eodem modo ultima Ovalis omnino reflexionibus inservit, facitque, ut radii, qui ex puncto H veniunt, atque in superficiem concavam alicujus speculi ejusdem cum præcedentibus materiæ incidunt, cujusque figura est A 4 Z 4, reflectantur omnes versùs F.

Ita ut puncta F, & G seu H Focos harum Ovalium appellare liceat, ad exemplum eorum, quæ in Ellipsis & Hyperbolis habentur, atque in Dioptrica ita nominata sunt.

Omitto multas alias refractiones & reflexiones, quæ harum Ovalium ope diriguntur: cum enim harum solummodo conversæ aut contrariæ sint, ex iis facilè deduci poterunt.




Verùm non omittenda est demonstratio ejus, quod *Deven-*
 dixi. In quem finem sumamus, exempli causâ, pun- *stratio ka-*
 ctum C pro libitu in priore parte primæ harum Ova- *rum pro-*
 lium: deinde ducamus lineam rectam CP, quæ secet *prieta-*
 hanc curvam in C, ad angulos rectos. Quod quidem *tium.*
 facile est, per Problema præcedens. Etenim, sumen-
 do *b* pro AG, *c* pro AF, *c + s* pro FC; supponen-
 doque, quòd ratio, quæ est inter *d* & *e*, (quam huc
 H sem-

semper pro ea sumam, quæ propositi vitri refractiones
metitur) illam quoque, quæ est inter lineas A 5, & A 6,
fimilesve, quibus in Ovalis hujus descriptione usi sumus,
designet: ipsi G C attribuit $b - \frac{ex}{d}$, inveniturque li-
neam A P esse $\frac{bcdd - bde + bdx + cex}{bde + cdd + dxz - exz}$, ut supra est
ostensum.

Porro ex puncto P deductâ super rectam FC perpendiculari PQ, nec non PN perpendiculari super GC, considerandum est, num PQ sit ad PN, sicut d ad e , hoc est, ut lineæ, quæ vitri convexi AC refractiones metiuntur: hoc enim si fiat, radius, qui à puncto F venit ad punctum C, ita se ibidem incurvare debebit, intrando hocce vitrum, ut inde versùs G tendat. Quemadmodum ex iis, quæ in Dioptrica tradidi, manifestissimum est. Atque eapropter per calculum exploremus, num verum sit, PQ esse ad PN. sicut d ad e . Vt sequitur.

Triangula rectangula PQF & CMF similia sunt,
unde liquet, CF esse ad CM , ut F P ad PQ ; ac proin-



de FP multiplicatam per CM atque divisam per CF , esse æqualem ipsi PQ . Eodem modo, triangula rectangula PNG & CMG similia sunt; unde sequitur, GP multiplicatam per CM & divisam per CG , esse æqualem ipsi PN . Deinde, quia multiplicationes vel divisiones duarum quantitatum per eandem rationem.

nem, quæ inter ipsas est, non mutant: si FP multiplicata per CM, & divisa per CF, est ad GP, etiam multiplicatam per CM, & divisam per CG, sicut *d* ad *e*: dividendo utramque summam per CM, & deinde multiplicando utramque per CF, ac denuo per CG: relinquitur, FP multiplicatam per CG, in eadem ratione esse ad GP multiplicatam per CF, ut est *d* ad *e*. At verò

per constructionem FP est $c \frac{+bcdd-bcdx+bddx+ceex}{bde+cdd+ddx-cex}$,
sive FP $\propto \frac{bcdd+cedd+bddx+cedx}{bde+cdd+ddx-cex}$, & CG est $b - \frac{ex}{d}$

Vnde si multiplicemus FP per CG, proveniet

$$\frac{bbcdx+bcddx+bbddx+bcedx-bcdex-ccdex-bdex-ceex}{bde+cdd+ddx-cex}$$

Similiter GP est $b - \frac{bcdd+bcdx-bddx-ceex}{bde+cdd+ddx-cex}$, sive

$$GP \propto \frac{bbde+bcdx-bceex-ceex}{bde+cdd+ddx-cex}, \text{ \& CF est } c + x.$$

Ideo si multiplicemus GP per CF, exurget


$$\frac{bbcdx+bcddx-bceex-ceex+bbdex+bcdex-bceex-ceex}{bde+cdd+ddx-cex}$$

Et quia prima harum summarum divisa per *d*, eadem est quæ, secunda divisa per *e*: manifestum est, quòd FP multiplicata per CG sit ad GP, multiplicatam per CF, hoc est, quòd PQ sit ad PN, sicut *d* ad *e*. Quod demonstrandum erat.

Vbi sciendum, demonstrationem hanc se extendere ad omne illud, quod de aliis refractionibus aut reflexionibus, quæ in expositis Ovalibus fiunt, dictum est. Præterquam quòd aliud nihil quàm signa + & - in calculo sit mutandum. Quæ ideo unusquisque proprio Marte examine poterit, ita ut huic rei diutiùs immorari non sit opus.

Sed oportet, ut nunc id præstem, quod in Dioptrica omisi, cùm ibi ostensum est, plurium diversarum figurarum vitra haberi posse, quæ singula faciunt, ut ra-

dii, ab eodem objecti puncto venientes, coſant rursus omnes in aliud punctum, postquam per illa tranſierunt; & quòd horum vitrorum illa, quæ ab una parte admodum convexa sunt, & concava ab altera, majorem efficaciam ad comburendum habeant, quàm illa, quæ ab utraque parte æqualiter sunt convexa; cum hæc posteriora contra pro perspicillis sint meliora: Contentus enim ibi fui explicare tantum illa, quæ ad præxin existimavi fore optima, habendo præcipuè rationem difficultatis, quæ artificibus in iis expoliendis occurrere possit. Adeoque ne quid, quòd ad ejus scientiæ Theoriam spectat, desiderari queat, explicanda hîc mihi superest vitrorum figura, quæ unam ex superficiebus suis tam convexam aut concavam habeant, quàm quis voluerit, & nihilominus efficiant, ut radii omnes, qui ab uno puncto effunduntur, aut paralleli sunt, colligantur rursus in alio puncto: Quemadmodum etiam figura vitrorum, quæ idem præstant, & æqualiter ab utraque parte sunt convexa; aut in quibus convexitas unius superficie datam habet rationem ad convexitatem alterius.



*Quomodo
vitrum
fieri pos-
sit, cujus
una su-
perficies
tam con-
vexa aut*

Ponamus igitur pro primo casu, quòd, cùm dantur puncta G, Y, C, & F, radii omnes, qui ex puncto G veniunt, aut ipsi GA sunt paralleli, colligi debeant in puncto F, postquam vitrum tranſierint, ita concavum, ut, Y in medio ejus superficie interioris existente, extremitas


miras sit in puncto C; ita ut chorda CMC, & sagitta
 YM, arcus CYC datae sint. Quæstio eò recidit, ut
 primò considerandum sit, cujusnam ex Ovalibus jam
 explicatis superficies vitri YC figuram requirat, ad
 faciendum, ut radii omnes, qui intra illud existentes
 versùs idem punctum, ut H, quod nondum est cogni-
 tum, tendunt, egrediendo se versùs aliud punctum re-
 cipiant, ut F. Quippe nullus effectus est, rationem,
 quâ hi radii reflexione aut refractione detorquentur,
 concernens, qui per aliquam harum Ovalium produci
 non possit. Atque faciliè cognoscitur, hunc produci
 posse per tertiæ Ovalis partem, paulò ante vocatam
 3 A 3; aut etiam per ejusdem partem, nominatam 3 Y 3;
 aut denique per secundæ partem, appellatam 2 X 2. Et
 quia hæ tres sub eundem hîc calculum cadunt, pro una
 pariter atque pro altera punctum Y sumendum erit pro
 ipsarum vertice; C autem pro uno ex punctis, quæ in
 ipsarum sunt circumferentia; & F pro uno ex focus;
 post quæ tantum punctum H quærendum restat, quod
 alter focus esse debet. Illud autem invenitur, consi-
 derando, quòd differentia, quæ est inter lineas FY &
 FC, se habere debeat ad differentiam, quæ est inter li-
 neas HY & HC, sicut *d* est ad *e*, hoc est, ut major li-
 nearum, quæ vitri propositi refractiones metiuntur, ad
 minorem. Quemadmodum ex harum Ovalium de-
 scriptione perspicere licet. Et quoniam lineæ FY &
 FC datae sunt, datur quoque ipsarum differentia, &
 per consequens etiam illa, quæ est inter lineas HY &
 HC: quandoquidem ratio, quæ inter duas hæc dif-
 ferentias consistit data est. Amplius, quia YM est data,
 datur quoque differentia, quæ est inter MH & HC; &
 tandem, quia CM est data, superest tantum invenien-
 dum MH, latus trianguli rectanguli CMH, cujus la-

H 3

tus

tus CM datum est, quemadmodum etiam differentia, quæ est inter CH basin, & MH latus quæsitum. Vnde illud faciliè inveniri potest. Si enim sumatur k pro excessu, quo CH excedit MH, & n pro longitudine lineæ CM, habebitur $\frac{n^2}{k} - \frac{1}{2}k$ pro MH.

Postquam igitur sic inventum est punctum H, si illud longius reperiatur distitum à puncto Y, quàm inde distat punctum F, linea CY debet esse prima pars Ova-




lis tertii generis, quæ ante nominata fuit 3 A 3: sed si HY minor est quàm FY, aut in tantum HF superat, ut differentia ipsarum, ratione totius FY, major sit, quàm est e , minor linearum, quæ refractiones metiuntur, comparata cum d majore, hoc est, ut faciendo $HF \propto e$, & $HY \propto c + b$, dh sit major quàm $2ce + eb$, & tunc CY debet esse secunda pars ejusdem tertie Ovalis, quæ paulò antè vocata fuit 3 Y 3; sed erit secunda pars Ovalis secundi generis, quæ supra nominata fuit 2 X 2, si dh æqualis vel minor est quàm $2ce + eb$. Et denique si punctum H illud ipsum est, quod punctum F, quod quidem non contingit, nisi cùm FY & FC sunt æquales, tum dicta linea YC erit Circulus.

Post hæc quærenda est CAC altera hujus vitri superficies, quæ debet esse Ellipsis, cujus focus H, si radii incidentes paralleli supponantur. Quo etiam casu facile est illam invenire. Sed si supponantur à puncto G veni-

commune, esse cognitum, quæro AM per tria puncta $G, C, \& H$, ratione modò explicatâ; nimirum sumendo k pro differentia, quæ est inter CH & HM , & g pro eâ, quæ est inter GC & GM . Vnde cum AC est prima pars Ovalis primi generis, invenio $\frac{ge+dk}{d-e}$ pro AM . Deinde quæro etiam MY per tria puncta $F, C, \& H$, ita ut CY sit prima pars Ovalis tertii generis; sumendoque y pro MY , & f pro differentia, quæ est inter CF & FM , habebó $f+y$ pro ea, quæ est inter CF & FT : hinc cum habeam k pro illa, quæ est inter CH & HM , habebó $k+y$ pro ea, quæ est inter CH & HY , quam scio esse debere ad $f+y$, sicut e ad d , propter Ovalem tertii generis. unde invenio y seu MY esse $\frac{fe-dk}{d-e}$, ita ut addendo simul quantitates inventas pro AM & MY , habeam $\frac{ge+fe}{d-e}$ pro tota AY . E quibus manifestum sit, quòd, ad quamcunque partem punctum H suppositum fuerit, dicta linea AY semper composita sit ex quantitate aliqua, quæ sit ad differentiam, quâ GC & CF simul sumptæ superant GF , ut est e minor duarum linearum, quæ dimetiendis refractionibus vitri propositi inserviunt, ad $d-e$, differentiam, quâ major minorem excedit. Quod quidem satis scitum est Theorema.

Postquam igitur sic inventa est tota linea AY , secanda est ipsa juxta rationem, quam inter se servare debent ejus partes AM & MY ; quibus mediantibus, (quia jam habetur punctum M) invenientur quoque puncta A & Y ; & per consequens punctum H , per Problema præcedens. Verùm considerandum est priùs, num linea AM sic inventa, sit major quàm $\frac{ge}{d-e}$, an minor, an verò ipsi æqualis. Nam si major fuerit, cognoscitur



scitur inde , quòd curva A C esse debeat prima pars Ovalis primi generis , & C Y prima tertiæ , quemadmodum hîc suppositæ fuère : cum aliàs , si minor fuerit , id indicet , quòd C Y debeat esse prima pars Ovalis primi generis , & A C prima pars tertiæ . Et denique si A M æqualis fuerit ipsi $\frac{g^2}{d-c}$, quòd duæ hæc curvæ A C & C Y debeant esse duæ Hyperbolæ .

Possent extendi hæc duo Problemata ad infinitos alios casus , quibus quidem deducendis superfedeo , quòd nullum eorum usum in Dioptricis deprehenderim .

Possẽm quoque ulteriùs progredi , & dicere , cùm una ex vitri superficiebus data est , modò illa sit aut plana , aut à sectionibus Conicis , aut Circulo effecta , quomodo altera ejus superficies confici debeat , ut radios omnes ab uno dato puncto venientes transmittat ad aliud punctum etiam datum . Neque enim hoc ullo modo difficilius est , quàm quod modò explicavi ; immo verò res multò facilior est , quoniam via illuc perveniendi jam aperta est . Verùm malo alios id quærere , ut , si inter investigandum negotii adhuc aliquid repperint , cò pluris inventionem rerum hîc demonstratarum æstiment .

Cæterùm in toto hoc libro locutus sum tantùm de *Quomodo*
I lincis *id omne,*

quod hic
de lineis
curvis, in
plana su-
perficie de-
scriptis,
dictum
fuit, appli-
cari possit
ad illas,
quæ de-
scribuntur
in spatio
trium di-
mensio-
num sive
superficie
aliqua
curva.

lineis curvis quæ in superficie aliqua plana describi possunt; verum facile est, quæ de iis dixi, etiam ad omnes alias referre, quas imaginari possumus formatas esse, motu aliquo ordinato punctorum alicujus corporis in spatio trium dimensionum. Nimirum demittendo duas perpendiculares à quolibet puncto lineæ curvæ, quam considerare volumus, ad duo plana, ad angulos rectos se invicem secantia, unam ad unum, & alteram ad alterum: quippe perpendicularium harum extremitates singulæ duas alias curvas lineas describunt, unam in uno, & alteram in altero plano, quarum puncta omnia modo superius explicato determinari ac referri possunt ad puncta lineæ rectæ, quæ utrique plano est communis, ut hæc ratione puncta curvæ, tres dimensiones habentis, omnino sint determinata. Ita etiam si rectam lineam ducere velimus, quæ hanc curvam in dato puncto ad angulos rectos secet, opus tantum est duas alias rectas lineas ducere, unam in uno, & alteram in altero plano, quarum singulæ singulas curvas ibidem secent in punctis, ubi cadunt perpendiculares, quæ à dato puncto ad utrumque planum sunt deductæ. Etenim postquam duo alia plana, unum super unam, & alterum super alteram, erecta sunt, quæ ad utrumque planum, in quibus lineæ illæ sunt, recta existant, erit horum duorum planorum communis intersectio linea recta quæ sita. Atque ita arbitror me omnia tradidisse Elementa, quæ ad curvarum linearum cognitionem sunt necessaria.

G E O M E T R I Æ

LIBER TERTIUS.

*De Constructione Problematum Solidorum, &
Solida excedentium.*

TAmetsi omnes lineæ curvæ, quæ motu aliquo ordinato describi possunt, in Geometriam sunt recipiendæ, non ideo tamen permissum est uti indifferenter quâlibet, quæ primùm occurrat, ad Problematis cujusque constructionem; sed cura semper adhibenda est, ut simplicissimam, cujus ope id ipsum solvi queat, eligamus. Vbi quidem observandum est, per simplicissimas non solum intelligendas esse illas, quæ omnium facillimè describi possunt; neque quæ propositi Problematis constructionem vel demonstrationem faciliorem reddunt; sed præsertim, quæ simplicissimæ sunt generis, quod ad quantitatem quæsitam determinandam inservire queat.

Quemadmodum, exempli causâ, ad inveniendas tot medias proportionales, quot libuerit, non opinor modum ullum faciliorem dari, nec cujus demonstratio evidentior sit, quàm si curvæ lineæ adhibeantur, quæ per instrumentum XYZ (supra explicatum) describuntur. Etenim si inter YA & YE duas medias proportionales invenire libeat, oportet tantum circulum describere, cujus diameter sit YE , qui curvam AD secet in puncto D , erique YD una ex quæsitis mediis proportionalibus. Cujus rei demonstratio ex sola instrumenti hujus ad lineam YD adplicatione perspicua est.

I 2

Nam

*Quenam
curva li-
neæ adhi-
beri possint
ad construc-
tionem cuius-
que Proble-
matis.*

*Exem-
plum con-
cernens
invenio-
nem plu-
rium me-
diarum
proportio-
nalarum.*

construendo Problemate aliquo per genus linearum simplicius, quàm natura ejus permittit, defudaret.

Quocirca ut hîc adducere possim regulas quasdam, *De natura*
quibus utrumque peccatum evitetur, opus est, ut in ge-
nere aliquid dicam de natura *Æquationum*; hoc est, de
summis, quæ ex pluribus terminis sunt compositæ, par-
tim cognitis, partim verò incognitis, quorum alii aliis
sunt æquales, vel potiùs, qui omnes simul considerati
nihilò sunt æquales. Quippe sæpe præstat. illos hâc ra-
tione considerare.

Sciendum itaque, quòd incognita quantitas in qua-
libet *Æquatione*, * tot diversas radices seu diversos va-
lores habere possit, quot ipsa habet dimensiones. Nam
si, exempli gratiâ, x supponatur æqualis 2, seu $x - 2$
æqualis nihilo; & rursus $x \propto 3$, seu $x - 3 \propto 0$; & mul-
tiplicetur $x - 2 \propto 0$ per $x - 3 \propto 0$: habebitur $xx - 5x$
 $+ 6 \propto 0$, seu $xx \propto 5x - 6$. quæ *Æquatio* est, in qua
quantitas x valet 2, & præterea etiam 3. Quòd si rur-
sus fiat $x \propto 4$, atque $x - 4 \propto 0$ multiplicetur per $xx -$
 $5x + 6 \propto 0$, producet $x^3 - 9xx + 26x - 24 \propto 0$.
quæ alia est *Æquatio*, in qua x habens tres dimensiones,
tres quoque habet valores, qui sunt 2, 3, & 4.

Verùm sæpe accidit, quòd quædam harum radicum
sint falsæ, seu minores quàm nihil: ut, si supponatur x
designare quoque defectum alicujus quantitatis, ut-
puta 5, ita ut habeatur $x + 5 \propto 0$, quæ multiplicata per
 $x^3 - 9xx + 26x - 24 \propto 0$, faciat $x^4 - 4x^3 - 19xx$
 $+ 106x - 120 \propto 0$, pro *Æquatione*, in qua quatuor
sunt radices, nimirum tres veræ, quæ sunt 2, 3, & 4, atque
una falsa, quæ est 5.

Vnde liquidò constat, quòd *Æquationis* summa,
quæ plures radices continet, dividi semper possit per
binomium, quod compositum est ex quantitate inco-
gnita,

cujus *Æ-*
quationis,
quando co-
gnoscitur
aliqua ex
ejus radi-
cibus.

C Quā ra-
tione in-
dagari
queat,
num data
quantitas
sit valor
alicujus
radicis.

D Quot ha-
beri pos-
sint veræ
radices in
qualibet
Æquatio-
ne.

E Quomodo
faciendum
sit, ut fal-
sæ radices
Æquatio-
nis eva-
dant ve-
ræ, & ve-
ræ falsæ.

gnita, minus valore alicujus ex veris radicibus, quæcunque illa tandem sit, aut plus valore alicujus ex falsis. cujus divisionis ope dimensiones ejus in tantum diminuantur.

Et vicissim si *Æ*quationis summa dividi non possit per binomium, constans ex quantitate incognita + vel — certa alia quadam quantitate; indicio est, quantitatem hanc non esse valorem alicujus ex ejus radicibus. Quemadmodum hæc ultima $x^4 - 4x^3 - 19xx + 106x - 120 \propto 0$, dividi quidem potest per $x - 2$, per $x - 3$, per $x - 4$, & per $x + 5$; sed nullo modo per $x +$ vel — quacunque alia quantitate. Id quod ostendit, ipsam non posse admittere alias radices præter hæc quatuor 2, 3, 4, & 5.

Ex quibus etiam cognoscitur, quot veræ & quot falsæ radices in unaquaque *Æ*quatione haberi possint. Nimirum, tot in ea veras haberi posse, quot variationes reperiuntur signorum + & —; & tot falsas, quot vicibus ibidem deprehenduntur duo signa +, vel duo signa —, quæ se invicem sequuntur. Ut in ultima, quia post + x^4 habetur — $4x^3$, quæ est una variatio signi + in —, & post — $4x^3$ habetur — $19xx$, quæ sunt duo signa similia; & post — $19xx$ habetur + $106x$; & post + $106x$ habetur — 120 , quæ sunt adhuc duæ aliæ variationes: cognoscitur quòd illa tres admittat veras radices, & unam falsam, propter duo signa — terminorum $4x^3$ & $19xx$, quæ se invicem sequuntur.

Porro facile est efficere, ut in una eademque *Æ*quatione radices omnes, quæ falsæ erant, evadant veræ; & ut eadem operâ omnes illæ, quæ veræ erant, falsæ fiant. Nimirum mutando signa omnia + & —, quæ in 2^{da}, 4^{ta}, 6^{ta} aliisve locis reperiuntur, qui per numeros pares designantur; reliquis 1^{mi}, 3^{mi}, 5^{to} similibusque locorum,

rum, qui per impares numeros designantur, non mutatis.

Vt si loco

$+x^4 - 4x^3 - 19xx + 106x - 120 \infty 0$,
scribatur

$+x^4 + 4x^3 - 19xx - 106x - 120 \infty 0$,
habebitur Aequatio, in quâ una tantum est vera radix,
quæ est 5, & tres falsæ, quæ sunt 2, 3, & 4.

Quodd si verò non cognito radicem alicujus Aequationis valore, ipsas augere vel diminuere velimus quantitate aliquâ cognitâ, oportet tantum in locum incogniti termini substituere alium, qui eadem hâc quantitate major sit vel minor, eumque ubique primi loco subrogare.

*Quomodo
augeri vel
diminui
possint A-
equationis
radices,
ipsis non
cognitis.*

Vt si augere velimus 3^{am} radicem hujus Aequationis $x^4 + 4x^3 - 19xx - 106x - 120 \infty 0$, sumenda est y loco x , & cogitandum, quantitatem hanc y majorem esse quàm x , excessu 3, ita ut $y - 3$ ipsi x sit æqualis; loco autem xx scribendum est quadratum ex $y - 3$, quod est $yy - 6y + 9$; & loco x^3 sumendus est ejus cubus, qui est $y^3 - 9yy + 27y - 27$; & denique loco x^4 ponendum est ejus quadrato-quadratum, quod est $y^4 - 12y^3 + 54yy - 108y + 81$. Vnde si scribamus summam præcedentem, substituendo ubique y pro x , inveniatur

$$\begin{array}{r} y^4 - 12y^3 + 54yy - 108y + 81 \\ + 4y^3 - 36yy + 108y - 108 \\ - 19yy + 114y - 171 \\ - 106y + 318 \\ - 120 \end{array}$$

$y^4 - 8y^3 - 1yy + 8y^2 \infty 0$, vel $y^3 - 8yy - 1y + 8 \infty 0$.
ubi vera radix, quæ erat 5, jam est 8, propter ternarium ipsi additum.

Sin

Sin verò contra ternario radicem ejusdem Equationis diminuere velimus, facienda est $y + 3 \propto x$, & $yy + 6y + 9 \propto xx$. Atque ita porrò. Ita ut loco

$$x^4 + 4x^3 - 19xx - 106x - 120 \propto 0.$$

scribatur

$$\begin{array}{r} y^4 + 12y^3 + 54yy + 108y + 81 \\ + 4y^3 + 36yy + 108y + 108 \\ - 19yy - 114y - 171 \\ - 106y - 318 \\ - 120 \end{array}$$

$$y^4 + 16y^3 + 71yy - 4y - 420 \propto 0.$$

*Quid, au-
gendo ve-
ras radi-
ces, falsæ
diminuan-
tur, &
contra.*

Vbi notandum est, dum veræ radices alicujus Equationis augentur, falsas eadem quantitate diminui; & contra, dum veræ diminuantur, falsas augeri: Et quidem tum has tum illas prorsus evanescere, si quantitate ipsis æquali diminuantur; si verò quantitate ipsas superante, tum ex veris falsas evadere, & ex falsis veras. Ut hinc, augendo ternario veram radicem, quæ erat 5, diminuitur ternario quælibet ex falsis; ita ut illa, quæ erat 4, non valeat plus quàm 1; & quæ erat 3, sit cyphra seu 0; & quæ erat 2, facta sit vera, sitque 1 (cum $-2 + 3$ faciat $+1$.) Adeò ut in hac Equatione $y^3 - 8yy - 1y + 8 \propto 0$, non plures quàm tres sint radices, inter quas duæ veræ existunt, utpote 1 & 8; & una falsa, quæ etiam est 1: Et in hac altera $y^4 + 16y^3 + 71yy - 4y - 420 \propto 0$, una tantùm vera, quæ est 2, (quia $+5 - 3$ facit $+2$;) & tres falsæ, quæ sunt 5, 6, & 7.

*Quæ ra-
tione se-
cundus
terminus
Equatio-
nis tolli
possit.*

G

Iam verò beneficio modi hujus mutandi valorem radicem, ipsis non cognitis, duo fieri possunt, quæ in sequentibus usum aliquem habebunt. Vnum est, quòd semper secundus terminus Equationis, quam examinamus, tolli possit: Nimirum, diminuendo veras ra-
dices,

dices, quantitate cognita secundi termini divisâ per numerum dimensionum primi, si unus ex hisce duobus terminis notatus fuerit signo +, & alter signo —; aut augendo illas eâdem quantitate, si uterque eodem signo fuerit adfectus.

Vt ad tollendum secundum terminum ultimæ Aequationis

$y^4 + 16y^3 + 71yy - 4y - 420 \propto 0$,
divisis 16 per 4, propter 4^{am} dimensiones termini y^4 ,
proveniet rursus 4: hinc facio $z = 4 \propto y$, & scribo,

$$\begin{array}{r} z^4 - 16z^3 + 96zz - 256z + 256 \\ + 16z^3 - 192zz + 768z - 1024 \\ + 71zz - 568z + 1136 \\ - 4z + 16 \\ - 420 \end{array}$$

$$z^4 * - 25zz - 60z - 36 \propto 0.$$

ubi vera radix, quæ erat 2, est 6, cum ipsa quaternario sit aucta; & falsæ, quæ erant 5, 6, & 7, tantummodo sunt 1, 2, & 3, cum illæ quaternario singulæ sint diminutæ.

Eodem modo si tollere velimus secundum terminum Aequationis

$$x^4 - 2ax^3 + \frac{1}{2}a^2xx - 2a^3x + a^4 \propto 0:$$

quoniam divis 2a per 4, quotiens fit $\frac{1}{2}a$, faciendum est $z + \frac{1}{2}a \propto x$, ac scribendum

$$\begin{array}{r} z^4 + 2az^3 + \frac{1}{2}aazzz + \frac{1}{2}a^3z + \frac{1}{16}a^4 \\ - 2az^3 - 3aazzz - \frac{1}{2}a^3z - \frac{1}{4}a^4 \\ + 2aazzz + 2a^3z + \frac{1}{2}a^4 \\ - cczz - accz - \frac{1}{4}aacc \\ - 2a^3z - a^4 \\ + a^4 \end{array}$$

$$z^4 * + \frac{1}{2}aazzz - a^3z + \frac{1}{16}a^4 \propto 0:$$

$$- cc - acc - \frac{1}{4}aacc$$

.

K

ubi

ubi postquam innotuit valor ipsius x , addendo ipsi $\frac{1}{2}x$, habebitur valor radicis x .

*Quo pacto
fiat ut
falsæ ra-
dices æ-
quationis
evadant
veræ, nec
tamen ve-
ræ fiant
falsæ.*

Alterum, quod hîc postea usum aliquem habebit, est, quòd, dum augetur valor verarum radicum, quantitate majore aliquâ ex falsis, radices omnes veræ semper fieri possint, ita ut non habeantur duo signa $+$, aut duo signa $-$, quæ se invicem sequantur; & insuper, ut quantitas cognita tertii termini quadrato semissis secundi major sit. Nam licet id fiat, etiamsi falsæ radices incognitæ sint; tamen facile est de illarum magnitudine præterpropter judicare, atque quantitatem aliquam assumere, quæ ipsas in tantum vel plus superet, quantum ad effectum hunc requiritur.

H Vt si habeatur.

$x^6 + nx^5 - 6nnx^4 + 36n^3x^3 - 216n^4x^2 + 1296n^5x - 7776n^6 \infty 0$;
faciendo $y = 6n \infty x$, invenietur

$$\begin{array}{r} y^6 - 36n^3y^5 + 540nn^3y^4 - 4320n^3y^3 + 19440n^4y^2 - 46656n^5y + 46656n^6 \\ + \quad n^3 \left\{ \begin{array}{l} + 540nn^3 \\ - 30nn^3 \\ - 6nn^3 \end{array} \right\} y^4 + \left\{ \begin{array}{l} 4320n^3 \\ + 360n^3 \\ + 144n^3 \\ + 36n^3 \end{array} \right\} y^3 + \left\{ \begin{array}{l} 19440n^4 \\ - 2160n^4 \\ - 1296n^4 \\ - 648n^4 \\ - 216n^4 \end{array} \right\} y^2 + \left\{ \begin{array}{l} - 46656n^5 \\ + 6480n^5 \\ + 5184n^5 \\ + 3888n^5 \\ + 2592n^5 \\ + 1296n^5 \end{array} \right\} y + \left\{ \begin{array}{l} + 46656n^6 \\ - 7776n^6 \\ - 7776n^6 \\ - 7776n^6 \\ - 7776n^6 \\ - 7776n^6 \end{array} \right\} \end{array}$$

$$y^6 - 35n^3y^5 + 504nn^3y^4 - 3780n^3y^3 + 15120n^4y^2 - 27216n^5y + 27216n^6 \infty 0.$$

Vbi manifestum est, quòd $504nn$ (quantitas cognita tertii termini) major sit quadrato à $\frac{1}{2}n$ (semisse quantitatatis cognitæ secundi termini.) Neque ullus alius est casus, in quo quantitas, quâ veræ radices augentur, ad hoc efficiendum, ratione earum quæ datæ sunt, major requiritur.

Quoniam autem ultimus terminus hîc nullus reperitur, si id quidem non desideretur, augendus est adhuc aliquantillo valor radicum, quod sanè tam parum esse non potest, quin id ad effectum hunc sit satis.

*Quomodo
faciendum
sit, ut loca
omnia*

Eodem modo si augere velimus dimensionum numerum alicujus Æquationis, & facere ut loca omnia termino-

mino-

minorum ejus sint repleta (ut si loco x^4 **** — $b \infty 0$, *Æquationis sint completa.*
desideretur Æquatio, in quâ incognita quantitas sex dimensiones habeat, & in qua nullus terminus desit): oportet primum pro x^4 **** — $b \infty 0$, scribere x^6 **** — $b x \infty 0$; deinde factâ $y - a \infty x$, habebitur
 $y^6 - 6 a y^5 + 15 a^2 y^4 - 10 a^3 y^3 + 15 a^4 y^2 - 6 a^5 y + a^6 \infty 0$.

Vbi liquet, quòd, quantula etiam supposita fuerit quantitas a , omnia tamen Æquationis loca non desinant esse repleta.

Præterea possunt quoque radices alicujus Æquationis, etiam si sint incognitæ, multiplicari aut dividi per quantitatem aliquam cognitam, quam libuerit. *Quomodo multiplicari vel dividi possint Æquationis radices, ipsis incognitis.*

Quod fit, supponendo, quantitatem incognitam, multiplicatam, aut divisam per quantitatem, quæ multiplicare aut dividere debet radices, esse æqualem alicui alteri. Deinde multiplicando aut dividendo quantitatem cognitam secundi termini per hanc ipsam, quæ multiplicare aut dividere debet radices; & per ipsius quadratum, quantitatem tertii; & per ipsius cubum, quantitatem quarti, atque ita porro usque ad ultimum. Id quod inservire potest, ut ad integros & rationales numeros reducantur fracti, aut sæpe etiam surdi, qui in Æquationum terminis reperiuntur. *Quâ ratione fracti alicujus Æquationis reducantur ad integros.*

Vt si habeatur

$$x^3 - x x \sqrt{3} + \frac{2}{27} x - \frac{8}{27 \sqrt{3}} \infty 0,$$

& ipsius loco alia desideretur, cujus omnes termini per numeros rationales exprimantur, oportet supponere $y \infty x \sqrt{3}$, & multiplicare per $\sqrt{3}$ quantitatem cognitam secundi termini, quæ quoque est $\sqrt{3}$; & per ipsius quadratum, quod est 3, quantitatem tertii, quæ est $\frac{2}{27}$; & per ipsius cubum, qui est $3 \sqrt{3}$, quantitatem ultimi, videlicet $\frac{8}{27 \sqrt{3}}$, id quod facit $y^3 - 3 y y + \frac{2}{3} y - \frac{8}{3} \infty 0$.

K 2

Dein-

Deinde si hujus loco adhuc alia requiratur, in qua quantitates omnes cognitæ solis integris numeris exprimentur; supponendo $z \propto 3y$, & multiplicando 3 per 3, $\frac{2^6}{5}$ per 9, & $\frac{1}{5}$ per 27, fiet Æquatio

$z^3 - 9zx + 26z - 24 \propto 0$. Vbi, cum radices sint 2, 3, & 4, sequitur alterius radices esse $\frac{1}{2}$, 1, & $\frac{3}{2}$; & prioris Æquationis $\frac{1}{2}\sqrt{3}$, $\frac{1}{2}\sqrt{3}$, & $\frac{1}{2}\sqrt{3}$.

*Quo pacto
quantitas
cognita a
licujus
termini
Æquationis
æqualis
fit
cuiusque
alteri da-
ta.*

Quæ operatio servire quoque potest ad faciendam quantitatem cognitam alicujus termini in Æquatione æqualem alicui alteri datæ. Vt si habeatur

$x^3 - b b x + c^3 \propto 0$, & ipsius loco alia sit invenienda Æquatio, in qua quantitas cognita tertii termini, nimirum ea, quæ hic est bb , sit $3aa$, non autem bb : supponendum est $y \propto x \sqrt{\frac{3aa}{bb}}$, deinde verò scribendum,

K

$$y^3 - 3aay + \frac{3a^3c^3}{b^3} \sqrt{3} \propto 0.$$

*Quid ra-
dices, tam
veræ
quam fal-
sæ, pos-
sint esse
reales, vel
imagina-
riæ.*

Cæterum radices tam veræ quàm falsæ non semper sunt reales, sed aliquando tantum imaginariæ: hoc est, semper quidem in qualibet Æquatione tot radices quot dixi, imaginari licet; verum nulla interdum est quantitas, quæ illis, quas imaginamur, responderet. Quemadmodum, tamen si tres imaginari possimus in hac, $x^3 - 6xx + 13x - 10 \propto 0$; tamen una tantum est realis; nempe 2; & quod ad reliquas duas attinet, quamvis illæ augeantur, diminuantur, aut multiplicentur, sicut jam exposui; tamen non nisi imaginariæ fieri possunt.

*Reductio
Æquationis
Cubicarum,
cuius Pro-
blema est
placuit.*

Iam verò, postquam ad inveniendam constructionem alicujus Problematis pervenimus ad Æquationem, in quâ incognita quantitas tres habet dimensiones: Primum si quantitates cognitæ, quæ in ea reperiuntur, numeros fractos continent, ipsi ad integros, beneficio multiplicationis, modò explicatæ, reducendi sunt; At si surdos continent, tum quantum fieri potest, similiter ad

— 16, & provenit + 8 yy , reponendum in quotiente. Multiplicando verò hoc ipsum per yy , exsurgit — 8 y^4 , addendum termino dividendo, qui etiam est — 8 y^4 , quæ quidem simul conficiunt — 16 y^4 , quod per — 16 divido, & fit + 1 y^4 pro quotiente, & — 1 y^6 addendum ipsi + 1 y^6 , id quod facit 0, monstratque divisionem esse ad finem perductam. Quòd si verò quantitas aliqua superfuisset, vel aliquis præcedentium terminorum absque fractione dividi non potuisset, manifestum fuisset, divisionem nullo modo fieri potuisse.

Similiter si habeatur $y^6 + \frac{aa}{1cc} y^4 - \frac{a^4}{c} yy - \frac{2a^4cc}{aac^4} \infty 0$.

ultimus terminus absque fractione dividi potest per a , aa , $aa + cc$, $a^3 + acc$, & similes. Sed duas sufficit ex illis considerare, nempe aa , & $aa + cc$; aliæ enim, cum in quotiente plures paucioresve dimensiones exhibeant, quàm quidem in quantitate cognita penultimi termini
 M reperiuntur, impedirent, ut divisio fieri posset. Vbi notandum, me ipsius y^6 dimensiones tantùm pro tribus dimensionibus habere, cum non reperiatur y^5 , nec y^3 , nec y in tota summa. Examinando igitur binomium $yy - aa - cc$, invenitur, divisionem per illud fieri posse, hoc modo:

$$\begin{array}{r}
 + y^6 + \frac{aa}{1cc} y^4 - \frac{a^4}{c} yy - \frac{2a^4cc}{aac^4} \infty 0, \\
 \hline
 - y^6 - 1aa - \frac{a^4}{c} \\
 \hline
 + cc - \frac{aa}{c} - \frac{a^4cc}{aac^4} \\
 \hline
 0 - aa - cc - \frac{aa}{c} - \frac{a^4cc}{aac^4} \\
 \hline
 + y^4 + \frac{2aa}{cc} yy + \frac{a^4}{aac^4} \infty 0.
 \end{array}$$

Id quod monstrat radicem quæsitam esse $aa + cc$. Quemadmodum facilè per multiplicationem probari potest.

At

At verò si nullum inveniatur binomium, quod ita ^N totam *Æquationis* propositæ summam dividere possit, ^{Quenam Proble-} certum est, ^{mata sint} Problema quod ab ea dependet, esse Solidum. ^{Solida,} Nec minus vitium est, constructionem ejus postea per ^{Æquatione} rectas lineas & circulos tentare, quàm ad constructionem illorum, in quibus non nisi circulis est opus, sectiones Conicas adhibere: siquidem quicquid ignorantiam aliquam testatur, peccatum dici meretur.

Porro si habeatur *Æquatio*, in quâ incognita quantitas quatuor habeat dimensiones: eodem modo, sublati primùm surdis & fractis numeris; (si qui sunt) videndum est, num inveniri possit binomium, compositum ex incognita quantitate + vel — quantitate aliqua, quæ absque fractione ultimum terminum dividit, quod dividat totam summam. Hoc enim si inveniatur; vel quantitas cognita hujus binomii erit radix quæsitâ; vel saltem post divisionem hanc relinquentur tantùm in *Æquatione* tres dimensiones, ita ut illa deinde rursus eodem modo sit examinanda. Quod si verò tale binomium non inveniatur, oportebit augendo aut diminuendo valorem radices, secundum summæ terminum tollere, modo paulò ante explicato: & deinde ipsam ad aliam reducere, quæ tres duntaxat dimensiones contineat. Id quod hoc modo fit:

loco $+x^4$ *. $p x x . q x . r \infty 0$,
scribendum est.

$$+y^6. 2py^4 + \frac{pp}{4r} yy - qq \infty 0.$$

Et quod ad signa + & — attinet, quæ omisi, si habeatur + p in *Æquatione* præcedente, in hac ponendum est + $2p$; aut si habeatur — p , ponendum est — $2p$. & contra, si habeatur ibi + r , ponendum hic est — $4r$; aut si habeatur ibi — r , ponendum hic est + $4r$. & sive illic

Reductio
Æquationum
quatuor
dimensionum,
cum
Problema
est
Planum.
Er
guenam
illa
sint,
quæ
Solida
sunt
dicenda.

Reductio
Æquationis
Quadrato-
quadratæ
ad
Cubicam.

illuc fuerit $+q$, five $-q$, semper tamen hic ponendum est $-qq$, & $+pp$. saltem si x^4 & y^6 signis $+$ notatæ supponantur. quippe contrarium fieri deberet, si supponeretur ibi signum $-$.

Exempli causâ, si habeatur $+x^4 - 4xx - 8x + 35 \infty 0$, scribendum ejus loco est $y^6 - 8y^4 - 124yy - 64 \infty 0$. Cum enim quantitas, quam nominavi p , sit -4 , ponendum est $-8y^4$ pro $2py^4$. & cum illa, quam vocavi r , sit 35 , ponendum est $+16yy$, hoc est, $-124yy$, loco $+ppyy$. Et denique cum q sit 8 , ponendum est -64 , pro $-qq$.

Eodem modo pro $+x^4 - 17xx - 20x - 6 \infty 0$, scribendum est $+y^6 - 34y^4 + 313yy - 400 \infty 0$. Nam 34 est duplum ipsius 17 , & 313 est hujus quadratum junctum quadruplo ipsius 6 , & 400 est quadratum ipsius 20 .

Similiter quoque loco

$$+z^4 - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}az - \frac{1}{2}acc - \frac{1}{2}aacc \infty 0.$$

scribendum est

$$y^6 - \frac{1}{2}ccy^4 + \frac{1}{2}a^2yy - \frac{1}{2}a^2cc \infty 0.$$

quippe p est $+\frac{1}{2}aa - cc$, & pp est $\frac{1}{2}a^4 - aacc + c^4$, & $4r$ est $-\frac{1}{2}a^4 + aacc$, ac tandem $-qq$ est $-a^6 - 2a^4cc - aac^4$.

Postquam igitur Æquatio sic ad tres dimensiones est reducta, quærendus est valor ipsius yy , methodo jam explicatâ. Quod si verò ita inveniri nequeat, non opus erit ulterius progredi. Infallibiliter enim inde sequitur, Problema esse Solidum. Sin autem inveniat, poterit ejus beneficio Æquatio præcedens in duas alias dividi, in quarum utrâque incognita quantitas duas tantum dimensiones habeat, quarumque radices ab il-

lius

lius radicibus non differant. Nimirum loco *Æquationis*

$+x^4 * . pxx . qx . r \infty 0$,
scribendæ sunt hæ duæ aliæ

$$+xx - yx + \frac{1}{2}yy . \frac{1}{2}p . \frac{q}{2y} \infty 0, \&$$

$$+xx + yx + \frac{1}{2}yy . \frac{1}{2}p . \frac{q}{2y} \infty 0.$$

Et quod attinet ad signa $+$ & $-$, quæ omisi, si in *Æquatione* præcedente habeatur $+p$, ponendum erit in utraque harum duarum $+\frac{1}{2}p$; & $-\frac{1}{2}p$, si in priore habeatur $-p$. Ponendum verò est $+\frac{q}{2y}$ in una, ubi habetur $-yx$; & $-\frac{q}{2y}$ in altera, ubi habetur $+yx$; pro ut habetur $+q$ in prima. Et contra, si habetur ibi $-q$, ponendum est $-\frac{q}{2y}$ in illa, ubi habetur $-yx$; & $+\frac{q}{2y}$ in altera, ubi habetur $+yx$. Vnde consequenter facile est omnes *Æquationis* propositæ radices cognoscere, atque hinc Problema, cujus solutionem continet, construere, adhibendo tantùm circulos, & lineas rectas.

Exempli gratiâ, quia pro $x^4 * - 17xx - 20x - 6 \infty 0$ ponendo $y^6 - 34y^4 + 313yy - 400 \infty 0$ invenitur yy esse 16: hinc loco *Æquationis* $+x^4 * - 17xx - 20x - 6 \infty 0$ scribendæ sunt hæ duæ $+xx - 4x - 3 \infty 0$ & $+xx + 4x + 2 \infty 0$. Nam y est 4, $\frac{1}{2}yy$ est 8, p est 17, & q est 20; ita ut $+\frac{1}{2}yy - \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y}$ faciat -3 , & $+\frac{1}{2}yy - \frac{1}{2}p + \frac{q}{2y}$ faciat $+2$. E quibus binis *Æquationibus* si extrahantur radices, invenientur eadem omnes, quæ eliciuntur ex ea, in qua habetur x^4 . Nimirum una vera, quæ est $\sqrt{7+2}$, & tres falsæ, quæ sunt $\sqrt{7-2}$, $2+\sqrt{2}$, & $2-\sqrt{2}$.

Similiter cùm habetur $x^4 * - 4xx - 8x + 35 \infty 0$:

L

quo-

quoniam radix ex $y^6 - 8y^4 - 124yy - 64 \propto 0$ rursus est 16, hinc scribere oportet

$$xx - 4x + 5 \propto 0, \& xx + 4x + 7 \propto 0.$$

Hic enim $+\frac{1}{2}yy - \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y}$ facit 5, & $+\frac{1}{2}yy - \frac{1}{2}p + \frac{q}{2y}$ facit 7. Et quandoquidem nulla in utraque harum Æquationum invenitur radix, sive vera, sive falsa, liquidò constat, quatuor radices Æquationis, ex qua deductæ sunt, imaginarias esse, & Problema, cujus gratiâ Æquatio inventa est, naturâ suâ esse Planum; sed nullâ ratione construi posse, cum datæ quantitates conjungi nequeant.

Sic etiam cum habetur

$$z^4 + \frac{1}{2}aa - a^3 - ccz - \frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{2}aacc \propto 0:$$

quia pro yy invenitur $aa + cc$, scribendum est

$$zz - z\sqrt{aa + cc} + \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc} \propto 0, \& \\ zz + z\sqrt{aa + cc} + \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc} \propto 0.$$

Nam y est $\sqrt{aa + cc}$, & $+\frac{1}{2}yy + \frac{1}{2}p$ est $\frac{1}{2}aa$, & $\frac{q}{2y}$ est $\frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}$. Vnde cognoscitur, valorem ipsius z esse $\frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} + \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$, vel $\frac{1}{2}\sqrt{aa + cc} - \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$.


Et quandoquidem supra feceramus $z + \frac{1}{2}a \propto x$, innotescit, quantitatem x , ad quam cognoscendam omnes hæc operationes instituimus, esse

$$+\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc} - \sqrt{\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}.$$

Verum enimverò ut utilitas hujus regulæ melius cognosci possit, operæ pretium est, ut illam Problemati alicui resolvendo applicemus.

*Exem-
plum
ostendens
usum hæ-*

Datis quadrato A D, & rectâ lineâ B N; oporteat producere latus A C usque ad E, ita ut E F, ducta ab E versùs.



versus B, sit æqualis ipsi NB. Docet Pappus, quòd, <sup>unde velu-
Elionon.</sup> postquam primùm latus BD productum est usque in G, ita ut DG æquetur DN, circulusque descriptus est, cujus diameter BG, producendum deinde tantum sit latus AC, donec circumferentiæ hujus circuli occurrat in puncto E, quod requirebatur. Quæ sanè constructio investigatu iis, quos lateret, difficilis satis foret: Etenim quærendo illam per methodum hîc propositam, nunquam certè cogitarent assumendam esse DG pro quantitate incognita, sed potiùs CF vel FD vel CE: cum hæ tales sint, quæ facillimè omnium nos ad Æquationem perducant; sed ad Æquationem quæ non ita facilè absque regula, quam jam exposui, explicari posset. Quippe ponendo a pro BD vel CD, c pro EF, & x pro DF, sit $CF \propto a - x$; Et ut CF seu $a - x$ est ad FE seu c , sic FD seu x est ad BF, quæ proinde erit $\frac{cx}{a-x}$. Deinde propter triangulum rectangulum BDF, cujus unum latus est x , & alterum a , quadrata ipsorum, utpote $xx + aa$, æqualia sunt quadrato basis, quod est $\frac{c^2xx}{xx - 2ax + aa}$. Vnde multiplicando totum per $xx - 2ax + aa$, invenietur Æquatio $x^4 - 2ax^3 + 2aaxx - 2a^3x + a^4 \propto ccxx$, vel $x^4 - 2ax^3 + \frac{2a^2}{c}xx - 2a^3x + a^4 \propto 0$.

- v Vbi per præcedentes regulas cognoscitur, radicem ejus, quæ est longitudo lineæ DF, esse

$$\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc} - \sqrt{\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}.$$

- Quòd si verò BF vel BE poneretur pro quantitate incognita, perveniremus rursus ad Æquationem, in qua quatuor dimensiones essent, sed quæ faciliùs reduci posset; & ad quam etiam satis faciliè perveniretur. Cum aliàs, si pro ea supponeretur DG, multò difficiliùs ad Æquationem, sed quæ simplicissima foret, perveniremus. Quod quidem hîc refero, ut vobis indicem, quòd, cùm Problema propositum non est Solidum, si quærendo illud unâ viâ ad Æquationem deveniatur valde compositam, tum communiter aliâ viâ ad simpliciorē Æquationem perveniri possit.

Possẽm præterea hîc diversas regulas adjungere, reducendi Æquationes, quæ ad Cubum vel Quadrato-quadratum adscendunt, verùm superflux forent: quandoquidem constructionem eorum Problematum, quæ Plana sunt, semper per hasce invenire licet.

*Regula
generalis
reducendi
Æquatio-
nes omnes,
quæ Qua-
drato-
quadrato-
rum asce-
dunt.*

Possẽm quoque alias asserre pro Æquationibus, quæ ad Surdesolidum, vel Quadrato-cubum, aut altiùs asurgunt; sed malo omnes sub una comprehendere, dicendo in genere: quòd, postquam aliquis illas ad eandem formam, quam habent illæ, quæ æquè multis dimensionibus constant, & ex multiplicatione duarum aliarum, pauciorum dimensionum, producantur, reducere conatus fuerit, atque modos omnes, quibus hæc multiplicatio fieri possit, enumeraverit, nec juxta aliquem ex ipsis succedere compererit, asseverandum sit, illas ad simplices reduci non posse. Ita ut, si incognita quantitas 3 vel 4 dimensiones habeat, Problema, in cuius gratiam Æquatio quæritur, Solidum existat; & si 5 vel

vel 6 dimensiones habeat, uno gradu magis sit compositum. Et sic de cæteris.

Cæterum omisi hîc demonstrationes plurimorum, quæ dixi: quoniam ita faciles mihi visæ sunt, ut, si modò operam, methodicè examinandi, num erraverim, impenderitis, illæ suâ sponte vobis sint occursuræ. quin etiam utiliùs erit ipsas hâc ratione, quàm si legantur, addiscere.

Iam verò postquam compertum est Problema propositum esse Solidum; sive *Æquatio*, per quam illud quæritur, ad Quadrato-quadratum adscendat; sive non altiùs quàm ad Cubum assurgat: potest semper radix ejus inveniri per aliquam trium Conicarum Sectionum, quæcunque illa tandem sit; aut etiam per ipsarum particulam aliquam, quantumlibet exiguam, nec utendo nisi rectis lineis & circulis. Verùm suffecerit regulam generalem hîc adducere, inveniendi radices omnes operæ Parabolæ, quandoquidem hæc aliquo modo est simplicissima.

Primò igitur tollendus est secundus *Æquationis* propositæ terminus, modò jam non abfuerit, atque ita *Æquatio* reducenda ad hanc formam: $z^3 \propto *apz. a a q$, si incognita quantitas tres tantùm dimensiones habeat; aut ad hanc: $z^4 \propto *.apzz. a a qz. a^3 r$, si quatuor obtineat dimensiones; Seu sumendo a pro unitate, ad hanc: $z^3 \propto *.pz.q$; aut ad hanc $z^4 \propto *.pz.z.qz.r$.

Deinde supponendo Parabolam F A G jam descriptam esse, & axem ejus esse A C D K L, latusque rectum a seu 1 , cujus A C sit dimidium, & denique punctum C esse intra hanc Parabolam, cujus vertex sit A: Oportet facere C D $\propto \frac{1}{2}p$, eamque sumere in linea A C, continuata versùs C, si in *Æquatione* habeatur $+p$; sed versùs alteram partem, si habeatur $-p$. Porro è puncto

Si itaque juxta hanc regulam inter lineas a & q duas libeat medias proportionales invenire, nemo ignorat, ponendo χ pro una, esse ut a ad χ sic χ ad $\frac{3}{a}$, & $\frac{3}{a}$ ad $\frac{\chi}{a}$; ita ut habeatur Aequatio inter q & $\frac{\chi^3}{a}$, utpote, $\chi^3 \propto a a q$. Deinde descripta Parabolâ $F A G$, unâ cum segmento sui axis $A C$, quod est $\frac{1}{2}a$, semissis nempe lateris recti, erigenda est ex puncto C perpendicularis $C E$, æqualis $\frac{1}{2}q$, atque ex centro E per A describendus circulus $A F$, ut obtineantur $F L$ & $L A$, quæ mediæ quæsitæ.

Similiter si dividere velimus angulum $N O P$, five arcum, portionemve circuli $N Q T P$ in tres æquales partes; si sumatur $N O \propto 1$ pro radio circuli, & $N P \propto q$ pro subtensa arcus dati, ac $N Q \propto \chi$ pro subtensa trientis hujus arcus, exsurget Aequatio $\chi^3 \propto 3\chi - q$. Etenim ductis lineis $N Q$, $O Q$, & $O T$; si $Q S$ parallela fiat ipsi $T O$, patet, quod, sicut $N O$ est ad $N Q$, sic $N Q$ sit ad $Q R$, & $Q R$ ad $R S$; adeo ut, cum $N O$ sit 1 , & $N Q \chi$, $Q R$ futura sit $\chi\chi$, & $R S \chi^3$. Et quia tantum $R S$ seu χ^3 impedit, quod minus linea $N P$, quæ est q , tripla sit lineæ $N Q$, quæ est χ , habebitur

$$q \propto 3\chi - \chi^3, \text{ vel } \chi^3 \propto 3\chi - q$$

Deinde descripta Parabolâ $F A G$, in qua $C A$ sit æqualis semissi lateris recti principalis, si sumatur $C D \propto \frac{1}{2}$, & perpendicularis $D E \propto \frac{1}{2}q$; secabit circulus $F A g G$, centro E per A descriptus, hanc Parabolam in tribus punctis F, g , & G , non numerato puncto A , quod est ejus vertex. Id quod indicat in hac Aequatione tres haberi radices, nimirum duas $G K$ & $g k$, quæ veræ sunt, & tertiam, nempe $F L$, quæ est falsa; Atque ex hisce duabus veris minorem $g k$ illam esse, quam pro quæsitâ linea $N Q$ sumere oportet. Altera enim $G K$, æqualis

M 2

est

$$z^3 \propto^* -pz + q.$$

$$z^3 \propto^* +pz + q.$$

$$z^3 \propto^* +pz - q.$$

Si autem habeatur $z^3 \propto^* -pz + q$, regula, cujus y inventionem Cardanus cuidam, Scipioni Ferreo, tribuit, nos docet, radicem esse

$$z \propto \sqrt[3]{C + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}} - \sqrt[3]{C - \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}.$$

Quemadmodum etiam, si habeatur $z^3 \propto^* +pz + q$, & Quadratum semissis ultimi termini majus sit Cubo trientis, quantitatis cognitæ penultimi; similis fermè regula nos docet, radicem esse

$$z \propto \sqrt[3]{C + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}} + \sqrt[3]{C + \frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}}.$$

Vnde apparet, quòd Problemata omnia, quorum difficultates ad Æquationem unius ex hisce duabus formis reducuntur, construi semper possint, ut Conicas sectiones adhibere non sit opus, nisi ad extrahendas radices Cubicas ex quibusdam quantitibus datis, hoc est, ad inveniendas duas medias proportionales inter hasce quantitates & unitatem.

Deinde si habeatur $z^3 \propto^* +pz + q$, & Quadratum semissis ultimi termini non sit majus Cubo trientis, quantitatis cognitæ penultimi termini; supponendo Circulum NQP V, cujus semidiameter NO sit $\sqrt{\frac{1}{3}p}$, hoc est, media proportionalis inter trientem quantitatis datæ p & unitatem; tum etiam supponendo lineam NP huic Circulo esse inscriptam, quæ sit $\frac{2q}{p}$, hoc est, quæ sit ad alteram quantitatem datam q, ut est unitas ad trientem ipsius p; dividendus tantum est uterque arcus NQP, NV P in tres æquales partes; eritque NQ, subtensa trientis unius arcus, unà cum NV, subtensa trientis alterius, æqualis radici quæ sitæ.

M 3

Denti-

simpliciore esse, quàm si exprimantur per relationem, quam habent ad subtenfas certorum arcuum, seu Circuli portionum, quarum triplum est datum. Ita ut Cubicarum *Æquationum* radices illæ omnes, quæ per Cardani regulas exprimi nequeunt, æquè clarè aut etiam clariùs per modum hîc propositum exprimi possint.

Si enim, exempli causâ, radicem cognoscere arbitremur hujus *Æquationis* $z^3 \propto * + pz + q$: quia ipsam compositam esse scimus ex duabus lineis; quarum una est latus Cubi, cujus contentum est summa, quæ constat ex $\frac{1}{2}q$, & ex latere Quadrati, cujus contentum est $\frac{1}{2}qq - \frac{1}{27}p^3$; & altera latus alterius Cubi, cujus contentum est differentia, quæ est inter $\frac{1}{2}q$, & latus Quadrati, cujus contentum est $\frac{1}{2}qq - \frac{1}{27}p^3$, (quod illud omne est, quod ex Cardani regula ad discimus); Dubitandum non est, quin æquè distinctè aut etiam distinctiùs radix hujus $z^3 \propto * + pz - q$ cognoscatur, si ea consideretur inscripta Circulo, cujus semidiameter sit $\sqrt{\frac{1}{2}p}$, in quo pro subtenfa arcus intelligatur, cujus tripli subtenfa sit $\frac{1}{2}q$. Quin etiam hi termini prioribus illis multò minùs sunt intricati, & qui etiam multò breviores reddentur, si peculiari aliquâ notâ ad exprimendas hasce subtenfas, quemadmodum fit notâ \sqrt{C} . ad exprimendum latus Cubicum, uti velimus.

Possunt quoque per regulas hîc supra explicatas deinceps exprimi radices *Æquationum* omnium, quæ ad Quadrato-quadratum ascendunt; ita ut nesciam, quid in hac materia desiderari ampliùs possit. Neque enim natura harum radicum permittit, ut terminis exprimantur simplicioribus, nec ut per constructionem aliquam, quæ unâ & generalior & simplicior sit, determinentur.

Verum

Æquationum Cubicarum: ac per consequens illarum omnium, quæ Quadrato-quadratum non excedunt.

*Cur Proble-
mata Solida
construi
non possint
absque se-
ctionibus
Conicis,
nec quæ
magis
composita
sunt sine
aliis li-
neis, ma-
gis com-
positis.*

Verum quidem est, me nondum dixisse, quibus rationibus nitar, quodd affirmare audeam, utrùm res aliqua fieri possit nec ne. At verò si consideretur, quomodo per methodum qua utor, id omne, quod sub Geometricam contemplationem cadit, ad unum idemque genus Problematum reducatur, quod est, ut quæzatur valor radicum alicujus Equationis, satis judicabitur, non difficile esse ita enumerare vias omnes, quibus inveniri possunt: ut hoc sufficiat ad ostendendum, generalissimam & simplicissimam fuisse selectam. Et speciatim, quod spectat ad Solida Problemata, quodd videlicet, ut dixi, citra lineam aliquam magis compositam quam circularem construi non possint, vel inde evidens esse potest, quodd illa omnia ad duas constructiones reducantur; in quarum unâ duo simul puncta requiruntur, quæ inter duas datas lineas duas medias proportionales determinent; & in alterâ duo puncta, quæ datum arcum in tres æquales partes dividant. Etenim cum Circuli curvatura tantum dependeat à simplici relatione omnium partium ad punctum unum, quod est ipsius centrum; inde fit, ut eo quoque non nisi ad unum solummodo punctum inter duas extremas determinandum uti possimus, utputa ad inveniendam unam mediam proportionalem inter duas datas, aut ad datum arcum in duas æquales partes dividendum. At verò curvatura Conicarum Sectionum, quæ semper à duabus diversis rebus dependet, ad duo diversa puncta determinanda inservire potest.

Ob eandem rationem fieri nequit, ut aliquod eorum Problematum, quæ uno gradu magis quam Solida sunt composita, & inventionem 4 mediarum proportionalium, aut anguli in 5 æquales partes divisionem, præsupponunt, ope alicujus Conicæ sectionis construi


strui possit. Quare nihil melius hîc à me fieri posse confido, quàm si regulam generalem tradam construendi illa ope lineæ curvæ, quæ describitur per intersectionem Parabolæ & lineæ rectæ, quemadmodum supra fuit explicatum. Affirmare enim audeo, nullam, quæ huic effectui inservire queat, simpliciore in rerum natura inveniri. Atque etiam vidistis, quomodo hæc linea immediatè sectiones Conicas sequatur in quæstione tantopere à Veteribus quæsitâ, cujus solutio ordine omnes curvas lineas, in Geometriam recipiendas, exhibet.

Iam nostis, cùm investigantur quantitates, quæ ad constructionem horum Problematum requiruntur, quâ ratione semper ad Æquationem aliquam reduci possint, quæ non nisi ad Quadrato-cubum, aut Surdesolidum adscendat. Deinde etiam nostis, quomodo, augendo valorem radicum hujus Æquationis, fieri semper possit, ut radices hæc omnes veræ evadant, ac simul ut quantitas cognita tertii termini excedat quadratum à semisse quantitatis cognitæ secundi termini. Et denique, quo pacto, si tantum ad Surdesolidum adscendat, ipsa ad Quadrato-cubum attolli possit, fierique ut nullus terminorum desit.

Quocirca ut difficultates omnes, quæ quidem hîc occurrunt, per eandem regulam resolvi queant, desidero ut hæc omnia fiant, & hæc ratione reducantur semper ad Æquationem hujus formæ

$$y^6 - p y^5 + q y^4 - r y^3 + s y y - t y + v = 0.$$


in qua quantitas vocata q , major sit quadrato à semisse ejus, quæ nominatur p .



Post hæc ductâ lineâ rectâ BK, utrinque indefinitâ, erectâque ad eandem ex puncto B perpendiculari AB, cujus longitudo sit $\frac{1}{2}p$; describenda est in plano aliquo separato Parabola, ut CDF, cujus latus rectum principale sit $\sqrt{\frac{1}{v} + q - \frac{1}{2}pp}$. quod brevitatis causâ vocabo π . Tum ponendo planum, in quo Parabola existit, supra planum in quo sunt lineæ AB & BK, ita ut axis ejus DE omnino congruat cum lineâ rectâ BK; sum-

sumptoque segmento hujus axis, quod inter puncta E & D intercipitur, æquali $\frac{2\sqrt{v}}{pn}$, adplicanda est longa regula ad punctum E, ita ut, postquam ad punctum A plani inferioris quoque est adplicata, semper maneat adjuncta hisce duobus punctis, Interea dum Parabola secundum lineam BK, ad quam ejus axis est adplicatus, vel elevatur vel deprimitur. quâ quidem ratione Parabolæ atque regulæ intersectio, quæ fit in puncto C, lineam curvam ACN designabit, illam quippe quâ ad propositi Problematis constructionem indigebimus. Etenim eâ sic descriptâ, si fiat BL æqualis DE, hoc est, $\frac{2\sqrt{v}}{pn}$, ita ut punctum L cadat in lineam BK, versùs partem, quam respicit Parabolæ vertex, Tum verò in eadem linea à puncto L versùs B sumatur LH æqualis $\frac{t}{2n\sqrt{v}}$, Et ex puncto H, sic invento, ad partem curvæ ACN ducatur ad angulos rectos ipsi BK, linea HI, æqualis $\frac{r}{2nn} + \frac{\sqrt{v}}{nn} + \frac{pt}{4nn\sqrt{v}}$, quam abbreviandi causâ nominabo $\frac{m}{nn}$, Ac, postquam conjuncta sunt puncta L & I, circulo LPI, cujus diameter IL, inscribatur lineæ LP, æqualis $\sqrt{\frac{t+pv}{nn}}$, Tandemque ex centro I per punctum P, sic inventum, circulus describatur PCN: secabit hic circulus vel tanget lineam curvam ACN, in tot punctis, quot Æquatio admittet radices. Ita ut perpendiculares, quæ ex hisce punctis ad lineam BK deducuntur, Æquationis hujus futuræ sint radices, & nullam hæc regula patiatur exceptionem neque defectum. Etenim si quantitas *s* adeò magna esset respectu aliarum, *p, q, r, t, & v*, ut lineæ LP major inveniretur diametro circuli IL, sic ut eidem inscribi non posset, nulla itidem foret radix in Æquatione proposita, quæ

non esset imaginaria; nec etiam ulla foret radix, si circulus IP admodum parvus esset, ut curvam ACN in nullo
 z prorsus puncto secaret. Hanc autem curvam in 6 diversis punctis secare potest, ita ut hic sex diversæ radices in \mathcal{A} equatione haberi queant. Atque cum illam in paucioribus secat, hoc indicio est, quasdam ex hisce radicibus inter se æquales esse, aut ipsarum aliquas esse tantum imaginarias.



Quòd si verò ratio hæc describendi lineam ACN
 per

per motum Parabolæ vobis videatur incommoda, facile est plures alios modos in eundem finem excogitare. Ut, manentibus eisdem quantitativis pro AB & BL, nec non eâdem pro BK, quæ pro latere recto principali Parabolæ supponebatur; describendus est tantum semicirculus KST, centro ejus ad libitum in linea BK assumpto, ita tamen ut lineam AB alicubi secet, ut in puncto S. Nam postquam à puncto T, ubi terminatur, versus K assumpta fuerit linea TV, æqualis BL, jungaturque SV, atque à puncto A junctæ SV parallela ducatur AC, quæ rectæ SC, ductæ per punctum S, ipsi BK parallelæ, occurrat in puncto C: Erit punctum C, ubi hæ duæ parallelæ sibi mutuò occurrunt, unum ex punctis per quod quæsitæ curva transire debet. Eodem modo inveniri possunt tot alia puncta, quot quis voluerit.

Quorum omnium demonstratio satis facilis est.

Si enim regula AE unâ cum Parabola FD adplicetur ad punctum C, (eodem modo, quo constat eas ad punctum C in curva ACN mutuâ interfectione designandum esse adplicandas) & quidem CG vocetur y : erit $GD \frac{yy}{n}$, cum latus rectum, quod est n , sit ad CG sicut CG ad GD. Auferendo autem DE, quæ est $\frac{2\sqrt{v}}{p^n}$ à GD, relinquetur $\frac{yy}{n} - \frac{2\sqrt{v}}{p^n}$, pro GE. Deinde quia AB est ad BE, ut CG ad GE: hinc cum AB sit p , BE erit $\frac{p^2}{2n} - \frac{\sqrt{v}}{ny}$.

Eâdem ratione si punctum curvæ C supponatur inventum esse per interfectionem linearum rectarum, SC, parallelæ ipsi BK, & AC, parallelæ ipsi SV; SB, quæ æquatur ipsi CG, est y : & cum BK æquetur lateri recto Parabolæ, quod nominavi n , BT erit $\frac{yy}{n}$. est enim ut KBadB, ita BS ad BT. Cumque TV eadem sit

N 3

quæ

quæ B L, hoc est, $\frac{2\sqrt{v}}{p^n}$, B V erit $\frac{yy}{n} - \frac{2\sqrt{v}}{p^n}$. Sicut autem S B est ad B V, sic A B est ad B E, quæ ideo est $\frac{py}{2n} - \frac{\sqrt{v}}{ny}$, ut ante. Vnde apparet, unam eandemque lineam esse, quæ utroque hoc modo describitur.

Porro, quoniam B L & D E sibi invicem æquales sunt, æquales quoque inter se erunt D L & B E; ita ut, addendo L H, quæ est $\frac{t}{2n\sqrt{v}}$, ad D L, quæ est $\frac{py}{2n} - \frac{\sqrt{v}}{ny}$, habeatur tota D H, nempe $\frac{py}{2n} - \frac{\sqrt{v}}{ny} + \frac{t}{2n\sqrt{v}}$, è qua auferendo G D, quæ est $\frac{yy}{n}$, relinquetur G H, videlicet $\frac{py}{2n} - \frac{\sqrt{v}}{ny} + \frac{t}{2n\sqrt{v}} - \frac{yy}{n}$. Id quod ordine scribo, hoc pacto, $G H \propto \frac{-y^3 + \frac{1}{2}pyy + \frac{ty}{2\sqrt{v}} - \sqrt{v}}{nnyy}$

Et fit quadratum ex $G H$,

$$\frac{\left\{ y^3 - py^2 - \frac{t}{\sqrt{v}} \right\} \left\{ y^3 + \frac{2\sqrt{v}}{p} \right\} - p\sqrt{v}}{\left\{ y^3 + \frac{pt}{2\sqrt{v}} \right\} \left\{ y^3 + \frac{tt}{4v} \right\} yy - ty + v}$$

Quocunque autem alio loco hujus curvæ imaginari libeat punctum C, utputa versùs N, vel versùs Q, semper tamen invenietur, quadratum lineæ rectæ, quæ inter punctum H, & punctum ubi perpendicularis deducta ex puncto C cadit super B H, intercipitur, iisdem hisce terminis iisdemque signis + & - exprimi posse.

est, inter $\frac{m}{nn}$ & y ; ita ut quadratum ejus semper sit $\frac{mm}{nn}$
 $-\frac{2my}{nn} + yy$, quod à quadrato ex IC ablatum relinquit
 $\frac{tt}{4nnv} - \frac{s}{nn} - \frac{p\sqrt{v}}{nn} + \frac{2my}{nn} - yy$, pro quadrato ex CM,
 quod est æquale quadrato ex GH, jam invento. Aut
 etiam faciendo ut hæc summa quemadmodum altera di-
 vifa sit per $nnyy$, obtinebitur

$$-nn y^4 + 2m y^3 - p\sqrt{v} y y - s y y + \frac{tt}{4v} y y. \text{ Cæterùm}$$

restituendo $\frac{t}{v} y^4 + q y^4 - \frac{1}{2} p p y^4$ pro $nn y^4$, & $r y^4$
 $+ 2\sqrt{v} y^3 + \frac{pt}{2\sqrt{v}} y^3$ pro $2m y^3$, & multiplicando u-
 tramque summam per $nnyy$: exsurget

$$y^6 - p y^5 - \frac{t}{v} y^4 + \frac{2\sqrt{v}}{2} y^4 - \frac{p\sqrt{v}}{4v} y^4 \left\{ y^4 + \frac{2\sqrt{v}}{2} y^4 + \frac{pt}{4v} y^4 \right\} y y - t y + v,$$

æquale

$$\left\{ -\frac{t}{v} y^4 - q y^4 + \frac{p\sqrt{v}}{4v} y^4 \right\} y^4 + \left\{ \frac{2\sqrt{v}}{2} y^4 + \frac{pt}{2\sqrt{v}} y^4 + \frac{tt}{4v} y^4 \right\} y y.$$

Hoc est, habebitur

$$y^6 - p y^5 + q y^4 - r y^3 + s y y - t y + v = 0.$$

Vnde apparet, lineas CG, NR, QO, & similes esse
 hujus Æquationis radices. Quod erat demonstrandum.

Invenio
 quatuor
 medianum
 proportion-
 alium.

Hinc si invenire velimus 4^{te} medias proportionales
 inter lineas a & b ; posita x pro prima, prodibit Æquatio
 $x^4 - a^4 b = 0$, vel $x^4 - a^4 b x^4 = 0$. Fa-
 ctâque $y - a = x$, invenietur

$$y^6 - 6a y^5 + 15a^2 y^4 - 20a^3 y^3 + 15a^4 y y - \frac{6a^5}{a^4} y + \frac{a^6}{a^4} = 0$$

Vnde pro linea AB sumendum est $3a$, &

$$\sqrt{\frac{6a^5 + a^6}{\sqrt{aa + ab}}} + 6aa \text{ pro BK, vel latere recto Parabola}$$

læ,

lx, quod supra nominavi n , & $\frac{2a}{3n} \sqrt{aa+ab}$ pro DE, vel BL. Porro descriptâ lineâ curvâ ACN secundum mensuram harum trium linearum, faciendâ est LH

$$\propto \frac{6a^3 + aab}{2n\sqrt{aa+ab}}, \text{ \& IH } \propto \frac{10a^3}{nn} + \frac{aa}{nn} \sqrt{aa+ab} \\ + \frac{18a^4 + 3a^3b}{2nn\sqrt{aa+ab}}, \text{ \& LP } \propto \sqrt{\frac{15a^4 + 6a^3\sqrt{aa+ab}}{nn}}.$$

Etenim circulus, qui centrum suum habet in puncto I, transiture per punctum sic inventum P, secabit curvam in duobus punctis C & N, à quibus si ad rectam BK demittantur perpendiculares NR & CG, & minor NR à majore CG auferatur; erit reliqua x, prima ex quatuor mediis proportionalibus quæsitis.

Eodem modo facile est datum angulum in quinque æquales partes dividere, & Circulo figuram inscribere 11 aut 13 æqualium laterum, atque infinita alia hujus regulæ exempla reperire.

Verum notandum est in plurimis horum exemplorum, quod Circulus hic ita obliquè hanc Parabolam secundi generis secare possit, ut intersectionis punctum cognitu sit difficile, atque adeò hæc constructio ad Praxin non sit idonea. Cui quidem rei facilè remedium afferri posset, componendo alias regulas ad imitationem hujus.

Sed institutum meum non est prolixum librum conscribere, sed potius multa paucis comprehendere: quod fortè judicabunt me fecisse, qui consideraturi sunt, quòd, reductis ad eandem constructionem Problematis omnibus ejusdem generis, modum simul, quo ad infinitas alias diversas reduci, atque ita omnia infinitis modis resolvi possint, ostenderim. Præterea etiam, quòd constructis iis omnibus, quæ Plana sunt, intersectione Circuli & lineæ rectæ, Et iis omnibus, quæ Solida sunt,

O

inter-

interfectione Circuli & Parabolæ, Ac tandem iis omnibus, quæ uno gradu magis sunt composita, interfectione similiter Circuli & lineæ, uno gradu magis quàm Parabola compositæ, eandem tantum viam in construendis reliquis omnibus, quæ magis magisque in infinitum sunt composita, sequi oporteat. Etenim cognitis, in materia Mathematicarum progressionum, duobus aut tribus prioribus terminis, reliquos invenire non est difficile. Aded ut sperem à posteris mihi gratias habitum iri, non solum pro iis, quæ hîc explicui; sed etiam pro iis, quæ consultò omisi, quò ipsis voluptatem illa inveniendi relinquerem.

F I N I S.



FLORIMONDI DE BEAUVNE

I N

G E O M E T R I A M

RENATI DES CARTES

NOTÆ BREVES.



ALGEBRA speciosa, hoc est, quæ exercetur per species rerum, quæ literis Alphabeti, aliusve similibus designantur, est Scientia, investigandis, inveniendisque Theorematis & Problematis inserviens, ac res homogeneas, quarum rationes vel proportionem considerantur, concernens. Dicimus autem rationem inter se habere

duas res, cum homogeneæ seu ejusdem naturæ existentes, aut æquales sunt, aut inæquales, & minor per sui ipsius continuam additionem, tandem major evadit, majoremque superans. Adcò ut hæc Scientia non solum Algebram numerosam atque Veterum Analysin Geometricam comprehendat; sed etiam omne id, quod relationem quandam habet aut proportionem, ut refert D. des Cartes, in sua de Methodo dissertatione.

Optimum verò est, ad stabilienda hujus Scientiæ præcepta & ad cognitionem ejus assequendam, ut generaliter rationes hæc in lineis consideremus: cum simplicissimæ sint, & hoc sibi vendicent, quòd rationes omnes, quæ inter quascunque alias res considerari possunt, exprimant. Id quod numeri non efficiunt, qui relationes, quæ inter incommensurabiles quantitates reperiuntur, exprimere nequeunt. Accedit, quòd iis ad omnes alias res, rationem vel proportionem quandam inter se habentes, uti possimus. Etenim licet linea nullam cum superficie, aut cum alicujus motus velocitate rationem habeat (atque ita de aliis alterius naturæ rebus;) possumus tamen rationem, quæ inter duas superficies, aut inter duas differentes velocitates, & id genus alia, quæ inter se relationem

nem aliquam habere statuimus, reperitur, exprimere per duas lineas. Id tantum cavendum est, ne permutata ratione utamur.


Operationes omnes, quæ in hac Scientia occurrunt, ad quinque reducuntur, quæ eadem sunt, quæ Arithmetica vulgaris, nimirum, Additio, Subtractio, Multiplicatio, Divisio, atque Radicum Extractio; hoc præterea commodi habentes, quod illæ (sicut notavimus) circa incommensurabiles quantitates, non minus quam circa alias, versentur. Ut, cum proponuntur duæ lineæ incommensurabiles, sive longitudine, sive longitudine & potentia, possunt ipsæ simul addi, una ab altera auferri, per se invicem multiplicari, una per alteram dividi, & ex utraque radix extrahi, perinde ac si longitudine essent commensurabiles.

Neque verò docebimus, quo pacto hæ operationes per litteras Alphabeticas, vel alias linearum aliarumve rerum species, quas designant, sint faciendæ: cum hoc ab aliis jam sit pertractatum. Tum etiam quoniam hæc Geometria, quâ ratione Additio, Subtractio, Multiplicatio, Divisio, atque Radicum Extractio, tam in numeris, quam in lineis instituendæ sint, breviter exponit. Verum observari volumus, quod per hæc species, quas nominamus b , b^2 , b^3 , b^4 , bd , b^2d , b^3d ; primam videlicet b , numerum aut lineam simplicem; secundam b^2 , quadratum ipsius b , seu b quadratum; tertiam b^3 seu b cubum; quartam b^4 seu b quadrato-quadratum, &c. non ullæ aliæ res, quam lineæ omnino simplices concipiantur; nisi quaestio fuerit de veris Quadratis, Cubis, Planis, & Solidis, aut, per hæc species alias res significemus, similem inter se relationem, quam lineæ ipsis designatæ, habentes. Attamen consentaneum est, nomina usitata retinere, quandoquidem lineæ, speciebus hisce designatæ, eandem inter se rationem, quam veræ superficies, & vera solida, quæ per ipsas denotantur, servant. Et hoc quidem ad imitationem Arithmeticae communis, ubi alios numeros appellamus Quadratos, alios Cubos, alios Planos, alios Solidos &c. quippe qui talem inter se relationem observant, quatenus sunt numeri simplices, qualem inter se obtinent Quadrati, Cubi, &c. quos representant.

Oportet itaque ostendere, spatia & corpora, speciebus hisce designata, eandem inter se rationem habere, quam lineæ simplices, quas per ipsas concipimus. Exempli gratia, b^2 eandem
ratio:

rationem habere ad bd , & ad d^2 , quatenus spatia significant, quàm quatenus lineas referunt. Sic etiam relationem ipsius b^2 ad b^2d & ad d^2 , aliasque similes, eandem inter hæc Solida existere, quam ea, quæ est inter lineas, per has species designatas. Quod ipsum facile erit, si pro arbitrio lineam aliquam accipiamus, quam appellemus unitatem, & ad eam reliquas omnes referamus. Illa vocetur a , sic ut hæc tres lineæ a , b , & b^2 proportionales existant, juxta id quod de multiplicatione in hac Geometria dictum est. Idem de lineis a , d , & d^2 est intelligendum. Sic etiam linea a est ad lineam b , sicut linea d est ad lineam bd ; aut, ut linea a est ad lineam d , ita linea b est ad eandem lineam bd . Quod cum ita sit, linea b erit ad lineam b^2 , sicut linea d ad lineam bd ; cum eadem utrobique sit ratio, nimirum eadem, quæ lineæ a ad lineam b . Vnde permutando erit, ut linea b ad lineam d , ita linea b^2 ad lineam bd . Eodem modo linea b erit ad lineam bd , ut linea d ad lineam d^2 ; cum utraque ratio eadem sit, quæ lineæ a ad lineam d . quemadmodum est ostensum. Vnde permutando erit, ut linea b ad lineam d , ita linea bd ad lineam d^2 . Patet itaque, b esse ad d , sicut b^2 ad bd ; itemque b esse ad d , sicut bd ad d^2 , & consequenter, rationem lineæ b^2 ad lineam d^2 esse duplicatam lineæ b ad lineam d ; lineamque bd esse mediam proportionalem inter lineas b^2 & d^2 . Id quod unusquisque novit ab Euclide esse ostensum, nimirum: rationem, quam habet b^2 ad d^2 , quatenus designant superficies seu quadrata, duplicatam esse rationis, quam habet latus b ad latus d : itemque bd rectangulum esse medium proportionale inter hæc ipsa quadrata. ac per consequens, hæc spatia eandem inter se relationem habere, quam lineæ iisdem speciebus designatæ. Idem ostendi potest de Cubis vel Solidis, ad imitationem præcedentis demonstrationis. Vnde haud parvum emolumentum colligere licet, cum complures rationes, quas Euclides alique Geometræ, inter duas superficies, atque inter duo corpora, reperiri, demonstrarunt, nos pro lineis, aliisve rebus, iisdem speciebus designatis, usurpare possimus, prout eandem quam dicta spatia seu corpora inter se relationem habent.

Exhibeamus aliquod exemplum: Detur triangulum rectangulum ADE , cujus angulus DAE sit rectus. Manifestum est ex elementis, quòd laterum quadrata simul sumpta quadrato basis



sint æqualia: hoc est, si ponamus $AD \propto b$, $AE \propto c$, & $DE \propto d$, quod $b^2 + c^2$ æquetur d^2 , quatenus designant vera quadrata. Quod quoque verum est, quatenus designant lineas, modò eandem inter se relationem obtineant, quam hæc ipsa quadrata; ut demonstratum est à nobis, atque etiamnum in hoc exemplo palàm facere conabimur.

Assumatur pro lubitu linea aliqua major vel minor (perinde enim est) quàm DE , quæ quidem sit unitas, & ad quam reliquæ omnes referantur: ipsa autem esto BC , parallela existens ipsi DE , ducaturque perpendicularis AF , ipsam, si opus est, producendo. Deinde fiat, ut BC ad DE , ita DE ad HM , fietque $HM \propto d^2$.

Iam verò, sicut hæc lineæ BC , DE , HM sunt continuè proportionales, ita quoque lineæ BC , AE , NM , nec non lineæ BC , DA , HN . Composita enim est ratio BC ad AE , ex ratione BC ad AC , & ex ratione AC ad AE . Est autem ratio AE ad NM composita ex iisdem rationibus, nimirum ex ratione AE ad FE , quæ eadem est rationi BC ad AC (propter similitudinem triangulorum rectangulorum AEF & BCA), & ex ratione FE ad NM , hoc est, AE ad AM , quæ eadem est rationi AC ad AE (per constructionem.) Id quod eodem modo patet de BC , AD , HN . Erit igitur $NM \propto c^2$, & $HN \propto b^2$, quæ quidem simul sumptæ æquantur ipsi HM , hoc est, d^2 . Quod erat demonstrandum.

Cernitur præterea illa in hac Methodo facilitas, quòd etiam lineam aliquam hoc modo $\frac{b}{a}$, aliisve similibus, exprimere possimus; aut quòd eo item modo fractionem aliquam Arithmeticæ communis, ut $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, &c. denotare valeamus; hoc sanè compendio, quòd literis fractio exprimi possit, cujus numerator ad denominatori-

nominatorem non habeat rationem commensurabilem; sed quæ similis sit lineæ ad lineam, quarum una vicem gerat numeratoris, & altera vicem denominatoris ejusdem fractionis. Id quod non exigua est utilitatis, quemadmodum postea videbitur.

Iam autem explicandum est, cur æque multæ dimensiones singulis Equationis terminis sint tribuendæ. Quod sanè per se liquet, quando sub hisce terminis superficies aut corpora intelliguntur: cum nulla ratio inter duas quantitates heterogeneas consistat, spatiaque illa aut corpora eodem semper linearum atque dimensionum numero designentur.


Verùm expedit ut idem faciamus, quando per hosce terminos non nisi lineæ designantur, ut Methodus eò universalior atque etiam commodior reddatur: Quandoquidem id præstare tenemur, cum lineæ, quæ pro unitate sumenda est, indeterminata existit, seu, cum requiritur, ut liberum sit assumere pro unitate lineam qualem volumus. Id quod faciliè concipi potest, quoniam fumendo lineam aliquam, ut a , pro unitate, lineæ, verbi gratiâ, b^2 & d^2 , denominationes hæc accipiunt, prout referuntur ad lineam a . At verò statuendo aliam quandam lineam pro unitate quàm a , licet b & d eadem maneant, nihilominus tamen b^2 & d^2 à præcedentibus erunt diversæ. Ac proinde, si comparare velimus lineam b cum lineâ d^2 : quoniam d^2 diversa est, prout ad diversas lineas refertur, quas pro unitate accipere possumus, ipsâ lineâ b eadem semper manente; patet lineam b ad lineam d^2 non semper eandem rationem servare: sed contra, diversas ad illam sortiri relationes, pro diversis lineis, quæ pro unitate assumuntur. Et sic de aliis. At quæcunque tandem lineæ pro unitate sumatur, lineæ tamen indeterminata, & quæ per b^2 concipitur, eandem semper habet rationem ad d^2 , quam quadratum lineæ b ad quadratum lineæ d . Atque ita de aliis omnibus, ut supra est ostensum. Et quidem generalius est atque etiam commodius, relinquere ita unitatem indeterminatam & ad cujusque arbitrium, ut deinde pro ipsa talis lineæ assumi possit, qualis videbitur, quàm eandem ab initio operationis determinare, fumendo pro ipsa certam aliquam lineam. Præterquam quod id plurimum conducit ad confusionem evitandam; ad dirigendum calculum; atque ad præcavenda vitia, quæ ibidem committi possent. Verùm cum unitas determinata existit, tum quidem non ampliùs singulis

Æqua-

II2 FLORIMONDI DE BEAUNE

Æquationis terminis æquè multas literas tribuere tenemur: cum unitas illas ubique supplere possit, ubi numero pauciores habentur, & ipsa has species multiplicans aut dividens easdem non mutet. Si verò ibidem non sit expressa, poterit tum quidem subintelligi. Qua de re plura exempla in hac Geometria reperiuntur.

AD PAGINAS 6 & 7, DE RADICVM EXTRACTIONE.



QVandoquidem linea LM primæ figuræ tangit circulum LOP, rectangulum OMP æquatur quadrato ex LM. Sunt autem bina rectangula MOP & OMP æqualia quadrato ex OM. Æquale igitur erit rectangulum MOP, unà cum quadrato ex LM, qua-


drato ex OM; hoc est, erit $z^2 \propto az + b^2$, ac per consequens $z \propto \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$: cum ON æquetur $\frac{1}{2}a$, & quadratum ex NM tantundem valeat atque duo quadrata ex NL & LM, hoc est, $\frac{1}{4}a^2 + b^2$. Id quod primò erat demonstrandum.

Deinde rectangulum OPM & quadratum ex PM æqualia simul sunt rectangulo OMP. Est autem rectangulum OMP æquale quadrato ex LM. Quadratum itaque ex PM æquale est quadrato ex LM, minus rectangulo OPM: hoc est, erit $y^2 \propto -ay + bb$, ac proinde $y \propto -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$. quia, cum NM æquatur $\sqrt{\frac{1}{4}a^2 + b^2}$, ut supra, ac ex ipsa aufertur NP seu $\frac{1}{2}a$, relinquitur MP seu y .

IN SECUNDAM FIGURAM DE RADICVM EXTRACTIONE. PAG. 7.

REducemus hanc figuram ad sequentem, in qua ND & HO sunt parallelæ & æquales ipsi LM. Quibus positis, quoniam
LM

LM tangit circulum HRQL in puncto L, erit quadratum ex LM æquale rectangulo RMQ. Deinde, quia MD æqualis est DO, & QD ipsi DR, erit & MQ æqualis RO. Vnde additâ communi QR, fiet quoque MR æqualis QO.



Ac proinde si à rectangulo OMR auferatur rectangulum RMQ, hoc est, quadratum ex LM, erit reliquum æquale quadrato ex QO seu MR. Hinc cum RM sit ∞z , HL seu MO ∞a , & LM ∞b : erit $z^2 \infty az - bb$.

Similiter si à rectangulo OMQ auferatur rectangulum RMQ, hoc est, quadratum ex LM, erit reliquum æquale quadrato ex RO seu MQ. Ac proinde si QM sumatur pro z , habebitur $z^2 \infty az - bb$.

Jam autem cum linea RQ divisa sit bifariam in D, ac ipsi in directum adjecta QM, erit rectangulum RMQ, hoc est, quadratum ex LM, unâ cum quadrato ex DQ seu RD, æquale quadrato ex DM, hoc est, ex semisse ipsius a ; ac proinde quadratum ex DQ seu DR æquale quadrato ex DM, minus quadrato ex LM, hoc est, æquale $\frac{1}{4}aa - bb$. Vnde si addamus $\sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$, hoc est, DQ seu DR ad DM vel $\frac{1}{2}a$, habebimus MR pro z ; si verò illam ex eadem DM auferamus, obtinebimus quoque QM pro z . E quibus patet, primo casu fieri MR, hoc est, $z \infty \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$, secundo autem MQ, hoc est, $z \infty \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$. Ita ut hæc æquatio $z^2 \infty az - bb$ duas habeat radices, nimirum, MR & MQ, quæ, sic ut jam diximus, exprimuntur. Id quod secundo erat demonstrandum.

Possunt quoque hæc omnia, quæ de radicibus dicta sunt, per Algebram demonstrari. Si enim in primo exemplo, sicut fecimus, ponatur $z \infty \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2}$: auferendo utrinque $\frac{1}{2}a$, habebitur $\sqrt{\frac{1}{4}a^2 - b^2} \infty z - \frac{1}{2}a$. Ac proinde, si sumantur horum quadrata, erit & $z^2 - az + \frac{1}{4}a^2 \infty \frac{1}{4}a^2 - b^2$. Et ablato

p

utrin-

utrinque $\frac{1}{2}a^2$, atque transferendo $-az$ in alteram æquationis partem: $z^2 \propto az + b^2$.

In secundo exemplo, cum æquatur $-\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}a^2 + b^2}$, ac proinde $+\frac{1}{2}a \propto \sqrt{\frac{1}{2}a^2 + b^2}$, erunt & horum quadrata æqualia, hoc est, $y^2 + ay + \frac{1}{4}a^2 \propto \frac{1}{4}a^2 + b^2$, & per consequens $y^2 \propto -ay + bb$.

In tertio exemplo, cum primo loco habeatur $z \propto \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}a^2 - b^2}$, idcoque $z - \frac{1}{2}a \propto \sqrt{\frac{1}{2}a^2 - b^2}$, erunt & horum quadrata æqualia, hoc est, $z^2 - az + \frac{1}{4}a^2 \propto \frac{1}{4}aa - bb$, unde & $z^2 \propto az - bb$.

In ultimo exemplo, cum secundo loco habeatur $z \propto \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$, ac idcirco $\frac{1}{2}a - z \propto \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$, erunt & horum quadrata æqualia, hoc est, $\frac{1}{4}aa - az + z^2 \propto \frac{1}{4}aa - bb$, & propterea $z^2 \propto az - bb$. Quæ quidem demonstrare oportebat.

IN COMPOSITIONEM LOCORVM PLANORVM ET SOLIDORVM PAG. 26, & sequent.

QUicquid in primo libro restat, nec non in secundo usque ad Locorum Planorum & Solidorum compositionem reperitur, intellectu satis facile est; quare ad paginam 26 & sequentes progrediemur. Vbi primò notandum, quòd, habentes in æquatione duas quantitates indeterminatas, quarum una licet pro arbitrio sumatur, altera tamen per eandem æquationem inveniri possit, ita ipsam ordinare oporteat: ut, si una, puta x , ad libitum sumatur, altera, quæ est y , denominationi terminorum ejus inserviat, sic, ut y^2 unam constituat æquationis partem, & altera ejus pars ordiatur a termino, in quo y sola sine x reperitur, quem sequatur y cum x , & postea x sine y , & tandem terminus, in quo neque x neque y reperiatur. Atque impossibile quidem est alios casus invenire, quando quantitates indeterminatæ y & x duas tantum dimensiones habent: quanquam sæpius contingat ex his terminis aliquos reperiri nihilo æquales.

Deinde observandum quoque est, si termini illi plures litteras vel dimensiones contineant, modò quantitates indeterminatæ y & x duas dimensiones non excedant, facile esse, dividendo totam æqua-

æquationem per literas ipsi y adherentes, efficere, ut y sola unam partem æquationis constituat & reliquæ alteram partem, ad instar fractionis, pro denominatore habentem literas, quæ antea cum y iungebantur. Vbi neq̃ existimare debet, fractionem pluribus dimensionibus constare, quàm numero relinquuntur literæ in numeratore, postquam ex ipso numerus literarum denominatoris est subductus, quemadmodum in exemplo, eadem huius Geometriæ paginâ proposito, apparet.

Quod verò de dimensionibus jam diximus, eodem sensu intelligendum est, quo antea advertimus, utile esse, ut singulis æquationis terminis æquæ multæ tribuantur literæ. Nam sicut $\frac{b}{a}$ significare potest lineam aliquam, sic etiam $\frac{b}{a^2}$, & $\frac{b}{a^3}$; quæ tamen sic usurpari non debent, nisi cum linea quædam pro unitate est determinata: ob rationem supra allatam, ubi utilitatem atque commoditatem ostendimus, quæ sequitur, cum singulis æquationis terminis æquæ multæ literæ vel dimensiones tribuantur, etiam si illis nil nisi lineæ aliæve res similes designentur.

Porro notandum est, quòd in hac Geometria generaliter pro uno eodemve loco vel termino habeantur illi omnes, qui eandem quantitatē, quam invenire volumus, & radicem æquationis appellamus, denominationem sortiuntur. Nimirum, quòd omnes illi pro uno termino habeantur, in quibus reperitur y ; & pro alio, in quibus reperitur y ; & rursus pro alio omnes, in quibus y non reperitur. Atque ita ulterius, si radix plures dimensiones habuerit. Est autem hoc (ut diximus) generale; speciatim verò hæc methodus requirit, ut ex termino, in quo y reperitur, duos casus faciamus; in quorum uno y reperiatur sine x ; & in altero, ubi cum x sit conjuncta: cum y & x duæ indeterminatæ quantitates sint & utraque æquationis radix esse possit. Neque difficile est ad unum terminum reducere omnes illos, qui eodem modo ab æquationis radice denominantur. Etenim reliquis literis cognitis existentibus, facile est, tales assumere, quæ supponantur æquales iis omnibus, quæ eandem habent radicis denominationem; vel etiam ei, quod designatur per fractionem, quam termini efficere ponantur. Atque hinc fit, quòd loco terminorum, ubi y reperitur sine x , solummodo ponatur $2m$, quippe quod supponitur æquale omnibus simul terminis ejusdem denominationis. Loco autem eorum

omnium, ubi y & x simul reperiuntur, (liquidem hæc Geometriæ Methodus postulat, ut x retineatur, ac nihilominus terminus qui-
libet plures quam duas dimensiones habere non debeat,) ponitur
tantum $\frac{2n}{x}xy$, ut sic designentur fractiones omnes, quæ similiter
habent radicis denominationem. Quod verò loco my & $\frac{n}{x}xy$
sumatur $2my$ & $\frac{2n}{x}xy$, id tantum in cum finem sit, ut facilius ad
æquationis radicem perveniat: ad quam obtinendam requiritur,
ut literarum m & n semisses accipiantur. Sicut superius vidi-
mus pag. 6 & 7, ubi de radicis extractione, quando æquatio
duas solum dimensiones habet, sumus loquuti.

Postquam igitur termini, in quibus y absque x , atque etiam
in quibus y & x simul reperiuntur, hoc modo ad simpliciores
reducti sunt, extrahitur radix ex Equatione eaque exprimitur
juxta id, quod pag. 6 & 7 fuit dictum. Quemadmodum videre
licet in exemplo pag. 27, ubi radix est

$$y \propto m - \frac{n}{x} + \sqrt{m^2 + \frac{2mn}{x}x + \frac{n^2x^2}{x^2} + \frac{bcfgix - bcfgx^2}{x^2} - \frac{bcfgx^2}{x^2}}$$

Deinde sumenda est m^2 pro omnibus terminis in vinculo, in quibus
 x non reperitur, cujus quantitas m eadem est in æquatione
proposita cum ea, quæ est extra vinculum; sed aliàs potest esse
diversa, quo casu loco m extra vinculum præstat quodammodo
aliam literam assumere. Post quæ præter terminos, in quibus x
absque y reperitur, nihil reducendum restat. Possunt autem hi
duobus modis se habere: prout nimirum habebitur vel x^2 , vel x
simpliciter. Unde fit, ut etiam, loco terminorum omnium, in
quibus x simpliciter reperitur, scribendum sit ox . Quo loco
notandum quoque venit, literam o quantitatem aliquam hic de-
signare, non autem cyphram: quandoquidem æqualis est ac loco
illorum omnium scribitur, quæ cum x junguntur; aliàs enim
D. des Cartes eâ ordinariè ad cyphram seu nihil denotandum uti-
tur: ita ut quodammodo hic, ad confusionem evitandam, præ-
stare videatur, pro o aliam quandam literam substituere. Sed hæc
monuisse sufficiat. Denique reducendæ sunt etiam literæ, quæ
cum x^2 junguntur, quæque nil præter fractionem designare pos-
sunt: cum x^2 duas habeat dimensiones, hoc videlicet modo:

$\frac{p}{m}x^2$. Vbi considerare oportet, quòd litera m fractionis $\frac{p}{m}$ eadem
quan-

quantitas existat, quæ in m^2 in vinculo. Quâ quidem methodo nulla habebitur æquatio, cujus radix ad duas tantum dimensiones ascendit, quæ, prout ex illa educta est, non reducatur ad hanc formulam: $y \propto m - \frac{n}{z} x + \sqrt{m^2 + 0x - \frac{p}{m} x^2}$. Ita ut hæc ipsa quibuscumque Locis Planis & Solidis construendis inservire queat: cum omnes locos sive terminos, qui in eorum æquationibus reperiri possunt, comprehendat; adeoque non nisi signorum $+$ & $-$ variationem, atque loca & terminos, qui in propositis æquationibus deprehendi nequeunt, considerare oporteat. Quæ quidem omnia à D. des Cartes sunt animadvertenda. Nos verò ea duntaxat, quæ difficultatem aliquam afferre possent, illustrare conabimur.

OBSERVATIO PRIMA.

Postquam æquatio ad supradictam formulam est reducta, & illa, sive æquæ multos, sive pauciores terminos habens, etiam fractionibus numericis est affecta: ut exempli gratiâ, si loco $\frac{n}{z} x$ habeatur $\frac{1}{2} x$, potest operatio institui per hæc fractiones, supponendo, numeratorem 3 esse æqualem numeratori n , & denominatorem 4 æqualem denominatori z . Idem intellige de aliis fractionibus numericis, quæ æquales sunt, & ad literas superioris formulæ referuntur. Vnde cum habetur fractio denotata hoc pacto $x \sqrt{\frac{1}{2}}$ loco $\frac{n}{z} x$; erit litera n æqualis $\sqrt{3}$, & z æqualis $\sqrt{4}$, atque ita de aliis. Est autem bene observandum, quod diximus: nimirum, si in æquatione reperiatur m^2 , denominatorem m fractionis $\frac{p}{m} x^2$ tum esse æqualem ipsi m quantitatis m^2 . id quod facile est, etiamsi alia fractio haberetur, modò supponamus, m esse ad p , sicut denominator hujus fractionis ad suum numeratorem: quandoquidem hoc modo fractiones fiunt æquales. Quod si autem id per numeros fieri non possit, operandum erit per literas, quod sæpe est commodissimum. Porro observandum est, quod ex terminis, qui inveniendis, centro, lateri recto, & transverso inserviunt, non aliæ literæ usurpandæ sint, quàm quæ in æquatione reperiuntur; & quod reliquæ literæ eorundem


terminorum non magis sint considerandæ, quàm si non haberentur. Cujus ratio est, quòd D. des Cartes, ut universaliter hæc tractaret, terminos hosce ejusmodi constitutionis effecerit, in qua loca omnia forent repleta. Adeoque literæ locorum, quæ in præposita æquatione non reperiuntur, non annumerandæ sunt terminis, qui centris, lateribus rectis, & transversis exprimendis inserviunt.

OBSERVATIO SECVNDA.

P Ag. 27. casus, cùm in æquatione non habetur m , difficultatem afferre posset, quare ad illum intelligendum cogitandum est, quòd, quando in æquatione non habetur m , ducenda itidem pon sit linea IK in figura ejusdem paginæ. Ac proinde, ut inveniat L I, postquam habetur $\frac{n}{2}x$, non referenda est illa ad IK sed ad AB, eodem modo, quo D. des Cartes ipsam comparat ipsi IK. Quandoquidem facere oportet, ut AB sit ad BL, sicut z ad n , hoc est, ut AB existente x , BL sit $\frac{n}{2}x$, atque ut punctum L cadat ex parte puncti C, si habeatur $-\frac{n}{2}x$; at ex altera parte versùs R, si reperiat $+\frac{n}{2}x$. Quo facto, ducenda est linea AL, per puncta A & L, quæ eadem erit quæ LI, hoc est, eodem munere fungetur, quo LI in exemplo D^m des Cartes. Et quidem cognita erit linea AL, cum linea AB, BL, angulusque ABL cognoscantur. Atque ita pro AL accipere possumus $\frac{n}{2}x$; eritque nota.

Sed rem fortassis planius per exemplum aliquod explicabimus. Sit, in exposita figura, recta linea AY, curva autem AX, cujus vertex punctum A, cujusque hæc sit proprietas: ut, assumpto in ea quolibet puncto, ut X, à quo ad rectam AY normaliter ducatur XY, sumptâque utcunque recta AB, hæc ipsa unâ cum linea AY sit ad lineam AY, sicut linea AY ad lineam XY.


Esto AB $\propto b$, AY $\propto y$, & AK æqualis ac parallela ipsi XY $\propto x$. Hinc cum $b+y$ sit ad y , sicut y ad x , erit $y \propto xy + xb$, & $y \propto \frac{1}{2}x + \sqrt{\frac{1}{4}x^2 + xb}$. Vnde ex iis, quæ habentur pag. 29. constat, lineam hanc esse Hyperbolam, eò quòd habetur $+\frac{1}{2}x^2$. Ad quam construendam, cum AK sit x , linea KL erit $\frac{1}{2}x$, quan-



quandoquidem hæc fractio æqualis est ac ipsi $\frac{a}{x}$ x respondet. Porro, quoniam rectus est angulus AKL, erit quadratum ex AL æquale quadratis ex AK & KL simul sumptis. Hinc cum quadratum ex AK sit x^2 , & quadratum ex KL $\frac{1}{4}x^2$, AL erit $\sqrt{\frac{5}{4}}x$ seu $x\sqrt{\frac{5}{4}}$; id quod æquale supponimus ipsi $\frac{a}{x}x$, at $\frac{a}{4}x^2$ ipsi $\frac{p}{m}x^2$: ita ut $\sqrt{5}$ sit a , & $\sqrt{4}$ sit x , & 1 sit p , & 4 sit m . Quibus positis, terminus $\frac{aom}{2p^2}$, qui inveniendo centro inservit, erit $\sqrt{\frac{80}{16}}bb$, cum am hoc est, $4\sqrt{5}$, valeat $\sqrt{80}$; & $2pz$, hoc est, $2\sqrt{4p}$, valeat $\sqrt{16}$; & o sit æqualis ipsi b ; & $b\sqrt{\frac{80}{16}}$ valeat $\sqrt{\frac{80}{16}}bb$, hoc est, $\sqrt{5}bb$. Quod quidem centrum sumendum est à puncto A versus M, quandoquidem Hyperbola est, & habetur $+bx$, hoc est, $+ox$, juxta pag. 30. Latus rectum hic est $\frac{o^2}{a}$, hoc est, $b\sqrt{\frac{5}{4}}$ seu $\sqrt{\frac{5}{4}}bb$. Vnde latus transversum sit $\frac{aom}{p^2}$: quoniam oportet, ut p^2 sit ad a^2m , sicut $\frac{o^2}{a}$ ad latus transversum, quod idcirco, (ut diximus,) erit $\frac{aom}{p^2}$. id quod facit $b\sqrt{\frac{80}{4}}$, hoc est, $\sqrt{20}bb$. Ac proinde

proinde cum distantia puncti A à centro sit $\sqrt{5bb}$, quæ semiffis est lateris transversi (quoniam, cum duorum quadratorum unum alterius est quadruplum, latus tantum lateris fit duplum); manifestum est, punctum A verticem fore diametri A L. Ideoque si fiat $MA \propto \sqrt{20bb}$, erit ipsa latus transversum, & latus rectum erit, (ut diximus,) $\sqrt{\frac{1}{2}bb}$. Quorum demonstratio facilis est. Nam per prop. 21. lib. 1^{mi} Conicorum Apollonii, ut latus transversum $MA \propto \sqrt{20bb}$ est ad latus rectum $\sqrt{\frac{1}{2}bb}$, ita est rectangulum M L A ad quadratum ex L X. Est autem $AL \propto \sqrt{\frac{1}{2}x^2}$. Hinc si multiplicetur $\sqrt{20bb} + \sqrt{\frac{1}{2}x^2}$ per $\sqrt{\frac{1}{2}x^2}$, habebitur rectangulum M L A, quod proinde erit $\sqrt{\frac{100}{4}bbx^2} + \sqrt{\frac{25}{16}x^4}$. Multiplicando verò id ipsum per latus rectum $\sqrt{\frac{1}{2}bb}$, exurgit $\sqrt{\frac{400}{20}b^2x^2} + \sqrt{\frac{100}{80}bbx^4}$, quod divisum per latus transversum $\sqrt{20bb}$, exhibet $\sqrt{bbx^2} + \sqrt{\frac{100}{1600}x^4}$, hoc est, $\sqrt{bbx^2} + \sqrt{\frac{1}{4}x^4}$, seu $bx + \frac{1}{4}x^2$, pro quadrato ex L X, unde ipsa L X fit $\sqrt{bx + \frac{1}{4}x^2}$. Jam si ad lineam L X addatur linea L K $\propto \frac{1}{2}x$, obtinebitur linea X K, hoc est, $y \propto \frac{1}{2}x + \sqrt{bx + \frac{1}{4}x^2}$, ac per consequens $\sqrt{bx + \frac{1}{4}x^2} \propto y - \frac{1}{2}x$. Vnde ductâ utrâque æqualitatis parte in se, fiet $bx + \frac{1}{4}x^2 \propto yy - xy + \frac{1}{4}x^2$, seu $yy \propto bx + xy$. Hinc ut $b + y$ se habet ad y , ita y se habebit ad x . Quod erat demonstrandum.

Proponatur adhuc aliud exemplum, referens cum casum in quo non reperiatur $\frac{n}{2}x$ in æquatione. Habeamus itaque æquationem hanc $yy \propto -2dy + bx$, cujus radix est $y \propto -d + \sqrt{d^2 + bx}$, quam construere oporteat. Supponatur in figura sequente A B $\propto x$, & angulus A B C ad libitum, B C autem, indefinite continuata versus B, $\propto y$; fiatque B K $\propto d$, quæ hîc idem præstat quod m in superiori formula, quoniam habetur $-d$. Ductâ autem N K indefinite parallêlâ ipsi A B, sumatur K I æqualis A B, prout ostensum fuit pag. 27 & 28. Quo factô, relinquetur tantum $\sqrt{d^2 + bx}$, & pagina sequens docet lineam quæ sita esse Parabolam, quoniam non habetur x^2 . Præterea puncto N existente vertice, linea I N esse debet $\frac{am^2}{o^2}$ hoc est, $\frac{d^2}{b}$, in hoc exemplo. Terminus denique, qui explicat latus rectum, erit $\frac{o^2}{a^2}$; idem




idem, hîc existens quod b , & fit KC ordinatum adplicata ad diametrum. Quorum demonstratio nec difficilis. Nam, secundum 11 prop. 1^{ma} Libri Conicorum Apollonii, rectangulum comprehensum sub latere recto b & linea NK $\propto \frac{d^2}{b} + x$, utpote; $dd + bx$, est æquale qua-

drato lineæ KC . Est verò linea KC æqualis ipsi BC $\propto y$, & BK $\propto d$, simul sumptis. Erit itaque linea KC $\propto y + d$, & quadratum ejus $\propto yy + 2dy + dd$. Ac proinde $yy + 2dy + dd \propto dd + bx$, & per consequens $yy \propto dd + bx$. Quod demonstrare oportebat.

OBSERVATIO TERTIA.

Paginâ 29, circa medium, dictum est, lineam quæsitam esse Circulum, cùm $nam \propto pz^2$, & cùm angulus est rectus. Verùm hoc intelligendum etiam est, cùm angulus est rectus, nec omnino habetur nam , nec pz^2 : aut cùm in æquatione literæ unius termini æquales sunt literis termini alterius. Ad pleniorẽ autem horum intellectum sequentia construamus exempla.



Habeatur æquatio $yy \propto bx - x^2$, cujus radix est $y \propto \sqrt{bx - x^2}$, & supponatur in appollita figura linea $HA \propto b$, linea $AB \propto x$, & linea

Q

linea BC vel BD $\propto y$. Manifestum autem est, lineam construendam esse Ellipsin aut Circulum, quoniam habetur $-x^2$. Non reperitur autem m , aut $\frac{n}{x}$. Et sufficit pro x sumere AB, atque centrum ab A versùs B, cùm habeatur $+ox$, hoc est, in hoc exemplo, $+bx$. Ita ut pro illo sumendum sit $\frac{aom}{2pz}$, hoc est, b divisum per 2, seu $\frac{1}{2}b$, cum non habeatur a , neque m , neque p , neque z . Latus autem rectum sit $\frac{ox}{a}$, hoc est, b ; transversum verò $\frac{aom}{pz}$, hoc est, b ; & tum considerare tantùm oportet, utrum angulus ABC an verò ABD sit rectus. Nam cum hic non habeatur aa , nec pz^2 , existente angulo (puta ABC) recto, linea quæ sita erit Circulus; at verò obliquo existente (ut ABD) erit linea quæ sita Ellipsis. Quapropter si utroque casu faciamus AE $\propto \frac{1}{2}b$, erit punctum E centrum, & AF $\propto b$ latus transversum; latus autem rectum $\propto b$, atque BC vel BD $\propto y$ ordinatim adplicata ad diametrum AF. Quorum demonstratio facilis est. Etenim quoniam utroque casu juxta 21^{am} prop^{tem} 1^{mi} libri Conicorum Apollonii latus transversum b est ad latus rectum b , sicut rectangulum FBA ad quadratum ex BC vel BD: erit rectangulum FBA æquale quadrato ex BC vel BD. Hinc cum FB sit $\propto b - x$, & AB $\propto x$, erit dictum rectangulum, hoc est, $bx - x^2$, æquale quadrato ex BC vel BD, hoc est, erit $yy \propto bx - x^2$. Quod erat demonstrandum.

Quòd si æquatio haberetur $yy \propto bb + x^2$, quæ sita linea esset Hyperbole: & si vel BC, vel BD sumatur pro y , hoc est, sive angulus sit rectus, sive obliquus; erit constructio præcedenti omnino similis; nisi quòd centrum & latus transversum sit sumendum à puncto A versùs alteram partem, nempe versùs H. Atque ita faciendo AG $\propto \frac{1}{2}b$, fiet punctum G centrum, eritque tam latus transversum, quàm rectum $\propto b$. Demonstratio præcedenti erit similis, observatis tantùm signis $+$ & $-$.

OBSERVATIO QVARTA.


A Nimadvertendum præterea est, si in æquatione non habeatur fractio ipsi x^2 adhærens, & nihilominus tamen adsit m^2 , hoc est, habeatur, verbi gratiâ, $\sqrt{m^2 + ox - x^2}$ loco $\frac{p}{m}x$; quòd

eritque LN ad MN, ut quadratum à PH ad quadratum ab MN. Hinc si LN vocetur c ; erit c ad f , sicut quadratum à PH ad quadratum ab MN, hoc est, ut quadratum ex AD $\propto x^2 + yy$ ad quadratum ex DB $\propto yy + bb - 2bx + x^2$. Ac proinde productum extremorum erit æquale producto mediorum, hoc est, $fx^2 + fyy \propto cyy + cbb - 2cbx + cx^2$, & per consequens, $cyy - fyy \propto cbb + 2cbx - cx^2 + fx^2$, ac denuo $yy \propto \frac{-cbb + 2cbx - cx^2 + fx^2}{c-f}$, & tandem $y \propto \sqrt{\frac{-cbb + 2cbx - cx^2 + fx^2}{c-f}}$.

Ad abbreviandum autem hunc terminum $\frac{-cx^2 + fx^2}{c-f}$; licet consideremus, quòd $f - c$ & $c - f$ exprimant semper unam eandemque differentiam, quippe quæ est inter c & f , etiamsi c major sit quàm f (dum in operatione supponimus $b \propto c - f$); semper tamen habebimus $\frac{-cx^2 + fx^2}{c-f} \propto \frac{-bx^2}{b}$, hoc est x^2 simpliciter; adeò ut relinquatur $y \propto \sqrt{\frac{-cbb + 2cbx}{c-f} - x^2}$. Id quod nos docet, locum esse Planum, cumque Circulum existere: cum habeatur $-x^2$, angulusque AGD sit rectus, & $am \propto pz^2$; neque enim hîc habetur a , neque z ; atque m ipsi p æqualis supponitur; cum nulla ipsi x^2 fractio adhæreat. Quibus ita constitutis Circulum hoc modo inveniemus.

Terminus, qui centrum nobis exhibere debet, est $\frac{aom}{2pz}$, ex quo nobis præter $\frac{o}{2}$ nihil inservit: cum m ipsi p sit æqualis; hoc est, pro eo tantum habebimus $\frac{cb}{c-f}$. Ac idcirco, postquam linea LM æquatur $c - f$, si fiat ut linea LM $\propto c - f$ ad lineam LN $\propto c$, ita linea AB $\propto b$ ad lineam AC, erit linea AC $\propto \frac{cb}{c-f}$, & punctum C centrum Circuli. Sumendum autem id erit ab A versus B, quoniam habetur $+\frac{2cbx}{c-f}$, respondens ipsi ox . Præterea, quoniam in Circulo latus rectum & transversum sibi invicem sunt æqualia, alterutro tantum erit opus. Formula autem lateris recti hîc est $\sqrt{\frac{o^2 x^2}{a^2} - \frac{4mpx^2}{a^2}}$. Vnde quidem illud, quod nobis in hoc exemplo inservit, non aliud erit quàm $\sqrt{aa - 4m^2}$, hoc est, quòd,

quodd, auferendo quadratum $\frac{4cb^2}{c-f}$ à quadrato ex $\frac{2cb}{c-f}$, relinqua-
tur quadratum lateris recti. Est autem paulò antè inventa linea.



$AC \propto \frac{cb}{c-f}$; ideoque ejus dupla $AQ \propto \frac{2cb}{c-f}$. Hinc invenire
adhuc oportet $\frac{4cb^2}{c-f}$, quod repræsentatur per $4m^2$. Invenitur
autem; ponendo esse, ut $e-f$ ad e , ita bb ad $\frac{cb^2}{c-f}$. at ut $e-f$
est ad e , sic $AB \propto b$ est ad AC . Quapropter erit ut b ad lineam
 AC , sic bb ad $\frac{cb^2}{c-f}$. Quoniam autem ratio duorum quadratorum
ad invicem duplicata est rationis, quam inter se habent ipsorum
latera: hinc, si ponamus lineam AE mediam proportionalem in-
ter b & lineam AC ; erit b ad lineam AE , sicut b ad $\sqrt{\frac{cb^2}{c-f}}$. & per
consequens linea $AE \propto \sqrt{\frac{cb^2}{c-f}}$. Vnde si AR fiat dupla ipsius
 AE , erit ea æqualis $\sqrt{\frac{4cb^2}{c-f}}$. Adeoque si constituamus triangu-
lum ARQ , cujus latus AQ sit æquale $\frac{2cb}{c-f}$ (ut dictum est), cu-
jusque angulus ARQ sit rectus; erit latus $RQ \propto \sqrt{e^2 - 4m^2}$
quandoquidem quadratum ejus æquatur quadrato lineæ $\frac{2cb}{c-f}$, mi-
nus quadrato $\frac{4cb^2}{c-f}$. Atque ita RQ fit & latus rectum & diame-
ter Circuli. Et si ex centro C ducatur linea CE parallela ipfi
Q 3 R Q,

RQ, erit ipsa æqualis radio Circuli, utpote æqualis semissili-
nex RQ.

Et hæc quidem quantum ad constructionem juxta hanc Me-
thodum, quæ, postquam jam est inventa, brevior reddi potest.
Nam cum angulus AEC sit rectus, & AE media proportiona-
lis inter AC & AB, similia erunt triangula AEC, ABE, &
EBC; ac proinde AC ad CE, ut CE ad CB. Vt autem AB
est ad AC, ita est LM ad LN. Quare per conversionem ra-
tionis erit AC ad BC, ut LN ad NM. At verò ut ratio AC
ad CB duplicata est rationis AC ad CE (propterea quòd CE
media est proportionalis inter AC & CB), ita etiam, cum linea
PH media sit proportionalis inter LN & NM (per constru-
ctionem): erit ratio LN ad NM, hoc est, AC ad CB, dupli-
cata rationis LN ad PH. Quapropter erit ut LN ad PH, seu
PH ad MN, ita AC ad CE; quæ quidem Circuli radius est.
Demonstratio hujus constructionis ad imitationem præceden-
tium inveniri potest, quam hic omittimus: cum illa ab Eutocio
initio commentariorum ejus in Apollonii Conica sit ostensa.

OBSERVATIO QUINTA.


PAG. 21 hujus Geometriz dictum est: quòd, postquam hæc
æquatio non ascendit ultra rectangulum duarum quantitatum
indeterminatarum, aut etiam ultra quadratum unius ex illis, linea
curva semper sit primi & simplicissimi generis, sub quo tantum
Circulus, Parabola, Hyperbola, & Ellipsis sunt comprehensæ.
Quod ita intelligendum est, duas quantitates indeterminatas
 x & y , cum separatim in Æquationis terminis reperiuntur, non
ultra sua quadrata ascendere debere; sed in terminis, ubi simul
reperiuntur, singulas non nisi unam dimensionem habere debere,
ita ut simul tantum rectangulum aliquod duarum dimensionum effi-
ciant.

Similiter, si in Æquatione reperiretur terminus aliquis, in quo
haberetur y^1 , vel x^1 ; aut y^4 , vel x^4 ; aut denique $x y^1$, vel $x^2 y$,
vel $x^3 y$: linea curva esset secundi generis. Et sic de cæteris. In
quibus omnibus solum indeterminatarum quantitatum ratio ha-
benda est, non autem quantitatum cognitarum, quibuscum jun-
guntur.

Quòd

Quòd si quantitates indeterminatæ singulæ separatim ad duas dimensiones non ascendant, neque etiam simul, hoc est, si nullus terminorum ad yy , aut ad xy assurgat; linea itidem erit primi generis, & quidem recta, non curva: adeoque locus talem æquationem præbens Planus erit, & ad lineam rectam.

Et quidem, cum locus est ad rectam lineam, Geometria hæc non minus ipsum componere docet, quàm cum locus est ad curvam lineam, quæ sit primi generis, & cum in æquatione habetur yy : sicut ubique in æquatione hujus Geometriæ pro Pappi quæstione, ex qua superior formula deducta fuit, cernere licet. Quòd si verò habeatur x^2 in æquatione, non autem yy , immutanda tantum erunt nomina quantitatum indeterminatarum, ita ut appelletur y , quæ dicta fuit x , & x , quæ dicta fuit y : in hunc modum. Esto in sequenti figura $AB \propto x$, & $BC \propto y$, atque æquatio inventa $x^2 \propto by$, quam ad dictam formulam reducere oportet.




Ducta igitur AD parallelâ ipsi BC , & DC parallelâ ipsi AB , mutatisque nominibus quantitatum indeterminatarum, nimirum appellando AD , cui æqualis est BC , x , & DC , quæ æqualis est AB , y ; quæ sita æ-

quatio erit $yy \propto bx$. cujus radix est $y \propto \sqrt{bx}$. Atque ita deducta erit ad formulam, quæ nos docet punctum C fore in Parabola.

At verò si in æquatione non habeatur x^2 , nec yy , sed xy ; qui quidem casus, quoniam nec in æquatione quæstionis Pappi reperitur, neque ad formulam ex ea deductam refertur; difficultatem aliquam asferre posset, quam propterea enodabimus.

Æquatio autem hæc ad summum plures quàm quatuor terminos non comprehendit: unum nimirum, ubi x reperitur sine y ; alterum, ubi y reperitur sine x ; tertium, ubi reperitur xy ; ac quartum denique, ubi neque x neque y reperitur. Adeò ut varietas omnis reducat ad 17 formulas æquationum ac constructionum, quæ sequenti pag. 129 exhibentur. Quarum quidem ope videre licet, quonam pacto locus semper ad Hyperbolam existat, lineæque indeterminatæ sint Asymptoti, aut ipsi parallelæ.

Detur enim positio lineæ BH , punctum autem in ea datum sit A : deinde assumptâ lineâ AX pro x , ductâque lineâ XY , quam pro y sumemus, facientem cum AX talem angulum, qualem



len libuerit, eaque indefinitè productâ : ducantur lineæ DK, LP, QT parallelæ ipsi BH; ita ut DK cadat infra BH; LP autem supra BH, inter puncta X & Y; QT verò ultra punctum Y. Eodem modo ducantur lineæ QD, RAE, SF, TK parallelæ ipsi XY seu ZG; ita ut linea QD transeat per lineam XA, productam versùs A; & SF per eandem inter puncta A & X; nec non linea TK per eandem AX, productam versùs X. Quibus ita constitutis, si per 4^{am} Prop^{tem} 2^{di} libri Conicorum Apollonii describatur Hyperbola, quæ transeat per punctum Y, cuiusque Asymptoti sint lineæ, quas refert quælibet constructio; manifestum est, per 12 Prop^{tem} ejusdem libri rectangula omnia, quæ ad easdem lineas similiter sumuntur, sibi invicem esse æqualia. Ideoque demonstrandum solùm restat, Asymptotos, atque rectangulum uniuscujusque æquationis, ritè esse constructa.

Esto igitur secundùm ultimam æquationem Hyperbola constructa, transiens per punctum Y, cuiusque Asymptoti sint DQ, & DG; & rectangulum, contentum sub lineis DG, GY, sit æquale rectangulo dato $df + bc$. Hinc si juxta constructionem fecerimus lineas $AX \propto x$, $XY \propto y$, $AB \propto c$, BD vel $XG \propto b$: manifestum est, BX vel DG fore $x + c$; GY autem $y + b$; atque multiplicando unam per alteram proditurum $bc + bx + cy + xy$, pro rectangulo linearum DG, GY. quod aliunde quoque æquatur $df + bc$. Ac proinde, si utrinque commune auferatur rectangulum bc , relinquetur $xy + cy + bx \propto df$ quæ est æquatio proposita. Eodem modo reliquarum omnium æquationum & constructionum demonstratio ostendetur.

Æqua

Æquat. 1^{ma}.
 $xy \propto df.$

Constructio.
Rectangulum $AXY \propto df.$ $AM \propto b.$
Asymptoti $XA, AR.$

Æquat. 8.
 $xy - bx \propto df.$

Constr.
Rectang. $MOY \propto df.$
Asympt. $RM, MO.$

Æquat. 13.
 $xy - cy - bx - df \propto 0.$

Constr.
AC $\propto c$, CN $\propto b.$
Asympt. $SN, NO.$
Rectang. $NOY \propto df + bc.$

Æquat. 2.
 $xy + cy \propto bx.$

Constr.
AB $\propto c$, BQ $\propto b.$
Asympt. $BQ, QZ.$
Rectang. $QZY \propto bc.$

Æquat. 9.
 $xy + df \propto cy.$

Constr.
AH $\propto c.$
Asympt. $AH, HT.$
Rectang. $HXY \propto df.$

Æquat. 14.
 $xy + cy - bx + df \propto 0.$

Constr.
AB $\propto c$, BQ $\propto b.$
Asympt. $BQ, QZ.$
Rectang. $QZY \propto df + bc.$

Æquat. 3.
 $xy + bx \propto cy.$

Constr.
AH $\propto c$, HK $\propto b.$
Asympt. $EK, KT.$
Rectang. $KGY \propto bc.$

Æquat. 10.
 $xy + df \propto bx.$

Constr.
AR $\propto b.$
Asympt. $AR, RZ.$
Rectang. $RZY \propto df.$

Æquat. 15.
 $xy + bx - cy + df \propto 0.$

Constr.
AH $\propto c$, HK $\propto b.$
Asympt. $EK, KT.$
Rectang. $KGY \propto df + bc.$

Æquat. 4.
 $xy - cy \propto bx.$

Constr.
AC $\propto c$, CN $\propto b.$
Asympt. $SN, NO.$
Rectang. $NOY \propto bc.$

Æquat. 11.
 $xy + cy - bx - df \propto 0.$

Constr. quando df excedit bc.
AB $\propto c$, BL $\propto b.$
Asympt. $QL, LO.$
Rectang. $LOY \propto df - bc.$
Constr. cum bc excedit df.
AB $\propto c$, BQ $\propto b.$
Asympt. $BQ, QZ.$
Rectang. $QZY \propto bc - df.$

Æquat. 16.
 $xy - cy - bx + df \propto 0.$

Constr. quando df superat bc.
AH $\propto c$, HP $\propto b.$
Asympt. $MP, PT.$
Rectang. $PQY \propto df - bc.$
Constr. cum bc superat df.
AH $\propto c$, HT $\propto b.$
Asympt. $HT, TQ.$
Rectang. $TZY \propto bc - df.$

Æquat. 5.
 $xy + cy \propto df.$

Constr.
AB $\propto c.$
Asympt. $QB, BX.$
Rectang. $BXY \propto df.$

Æquat. 12.
 $xy + bx - cy - df \propto 0.$

Constr. quando rectang. df majus est rectangulo bc.
AC $\propto c$, CF $\propto b.$
Asympt. $SF, FG.$
Rectang. $FGY \propto df - bc.$
Constr. quando bc rectang. excedit rectang. df.
AH $\propto c$, HK $\propto b.$
Asympt. $EK, KT.$
Rectang. $KGY \propto bc - df.$

Æquat. 17^{ma} & ultima.
 $xy + cy + bx - df \propto 0.$


Constr.
AB $\propto c$, BD $\propto b.$
Asympt. $QD, DG.$
Rectang. $DGY \propto df + bc.$

Æquat. 6.
 $xy + bx \propto df.$

Constr.
AE $\propto b.$
Asympt. $RE, EG.$
Rectang. $EGY \propto df.$

Æquat. 7.
 $xy - cy \propto df.$

Constr.
AC $\propto c.$
Asympt. $SC, CX.$
Rectang. $CXY \propto df.$



Præterea evidens est, in 11^{ma} , 12^{ma} , & 16^{ta} æquatione existente rectangulo df æquali bc , si hoc ipsum in locum df substituat, undecimam quidem tunc fore divisibilem per $x + c$, duodecimam per $y + b$, & decimam sextam per $c - x$; Vtramque autem 11^{ma} & 16^{ta} posse reduci ad $y \propto b$; at 12^{ma} ad $x \propto c$. Aded ut tunc tantum locum ad lineam rectam exhibeant, quando habetur $y \propto b$, & $X Y$ ipsi b sit æqualis, atque per punctum Y recta linea ducitur ipsi $A X$ parallela, ut habeatur quæsitæ; Aut quando habetur $x \propto c$, & $X A$ ipsi c sit æqualis, erit parallela $A R$ linea recta quæsitæ.

Cæterum potuimus quidem æquationum harum varietatem ad minorem numerum reducere, transmutando nempe unam indeterminatarum quantitatum in alteram (sicut in eum finem illas, quæ mutationem hanc recipere possunt, ordine disposuimus); tum etiam constructiones illarum, in quibus quatuor termini non reperiuntur, comprehendere sub iis, quæ omnes habent completos: sed quoniam multò prolixiori indiguissimus sermone, & res ipsa minus fuisset dilucida, ratione ostensâ uti maluimus.

AD PAGINAM 40 ET SEQUENTES, DE MODO
INVENIENDI CONTINGENTES LINEARVM. CURVARVM.

NOtandum hîc est, modum inveniendi tangentes linearum curvarum, hoc loco expositum, consistere in inveniendâ æquatione, in quâ linea y vocata sumi potest pro duabus quantitibus diversis, cùm linea quæ vocatur v ad tangentem non refertur,

est proportionalis inter PL & LN , erit $L N \propto \frac{2by^3 + y^4}{b^3 + b^2y + by^2 + y^3}$.

Quod erat faciendum. Vel etiam sic, imaginando curvam AM tangi à circulo, cujus radius est MN . Omnino ut in hujus Geometriæ Methodo supponitur factum.

Igitur quoniam habemus $\frac{y^3}{y+b} \propto x$, ac proinde $x^3 \propto \frac{y^3}{y+b}$ supponamus, quemadmodum hæc Geometria requirit, $AN \propto v$, & $MN \propto s$, & erit quadratum ex LM , hoc est, $x^2 \propto ss - vv + 2vy - yy$, ac idcirco $\frac{y^3}{y+b} \propto ss - vv + 2vy - yy$. Unde æquatione ope multiplicationis ordinatâ, divisâque totâ summâ per 2, exurgit æquatio talis:

$$\begin{array}{r} y^4 + by^3 + \frac{1}{2}vvyy + bvv y + \frac{1}{2}bbvv \propto 0. \\ -v \quad + \frac{1}{2}bb \quad -bbv \quad -\frac{1}{2}bbs \\ -2bv \quad -bss \\ -\frac{1}{2}ss. \end{array}$$

Iam verò multiplicando $yy - 2ey + ee \propto 0$ per $yy + fy + gg$, ut alteri reddatur similis, proveniet hæc æquatio:

$$\begin{array}{r} y^4 + fy^3 + ggyy - 2eggy + eegg \propto 0. \\ -2e - 2ef + eef \\ + ee \end{array}$$

Quæ si comparetur cum præcedente, quantitates secundi termini præbebunt $f \propto b + 2e - v$; ultimi $gg \propto \frac{b^2v^3 - b^2s^3}{2e^3}$; & tertii $\frac{b^2v^3 - b^2s^3}{2e^3} - 2be - 3ee + 2ev \propto \frac{1}{2}vv + \frac{1}{2}bb - 2bv - \frac{1}{2}ss$.

Ac proinde si multiplicemus totum per $2ee$, producet $+bbvv - bbss - 4be^3 - 6e^4 + 4ve^3 \propto vvee + bbbe - 4bvee - ssee$, sive $bbvv - 4be^3 - 6e^4 + 4ve^3 - vvee - bbbe + 4bvee \propto bbss - eess$, & per consequens

$$\begin{array}{r} -6e^4 + 4ve^3 - vvee + bbvv \propto ss. \\ -4b \quad + 4bv \\ -bb \\ \hline bb - ee \end{array}$$

Quartus terminus dabit

$$\frac{-b^2v^3 + b^2s^3}{e} + bbe - vee + 2e^3 \propto +bbvv - bbv - bss.$$

Vnde multiplicando totum per e , fiet

$$-bbvv + bbss + be^3 - ve^3 + 2e^4 \propto +bbvv - bbv - bss.$$

ac.

$\frac{cy^3}{b^3} + \frac{d^3y}{b^3} - b^3 \propto 0$, æqualis præcedenti. Vnde multiplicando totum per b^3 , producet $y^3 - chy^2 + ddbb^3y - b^3b^3 \propto 0$. Evidens autem est, idem productum inveniri, si in æquatione proposita ponamus y , & quadratum ejus yy , cubumque y^3 , loco x , x^2 , x^3 : atque deinde secundum terminum multiplicemus per b , tertium per b^2 , & quartum per b^3 . omnino ut hæc Geometria docet. Vbi, postquam substituimus $\frac{y}{b}$, $\frac{y^2}{b^2}$, & $\frac{y^3}{b^3}$ loco x , x^2 , & x^3 , ad multiplicandum totum per b^3 , sufficit auferre denominatorem, qui ab b denominatur, atque tantum reliquum secundi termini multiplicare per b , reliquum tertii per bb , & reliquum quarti per b^3 : quandoquidem à terminis, secundo & tertio, auferendo denominatores bb & b , ipsi eatenus sunt multiplicati. Adèd ut sufficiat multiplicare reliquum secundi termini per b , & reliquum tertii per bb , at ipsum quartum per b^3 , cum hic denominatorem ab b denominatum, per quem sic auferendo fuisset multiplicatus, non admittat. non aliter quàm hæc Geometria docet. Quæ demonstratio & methodus in altioribus quoque æquationibus locum obtinent, in quibus radix x plures dimensiones, quàm in æquatione proposita, admittit.

Notandum autem est, cùm termini æquationis hujus sic producti non singuli æquè multas literas seu dimensiones habent, lineam, quam pro unitate ad libitum sumpsimus, & cujus ratione supposuimus $\frac{y}{b} \propto x$, toties in terminis, qui pauciores dimensiones seu literas habent, subintelligendam esse, quoties fuerit opus. Adèd ut ejusdem lineæ beneficio termini abbreviari possint, sic ut singuli non nisi tres literas seu dimensiones admittant, ac præterea ut illius ope, postquam radix una y fuerit cognita, mediante æquatione $\frac{y}{b} \propto x$, cognoscatur quoque radix altera x .

Ad hæc supponere quoque possumus $yy \propto xb$, ita ut habeamus $\frac{y^2}{b^2} \propto x$, & $\frac{y^4}{b^4} \propto x^2$, nec non $\frac{y^6}{b^6} \propto x^3$; quibus, ut supra, subrogatis, habebimus $\frac{y^6}{b^6} - \frac{cy^4}{b^6} + \frac{d^2y^2}{b^6} - b^6 \propto 0$. Ac proinde multiplicando totum per b^6 , fiet $y^6 - chy^4 + ddbb^6yy - b^6b^6 \propto 0$. Vnde perspicuum fit, quòd substituendo, juxta præscriptum hujus Geometriæ, yy pro x , quadratum ejus y^4 pro x^2 , & ipsius

& ipsius cubum y^6 pro x^3 , atque multiplicando secundum terminum per b , tertium per bb , & quartum per b^3 , eandem consecuturi sumus æquationem. ut ex demonstratione superiori facile est colligere; & omnes quidem termini æquè multas habebunt litteras seu dimensiones. Et tantum de operatione per litteras.

Quod autem spectat ad operationem, quæ fit, cum radix incognita per numerum aliquem est multiplicanda; ipsa eidem demonstrationi innititur.

Esto eadem, quæ supra, æquatio: $x^3 - cxx + ddx - b^3 = 0$; & oporteat radicem incognitam x multiplicare per 3. Supponatur $y = 3x$, eritque $\frac{y}{3} = x$, & $\frac{y^3}{9} = x^3$, nec non $\frac{y^3}{27} = x^3$. Quibus, ut supra, substitutis, fiet $\frac{y^3}{27} - \frac{cyy}{9} + \frac{ddy}{3} - b^3 = 0$. Ac proinde multiplicato toto per 27, exsurget $y^3 - 3cyy + 9ddy - 27b^3 = 0$. Quæ æquatio etiam invenitur, si in æquatione proposita substituamus y , quadratum ejus yy , & ipsius cubum y^3 , loco x , quadrati x^2 , & x^3 cubi; atque deinde secundum terminum per 3 multiplicemus, tertium per 9, & quartum per 27, ex præscripto hujus Geometriæ. Quæ quidem operatione termini omnes, ob rationes supra allatas, æquè multas dimensiones acquirent.

Idem intelligendum est de exemplo in hac Geometria proposito, $x^3 - x\sqrt{3} + \frac{26}{27}x - \frac{8}{27}\sqrt{3} = 0$. Etenim supposito $y = x\sqrt{3}$, erit $\frac{y}{\sqrt{3}} = x$, & $\frac{y^3}{3} = x^3$, nec non $\frac{y^3}{3\sqrt{3}} = x^3$. Vnde si in æquatione proposita substituamus $\frac{y}{\sqrt{3}}$, quadratum ejus $\frac{y^2}{3}$, & ipsius cubum $\frac{y^3}{3\sqrt{3}}$, in locum x , quadrati x^2 , & cubi x^3 , invenietur $\frac{y^3}{3\sqrt{3}} - \frac{y\sqrt{3}}{3} + \frac{26y}{27\sqrt{3}} - \frac{8}{27\sqrt{3}} = 0$. Atque adeò si totum multiplicemus per $3\sqrt{3}$, habebitur $y^3 - 3yy + \frac{26}{9}y - \frac{8}{9} = 0$. Eadem nempe æquatio, quæ obtinetur operando juxta hujus Geometriæ methodum, quemadmodum supra fuit ostensum.

Non secus fiet demonstratio, si de radice incognita per quantitatem aliquam cognitam dividenda agatur. Proponatur namque æquatio $x^3 - cxx + ddx - b^3 = 0$, sitque x dividenda per b .

Sup.

Supponatur $y \propto \frac{x}{b}$, critque $y h \propto x$, & $y^3 h^3 \propto x^3$, nec non $y^3 h^3 \propto x^3$. Quæ si in æquatione proposita substituantur, fiet $y^3 h^3 - c h^3 y^3 + d^3 h y - b^3 \propto 0$. Ac proinde si totum dividatur per h^3 , orietur $y^3 - \frac{c}{b} y^3 + \frac{d^3}{b^3} y - \frac{b^3}{b^3} \propto 0$.

Manifestum autem est, idem nos obtenturos, si in æquatione proposita subrogemus y , quadratum ejus yy , & ipsius cubum y^3 , in locum x , quadrati x^2 , & cubi x^3 , atque sic deinde secundum terminum dividamus per h , tertium per $h h$, & quartum per h^3 : quoniam in superiori operatione, ubi $h h$ in secundo termino, & h in tertio reperitur, perspicuum est, quod, ad dividendum omnes terminos per h^3 , auferendo toties h , quoties in ipsis reperitur, opus tantum sit dividere reliquum secundi termini per h , reliquum tertii per $h h$, ipsum autem quartum terminum per h^3 , quippe qui quantitatem h non comprehendit. Omnino ut hæc Geometria requirit.

Quia verò æquationis hujus sic productæ termini singuli non æque multas habent literas seu dimensiones; igitur ut æquales numero reddantur, oportebit in illis, qui pauciores dimensiones habent quàm requiritur, toties literam aliquam subintelligere, quoties erit opus, quæ lineam pro unitate ad libitum sumptam designet, & cujus ratione supposuimus $y \propto \frac{x}{b}$. vel potius beneficio hujus lineæ, quam pro unitate assumpsimus, & linearum cognitarum, efficere, ut singuli æquationis termini tres literas seu dimensiones habeant. Id quod facile est. Etenim cognita, v. g. lineâ $\frac{c}{b}$, pro unitate acceptâ, possumus ad eandem denotandam loco $\frac{c}{b}$ sumere p . atque ita de cæteris. Aded ut, cognita radice y , ejusdem unitatis ope cognoscatur quoque x , per æquationem hanc $y \propto \frac{x}{b}$ vel $y h \propto x$.

Nec aliter in numeris veritatem hujus Geometriæ Methodi ostendemus. Proponatur enim eadem æquatio, quæ supra, $x^3 - c x^2 + d d x - b^3 \propto 0$, & oporteat radicem incognitam x dividere per 3. Suppositâ igitur $y \propto \frac{x}{3}$, fiet $3 y \propto x$, & $9 y y \propto x^2$, nec non $27 y^3 \propto x^3$. Quæ si substituantur in æquatione proposita, habebitur $27 y^3 - 9 c y y + 3 d d y - b^3 \propto 0$. Ac proinde dividendo

totum

totum per 27, orietur $y^3 - \frac{1}{3}cyy + \frac{1}{3}ddy - \frac{1}{3}b^3 \infty 0$. Quæ æquatio quoque invenietur, si procedamus juxta hujus Geometrix Methodum: subrogando nimirum y in æquatione proposita, quadratum ejus yy , & ipsius cubum y^3 , in locum x , quadrati x^2 , & cubi x^3 : & dividendo deinde secundum terminum per 3, tertium per hujus quadratum 9, & quartum per ipsius cubum 27. Eadem demonstratio locum obtinet, si in æquatione radix incognita plures dimensionēs habuerit.

AD PAGINAM 79, & sequentes.

Proponatur $x^4 + px^3 + qx - r \infty 0$, & supponatur juxta præscriptum hujus Geometrix $x^2 + yx + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y} \infty 0$, eritque $x^2 + \frac{1}{2}yy + \frac{1}{2}p \infty \frac{q}{2y} - yx$, ac proinde quadratum unius partis æquale quadrato partis alterius, hoc est, $x^4 + yyxx + \frac{1}{2}y^4 + px^3 + \frac{1}{2}pyy + \frac{1}{2}pp \infty \frac{q^2}{4y^2} - qx + yyx^2$, & consequenter $x^4 + \frac{1}{2}y^4 + px^3 + \frac{1}{2}pyy + \frac{1}{2}pp + qx - \frac{q}{4y^2} \infty 0$. Ex qua æquatione si tollatur prima $x^4 + px^3 + qx - r \infty 0$, relinquetur $\frac{1}{2}y^4 + \frac{1}{2}py^2 + \frac{1}{2}pp + r - \frac{q^2}{4y^2} \infty 0$. Vnde multiplicando totum per $4yy$, exsurget $y^6 + 2py^4 + \frac{p^2}{4}yy - qq \infty 0$. Quod erat demonstrandum.

Eadem ratione demonstratio fiet secundum omnes variationes signorum + & -, atque observationes in hac Geometria expositas. In cujus rei exemplum duorum adhuc sequentium casuum demonstrationem subjiciemus.

Sit æquatio proposita $x^4 - px^3 + qx - r \infty 0$. Si ergo juxta hanc Geometriam supposuerimus $x^2 + yx + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y} \infty 0$, habebimus $x^2 + \frac{1}{2}yy - \frac{1}{2}p \infty \frac{q}{2y} - yx$. Vnde & quadratum unius partis æquale erit quadrato alterius partis, hoc est, $x^4 + yyx^2 + \frac{1}{2}y^4 - px^3 - \frac{1}{2}pyy + \frac{1}{2}pp \infty \frac{q^2}{4y^2} - qx + yyxx$. Et per consequens $x^4 + \frac{1}{2}y^4 - px^3 - \frac{1}{2}pyy + \frac{1}{2}pp + qx - \frac{q}{4y^2} \infty 0$. E qua si auferatur prima $x^4 - px^3 + qx - r \infty 0$.

S

relin-

relinquetur $\frac{1}{2}y^4 - \frac{1}{2}pyy + \frac{1}{2}pp + r - \frac{q^2}{4y^2} \propto 0$. Quare si totum multiplicemus per $4yy$, inueniemus $y^6 - 2py^4 + \frac{p^2}{4r}yy - qq \propto 0$. Quod demonstrare oportebat.

Iam verò si ponamus $x^4 + px^2 - qx + r \propto 0$, supponendo secundum hanc Geometriam $x^2 - yx + \frac{1}{2}yy + \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y} \propto 0$; erit $x^4 + \frac{1}{2}yy + \frac{1}{2}p \propto \frac{q}{2y} + yx$. Vnde quadratum prioris partis æquale erit quadrato posterioris, hoc est, $x^4 + yyx^2 + \frac{1}{2}y^4 + px^2 + \frac{1}{2}pyy + \frac{1}{2}pp \propto yyx^2 + qx + \frac{qq}{4yy}$. Ac per consequens, $x^4 + \frac{1}{2}y^4 + px^2 + \frac{1}{2}pyy + \frac{1}{2}pp - qx - \frac{qq}{4y} \propto 0$. E qua si tollatur prima $x^4 + px^2 - qx + r \propto 0$, remanebit $\frac{1}{2}y^4 + \frac{1}{2}pyy + \frac{1}{2}pp - r - \frac{qq}{4yy} \propto 0$. Atque ideo si totum multiplicetur per $4yy$, inuenietur $y^6 + 2py^4 + \frac{p^2}{4r}yy - qq \propto 0$. Quod erat demonstrandum.

Non secus demonstrabuntur omnes reliqui casus secundum utramlibet harum suppositionum: nimirum, $x^2 - yx + \frac{1}{2}yy - \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y} \propto 0$, aut $x^2 + yx + \frac{1}{2}yy - \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y} \propto 0$, observando tantum signa $+$ & $-$, quemadmodum hæc Geometria docet. Cujus operationis ope in genere æquationes omnes, in quibus radix incognita 4^{ta} habet dimensiones, ad formam, in hac Geometria propositam, reduci possunt: nimirum, $+y^6 - 2py^4 + \frac{p^2}{4r}yy - qq \propto 0$. signa $+$ & $-$ quæ præcipit, observando, sicut demonstravimus. Quo fit, ut, si divisionis beneficio æquationem propositam ad eam formam reducere possimus, ita ut post divisionem radix ejus y plures quàm duas dimensiones non admittat, ipsa per Geometriam communem, juxta præscripta paginæ 6 & 7 hujus Geometriæ inveniri possit. Quæ inventa, mediantibus æquationibus $x^2 - yx + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y} \propto 0$, & $x^2 + yx + \frac{1}{2}yy - \frac{1}{2}p - \frac{q}{2y} \propto 0$, (observando signa $+$ & $-$, ponenda locis, ubi sunt omissa) inuenietur quoque radix x , cujus loco in altera æquatione pro radice supposueramus y . At verò si æquatio

supra.

supra inventa, denominata à radice y , sic dividi nequeat, tunc considerare illam poterimus, velut tres duntaxat dimensiones habentem, supponendo scilicet $x \propto yy$, ipsamque substituendo in

$$\text{æquatione} ; \text{ adeò ut habeamus } x^3 - 2px^2 + \frac{pp}{4r}x - qq \propto 0.$$

Quæ, observatis iisdem signis $+$ & $-$, quæ in altera æquatione reperiuntur, & sublatò secundo termino, per id, quod pag. 73 dictum est, reducetur ad formam aliquam illarum trium, quæ habentur paginâ 93, ad inveniendam deinde radicem ejus x per Geometriam Solidorum, juxta pag. 85, & sequentes. Quæ certe eadem futura est quæ yy , quâ cognitâ innotescet & y . Cujus ope atque duarum superiorum æquationem tandem invenietur x .

Verum enimverò observandum est, in omnibus præcedentibus operationibus utendum esse eâdem lineâ, quæ pro unitate est accepta, si illam determinamus, & usurpamus ad æquationem propositam reducendam ad superioris formam, nempe: $x^4 * px^2 . qx . r \propto 0$, observando signa $+$ & $-$.

Verum equidem est, quòd, postquam æquationem hanc ad præcedentis formam reduximus, quæ à radice y sit denominata, nimirum ad æquationem $y^6 . 2py^4 + \frac{p^2}{4r}yy - qq \propto 0$, quæque dividi seu reduci non possit, ita ut radix ejus y plures quàm duas dimensiones habeat, non tencamur ulterius progredi: (siquidem illo casu Problema non Planum, sed Solidum existit, juxta pag. 80) atque tunc contenti esse possimus æquatione primâ $x^4 * px^2 . qx . r \propto 0$ (cum per illam invenire possimus radicem x mediante Geometriâ Solidorum, secundùm paginam 85 & sequentes): Attamen nihilominus operatione præcedente, quam explicavimus, uti possumus, saltem ut ostendatur veritas ejus, quod habetur pag. 93 & 94, ubi dicitur, quòd Problemata omnia, quorum difficultates ad æquationem, quæ ultra quadrato-quadratum non ascendit, reducuntur, semper ad formam aliquam earum, quæ paginâ 93 proponuntur, reduci queant.

AD PAGINAM 93.

QVandoquidem ex eo, quod in hac Geometria ostensum atque supra adnotatum est, liquet, æquationes omnes, quarum difficultates ultra Quadrato-quadratum aut Cubum non

ascendunt, reduci posse ad aliquam formam earum, quæ hæc paginâ proponuntur: exhibenda tantùm restat demonstratio radicem, quæ ex ipsis, secundùm Cardani regulas, quas super hac re in medium affert Capite secundo libri ejus, quem de Arte Magna seu Regulis Algebraicis inscripsit, educuntur. Cum hoc ipsum difficultatem fortè non exiguam parere posset iis, qui in eundem locum aliquando inciderent, quippe qui à Speciosa Algebra, & mutua inter Arithmetica & Geometria relationis atque convenientiæ ignaris, non facilè percipiatur. Quocirca ut veritas extractionis harum radicum expendatur, demonstrabimus primum sequens

L E M M A.



SEcûta utcumque lineâ A C in B, ostendendum est: Cubum lineæ A B, unâ cum cubo lineæ B C, & triplo producto linearum A C,

B C, A B, simul æquari cubo lineæ A C.

Sit $AB \propto a$, $BC \propto b$, eritque $AC \propto a + b$. Productum linearum A C, B C, A B, erit $baa + bba$, cujus triplum $3baa + 3bba$. Huic si addantur cubi linearum A B, B C, fiet $a^3 + 3baa + 3bba + b^3$. Et manifestum est, summam hanc æqualem esse cubo lineæ A C.

Demonstrato itaque hoc Lemmate, habebitur primo loco

$z \propto \sqrt[3]{C. + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}} - \sqrt[3]{C. - \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$.
Hinc in figura adjecta supponendo binomium

$\sqrt[3]{C. + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$ æquale lineæ A C, & residuum
 $\sqrt[3]{C. - \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$ æquale lineæ B C, erit eorum
differentia $\sqrt[3]{C. + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$,

$-\sqrt[3]{C. - \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$ æqualis lineæ A B. Iam vero statuendo $AB \propto z$, erit differentia Cuborum ex his radicibus (nimirum differentia inter cubum $+ \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}$, & cubum $-\frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}$, (auferendo hunc ab illo) æqualis q. Quæ propterea æqualis erit differentie inter cubum li-

near

neq. B C. Atqui cubus lineæ A B, & triplum productum linearum A C, B C, A B simul, æquantur eidem differentiæ q , (siquidem cum cubo lineæ B C componunt cubum lineæ A C). Erit itaque z^3 , cubus videlicet lineæ A B, unâ cum triplo producto linearum A C, B C, A B, æqualis q .

Vt autem habeatur hoc productum, multiplicandum est binomium $\sqrt{C. + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$, quod æquatur lineæ A C, per residuum $\sqrt{C. - \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$, quod æquale est lineæ B C. Hinc cum $\sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}$ in se multiplicatum faciat $\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3$, ac $+\frac{1}{2}q$ in $-\frac{1}{2}q$ faciat $-\frac{1}{4}qq$; quæ producta simul addita faciunt $\frac{1}{27}p^3$ (siquidem $+\frac{1}{4}qq$ & $-\frac{1}{4}qq$ addendo evanescunt): & porro producta, quæ fiunt ex $+\frac{1}{2}q$ & $-\frac{1}{2}q$ in $\sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}$, se mutuò destruant: Erit totum productum $\sqrt{C. \cdot \frac{1}{27}p^3}$ seu $\frac{1}{3}p$, radix scilicet cubica ex $\frac{1}{27}p^3$. quandoquidem quæstio erat de multiplicandis radicibus cubicis. Vnde triplum productum erit p , quod si multiplicetur per A B, hoc est, per z , fiet pz , æquale triplo producto linearum A C, B C, A B. Et per consequens $z^3 + pz \propto q$, vel $z^3 \propto -pz + q$. Quod erat demonstrandum.

Sit jam secundo loco

$z \propto \sqrt{C. + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}} + \sqrt{C. + \frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}}$. & supponatur prima radix cubica (quæ binomium est) in figura præcedente æqualis lineæ A B; secunda autem (quæ residuum est) æqualis lineæ B C; eritque summa cuborum utriusque lineæ æqualis q . Porro supponendo lineam A C $\propto z$, auferendoque ex ejusdem cubo z^3 , triplum productum linearum A B, B C, & z , relinquentur cubi linearum A B & B C, qui quidem simul sumpti ipsi q sunt æquales. Est autem productum ex A B, B C, hoc est, quod fit ex binomio in residuum, $\sqrt{C. \cdot \frac{1}{27}p^3}$, seu $\frac{1}{3}p$. Nam cum multiplicando $+\sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}$ per $-\sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}$ (unâ radice existente signo $+$ adfectâ, alterâ verò signo $-$) producat utriusvis quadratum affectum signo $-$, nimirum $-\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3$, & utramque radicem per $+\frac{1}{2}q$ multiplicando, producta evanescant; restat tantum $+\frac{1}{2}q$ in se multiplicandum. Quare cum productum illud sit $+\frac{1}{4}qq$, & alterum productum invendum sit $-\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3$; erit totum productum $\sqrt{C. \cdot \frac{1}{27}p^3}$ seu

scu $\frac{1}{2}p$, sicut diximus, ac proinde ejus triplum p . Quod si rursus multiplicetur per z , producet pz , æquale triplo producto linearum AB , BC , AC : & per consequens $z^3 - pz \propto q$, hoc est, $z^3 \propto * + pz + q$. Quod erat demonstrandum.

Adduxi autem demonstrationem extractionis harum radicum, quod contemplatio earum atque inventio pulcherrimæ mihi sint visæ. Verùm quantum ad praxin, cùm Geometricè æquationum hoc loco propositarum radices sunt extrahendæ; ejus sanè methodus, quæ generalis atque facilis est, quàm optimè in hac Geometria demonstrata cernitur. Si verò Arithmeticè illas extrahere lubuerit, multò id faciliùs fiet juxta methodum à Vieta in tractatu de Numerosa Potestatum Resolutione traditam, quàm per hæcæ regulas Cardani.

F I N I S.



FRAN.

FRANCISCI & SCHOOTEN
IN
GEOMETRIAM
RENATI DES CARTES
COMMENTARIUM.

ARGVMENTVM PRIMI LIBRI.



*P*rimo libro Autor viam quodammodo aperit ad suam Methodum, quâ in resolvendis & construendis Geometria Problematis utitur, quamque tribus hisce libris est complexus. Quae est, ut certarum notarum sive characterum beneficio, quibus tum data tum quaesita lineae designantur, difficultates omnes, quae in iisdem Problematis enodanda veniunt, ad ejusmodi terminos reducantur, ut deinde ad illorum constructionem non nisi rectarum quarundam linearum longitudinem querere sit opus. Ad quas inveniendas, docet, operationes omnes, quae circa lineas hasce, ut cognita fiant, sunt instituenda, ad 4 vel 5 diversas, quemadmodum in Arithmetica, revocari posse: quae sunt, Additio, Subtractio, Multiplicatio, Divisio, & Radicum Extractio. Quâ quâ ratione Geometricè fiant, deinceps explicat. Vbi porro observandum venit, quod, postquam hi Arithmetices termini in Geometriam sunt introducti, ad operationes hasce in lineis aequè instituendas atque in numeris, consentaneum sit rectam lineam, quae unitatis vicem gerat, assumere, & ad eandem reliquas referre. Id quod communiter liberum est, cum quamlibet lineam pro ea accipere liceat.

Quibus explicatis, ostendit, quo pacto notis atque literis in Geometria sit utendum ad praedictas lineas breviter designandas, earumque operationes facile indicandas: ut hac ratione diversae earum relationes conspicuae sint, atque difficultas omnis, verborum involucris exuta, quam simplicissimè ob oculos poni possit. Et quia haec Methodus in resolvendis Geometria Problematis requirit, ut difficultates omnes, quae in illis evolvenda occurrunt, ad unum genus Problematum reducantur, nempe, ut queratur tantummodo valor quarundam linearum rectarum, quae aliquibus aequationis sint radices: idcirco docet, quo pacto Problema aliquod propositum perducatur ad aequationem, supponendo illud ipsum ut jam factum. Ac deinde, cum Aequatio certum sit medium quo Problema solvitur, refert totidem aequationes inveniendas esse, quot in eo supposita fuerint incognita linea. Cum autem haec Methodus nullis Problematum finibus coerceatur, ipsaque non tantum ad Problemata, in quibus de inveniendis quibusdam rectis lineis, aut etiam planis solidisve quaestio est (quae quidem facile ad tales terminos reduci queunt, ut non nisi recta

T

qua-

quadam linea inveniende sint) applicari possit; sed etiam ad Problema-
ta, in quibus certi anguli dantur, vel angulorum inter sese comparatio
facienda est; atque ad Problemata in quibus quadam puncta aut linea
data sunt, & alia puncta inveniri debent, se extendat (siquidem in his a
questis punctis ad data, aut datarum rectarum terminos, aut etiam in
datis angulis ad positione datas recte lineae duci possunt, qua quæstorum
punctorum loca determinant; in illis autem qua dictorum angulorum
vices gerant, sicut post exemplis planum fiet): facile constat, illam non
modo Veterum Analysin atque Recentiorum Algebram comprehendere;
sed etiam ad id omne, ubi de quantitatum aequalitate vel proportio-
ne inquiritur, adhiberi posse, atque adeò tam generalem esse, ut nul-
lum non sua artis per universam Mathesin specimen edat.

Iam verò postquam Problema aliquod ad æquationem est perdu-
ctum, ipsique æquatio ad simplicissimos terminos reducta, si quidem id
ipsum per Geometriam communem construere potest, hoc est, ut ad con-
structionem ejus non nisi rectis lineis atque circulis utamur, prout in su-
perficie aliqua plana describuntur, docet, qualis tunc debeat esse æqua-
tio, & qua ratione radix ejus tam inveniri quam exprimi possit. Atque
ita breviter, quidquid ad planorum Problematum constructionem
spectat, absolvit.

Ut autem tum præceptionum harum usus locus sit, tum verò ejusdem
Methodi facilitas in resolvendo ac construendo nobili aliquo Problema-
te eluceat, inquirendam sibi tandem proponit rationem componendi loci
ad tres, quatuor, vel plures lineas: ad quam, velut scientia culmen,
Veteres us pervenirent, summâ curâ elaborarunt.

Et hoc quidem primi Libri Argumentum asserere visum fuit. Cete-
rùm loca difficiliora, qua in eo illustranda esse duximus, fere sunt
sequentia.

COMMENTARI

I N

LIBRVM PRIMVM.



Tradicum extractio, quæ pro Divisionis quadam specie haberi potest.] A

Quandoquidem eadem fermè proportio utrique operationi convenit. Est enim in Divisione, ut quotiens ad unitatem, sic dividendus ad divisorem. In extractione vero radicis quadratæ, ut radix, ceu quotiens, ad unitatem; ita datus numerus, ceu dividendus, ad radicem, ceu divisorem. Adèd ut radicis extractio divisionis species sit censenda, in qua divisor quotienti est æqualis; vel etiam, in qua radix inter datum numerum & unitatem est media proportionalis.

Vel etiam si una sit, quæ vocetur unitas.] B Per unitatem intellige lineam quandam determinatam, quæ ad quamvis reliquarum linearum talem relationem habeat, qualem unitas ad certum aliquem numerum.

Vt èd commodiùs ad numeros referatur, quamque communiter pro libitu assumere licet.] C Sit enim, exempli gratiâ, datum aliquod rectangulum transmutandum in quadratum: si pro unitate sumatur latus unum, quod libuerit, & inter ipsum & reliquum inveniatur media proportionalis; erit ea latus quadrati, dato æqualis. Atque hæc ratione latus alterum vicem gerit alicujus numeri, è quo radix quadrata est extrahenda. Adèd ut manifestum sit, Problema propositum, nec non mediæ proportionalis inter duas datas lineas inventionem, nihil aliud esse, quàm si unâ lineâ assumptâ pro unitate, ex reliquâ lineâ tanquam numero extrahatur radix quadrata.

Vt ad ipsas inveniatur quarta, quæ sit ad alterutram, ut est altera ad unitatem, quod idem est atque multiplicatio.] D In multiplicatione enim est: ut productum ad multipli-

T 2

can-

candum, ita multiplicans ad unitatem. Vel permutando, ut productum ad multiplicantem, sic multiplicandus ad unitatem.

- E *Vel ut per ipsas inveniatur quarta, quæ sit ad unam ex illis duabus, ut unitas ad alteram, quod convenit cum Divisione.*] Est namque in Divisione, ut supra annotavimus, ut quotiens ad unitatem, sic dividendus ad divisorem. Ac proinde permutando, ut quotiens ad dividendum, sic unitas ad divisorem.

- F *Vt si radix cubica sit extrahenda ex $aabb - b$, cogitandum est, quantitatem $aabb$ semel divisam esse per unitatem, atque alteram quantitatem b his per eandem esse multiplicatam.*] Puta unitatem, quæ hic subintelligitur, esse c . Vnde si quantitas $aabb$, quæ unâ abundat dimensione, semel dividatur per c , fiet $\frac{aabb}{c}$; at verò altera quantitas b , quæ duabus deficit dimensionibus, ut æquales numero habeantur, bis multiplicetur per c , hoc est, per cc , fiet bcc ; aded ut tota quantitas sit $\frac{aabb}{c} - bcc$.

- G *Resoluturus igitur aliquod Problema, considerabit illud primâ fronte ut jam factum, nominaque imponet lineis omnibus, quæ ad constructionem ipsius necessaria videbuntur, tam iis quæ incognitæ sunt, quàm quæ cognitæ. Deinde, nullo inter lineas hasce cognitæ & incognitæ facto discrimine, evolvenda est Problematis difficultas, eo ordine, quo omnium naturalissimè patet, quâ ratione dictæ lineæ à se invicem dependent, donec inventa fuerit via eandem quantitatem duobus modis exprimendi, id quod Aequatio vocatur: æquales enim sunt termini modi unius, terminis modi alterius. Iam verò tot hujusmodi Equationes invenire oportebit, quot suppositæ fuerunt incognitæ lineæ.*] Quæ verba ut rectè percipiantur, unum atque alterum Problema proponamus.

PROBLEMA I^{um}

Datam rectam lineam AB , utcunque sectam in C , ita producere ad D , ut rectangulum sub AD , DB comprehensum, æquetur quadrato rectæ CD .




Considero rem velut jam factam, hoc est, suppono rectangulum $ADEF$ æquari quadrato $CDGH$, quod faciendum proponitur. Deinde, cum omnis quaestio Geometrica eo reduci possit, ut non nisi longitudo aliqujus vel aliquarum rectarum ex aliis rectis sit quaerenda, & nemo

non videat, ad ejus constructionem tantummodo quaerendam esse lineam BD , omnemque difficultatem in ea inveniendam esse sitam; nomina impono lineis tam datis AC , CB ; quam quaesitæ BD . Proinde, pro linea AC pono quantitatem cognitam a ; pro CB , b ; at pro BD quantitatem incognitam x , fietque AD $a+b+x$, CD autem $b+x$. Quibus peractis, ut ad Aequationem perveniamur, & habeam rectangulum $ADEF$, duco AD , hoc est, $a+b+x$ in DE seu DB , hoc est, x , quod proinde erit $ax+bx+xx$. Similiter ut inveniatur quadratum $CDGH$, multiplico CD , hoc est, $b+x$ in se, fietque $bb+2bx+xx$. Ita ut habeatur æquatio $ax+bx+xx \propto bb+2bx+xx$. Ad quam reducendam tollatur utrinque $bx+xx$, sic ut ex una parte remaneat ax , & ex altera $bb+bx$; tum translatò bx ad alteram partem sub contrario signo, erit æquatio $ax-bx \propto bb$. Cujus utràque parte divisâ per $a-b$, provenit $x \propto \frac{bb}{a-b}$. E quibus patet, lineam quaesitam BD inveniri per divisionem quadrati lineæ CB per excessum; quo linea AC superat ipsam CB , vel etiam per hunc excessum, tanquam primam, & lineam CB , tanquam secundam, inveniendò tertiam proportionalem BD .


PROBLEMA 2^{da}.

D Atà rectâ lineâ terminatâ AB, ex terminis ejus A & B duas rectas lineas inflectere AC, CB, continentes angulum ACB, æqualem dato D, ut quæ ab ipsis fiunt quadrata, habeant ad triangulum ACB rationem datam, ut 4 *d* ad *a*.



Factum sit quod quæritur, & ex puncto C demittatur super rectam AB perpendicularis CH. Quoniam igitur data sunt puncta A & B; & quidem ad trium punctorum situm determinandum nihil simplicius haberi potest, quàm si noscantur tres lineæ AH, HC, & HB: facillè constat, quæstionem propositam cò reduci, ut inveniendæ tantùm sint duæ lineæ AH, HC, seu BH, HC; atque adedò duas supponendas esse lineas incognitas. Quia verò, sectâ lineâ AB bifariam in E, datum est punctum E, atque ideo ipsa AE vel EB, quam voco *a*, atque operatio aliquantò brevior evadit, si loco dictarum AH, HC, seu BH, HC, quæramus duas lineas HE, HC: Idcirco pro HE pono quantitatem incognitam *x*, & pro HC quantitatem incognitam *y*. Unde pro AH invenitur *a* - *x*, & pro HB *a* + *x*. Jam inter lineas notas & ignotas nullo facto discrimine, directè percurrenda est Problematis difficultas, & videndum, quomodo una ex aliis sit deducenda, donec tandem ad Equationem deveniatur. Primò igitur quadratum ex AC erit *aa* - 2*ax* + *xx* + *yy*:
quo

quoniam componitur ex duobus quadratis linearum AH & HC . Eodem modo quadratum lineæ C erit $aa + 2ax + xx + yy$: quia æquale est binis quadratis ex BH & HC . Atque adeo summa quadratorum ex A , C , B erit $2aa + 2xx + 2yy$. Quæ cum eam rationem habeat ad triangulum ABC , quod est ay , (utpote æquale semissi ejus, quod producitur ex basi AB & perpendiculari CH ,) quam habet $4d$ ad a : erit productum ex $2aa + 2xx + 2yy$ in a æquale ei, quod provenit ex ay in $4d$, hoc est, habebitur Æquatio inter $2a^3 + 2axx + 2a yy$ & $4ady$. Sed quandoquidem duæ suppositæ sunt incognitæ lineæ x & y , alia adhuc superest Æquatio invenienda. Quam ut inveniamus, considerandus insuper est angulus D , cui æqualis supponitur angulus ACB ; qui si obtusus fuerit, produco lineam BC , donec ex puncto A in ipsam cadat perpendicularis AI , omnino ut factum est circa angulum D . Tum, quoniam datus est angulus D , dantur quoque rectæ DF & FG . Ac proinde si pro DF ponatur b , & pro FG , gerent ipsæ vicem dati anguli D , sicutque triangula ACI & GDF similia. Eadem ratione similia erunt triangula HCB & ABI . Unde erit ut CB ad AB , sic CH ad AI , & BH ad BI . Quare si pro quadrato ex CB $\propto aa + 2ax + xx + yy$ brevitas causâ scribatur ee , h. e., pro CB $\propto \sqrt{aa + 2ax + xx + yy}$ ponatur e ; fiatque ut e ad $2a$, sic CH seu y ad AI : erit $AI \propto \frac{2ay}{e}$. Similiter ut e ad $2a$, sic BH , seu $a + x$, ad BI : erit $BI \propto \frac{2aa + 2ax}{e}$. Tum subductâ BC seu e ex BI seu $\frac{2aa + 2ax}{e}$, relinquitur $CI \propto \frac{2aa + 2ax - ee}{e}$. Jam cum CI sit ad AI , hoc est, $\frac{2aa + 2ax - ee}{e}$ ad $\frac{2ay}{e}$, seu $2aa + 2ax - ee$ ad $2ay$, sicut DF ad FG , hoc est, b ad c : erit $2aac + 2acx - cee$, productum sub extremis, æquale $2aby$, ei, quod sit sub mediis. Quæ altera est Æquatio. Atque ad hæc facienda manuduxerunt nos præcepta jam tradita, ita ut nullæ partes Problematis sint omisissæ. Et quicumque omnia penitus inspexerit, se suo Marte propositæ questionis solutionem ex illis huc usque perducere potuisse judicabit. Difficultas enim tota jam à figuris ad numeros seu terminos Analyticos est traducta, ita ut, quæ supersunt, cuilibet obvia esse possint, etiam si de lineis, punctis, angulisque amplius:



non cogitet. Inventis ergo tot *Æquationibus*, quot suppositæ fuerunt incognitæ linæ; quoniam in utraque binæ reperiuntur quantitates incognitæ; hinc talis *reductio* fieri debet, ut ex una parte tantum habeatur xx , ut sequitur. Quocirca cum primum $2a^3 + 2axx + 2ayy$ æquetur $4ady$, dividatur utraque pars per $2a$, & fit æquatio inter $aa + xx + yy$ & $2dy$; & aa, yy in alteram partem translatis, inter xx & $2dy - yy - aa$. Deinde cum $2aac + 2acx - ccc$ æquetur $2aby$, restituto valore quantitatis assumptæ cc , ipsoque ducto in $-c$, prodibit æquatio $aac - cxx - cyy \propto 2aby$. In qua si fiat porro terminorum transpositio, ut cxx unam teneat *Æquationis* partem sub signo $+$ & reliqui partem alteram, atque utraque pars per c dividatur, proveniet *Æquatio* $xx \propto aa - yy - \frac{2ab}{c}y$, seu $xx \propto aa - yy - 2fy$, (scribendo nempe $2f$ pro $\frac{2ab}{c}$: quandoquidem liberum est quolibet nomine datas quantitates insignire).


Reductâ ergo utrâque *Æquatione* inventâ ad eandem quantitatem xx , adæquandæ sunt reliquæ quantitates inter se, ut inveniantur inde quantitas incognita y . Quare cum $2dy - yy - aa$ æquetur $aa - yy - 2fy$, additis utrinque yy & aa , erit $2dy \propto 2aa - 2fy$, seu, $dy \propto aa - fy$: & translato $2fy$ ad alteram partem, factâque utrobique divisione per $d + f$, fiet $y \propto \frac{a}{d+f}$. Inventâ autem quantitate y , non est difficile alteram quantitatem incognitam x invenire. Si enim in præcedenti æquatione $xx \propto 2dy - yy - aa$, pro

cumferentiæ in C, ac jungantur AC, CB. Factumque erit, quod requirebatur.

- GG *Velfitotidem non inveniuntur, nec tamen quidquam eorum, quæ in quæstione desiderantur, omittatur, argumentum est, illam non penitus esse determinatam. Tunc enim ad arbitrium assumi possunt lineæ cognitæ pro incognitis, quibus non respondet aliqua Aequatio.* Quò cuivis hæc obvia sint, placuit ea per unum aut alterum Problema facile illustrare.

I P R O B L E M A.

DAtis positione duabus rectis lineis concurrentibus AB, AC, punctum invenire intra ipsas D, à quo si ducantur duæ rectæ DC, DB ipsis AB, AC parallelæ, ut summa ipsarum DC, DB sit datæ rectæ a æqualis.



Ponatur factum quod quæritur, hoc est, suppositis rectis DC, DB ipsis AB, AC parallelis, statuatur & DC, DB simul sumptæ ipsi datæ a esse æquales. Hinc cum ad determinandum punctum D quærenda sit longitudo utriusque rectæ AC, CD seu utriusque AB, BD, pono pro una AC vel BD quantitatem incognitam x , & pro altera CD vel AB quan-


titatem incognitam y . Quibus ita positis, ut habeatur Aequatio, addendæ erunt tantum duæ rectæ BD, DC, hoc est, x & y : eritque summa $x + y$ æqualis a , hoc est, erit $y = a - x$. Quoniam autem ad alteram Aequationem pro x invenendam nulla superest materia, cum conditiones in quæstione præstandæ jam omnes sint impletæ: argumentum est, illam non penitus esse determinatam. Quocirca cum in ipsâ una desit conditio, ut prorsus determinata existat, poterimus ad arbitrium pro quantitate incognita x , cui nulla respondet Aequatio, assumere lineam aliquam cognitam ipsâ a minorem, atque tot inde invenire puncta D, quot ipsæ diver-

diversos tribuerimus valores. Vbi notandum, quòd, postquam assumptæ fuerint rectæ AE , AF ipsi datæ æquales, ac jungatur EF , puncta hæc omnia in rectam cadant lineam EF , adeoque punctum quodlibet in ea pro libitu sumptum quæsito satisfacere: cum, propter similia triangula AEF , & CDF , rectæ CD , CF (puncto D ubicunque in EF assumpto) haud aliter atque AE , AF semper sint æquales, ac proinde BD , DC simul eadem quæ AC , CF simul, hoc est, eadem quæ AF vel a .

Haud dissimilis erit quæstio, si punctum D inveniendum sit, ita ut ipsarum DC , DB differentia sit datæ rectæ æqualis.

III PROBLEMA.

IN circulo $ABCF$ erectâ super diametrum BF perpendiculari GD , circumferentiam hinc inde secante in C & A , & à B eadem ductis BC , BD , quarum hæc circumferentiam secet in E , dantur $BE \propto a$, & $BC \propto b$: oporteatque invenire $ED \propto x$.



Quoniam ad quæstionem hanc solvendam, supponendo eam, ut jam factam, necessariæ videntur lineæ BG ac diameter BF : hinc pro BG pono y , & pro BF pono z : eritque $GF \propto z - y$. Deinde ut perveniatur ad Æquationem, considero lineam GD ipsi BF esse perpendicularem, hoc est, triangulum BGC esse rectangulum. Unde fit, ut, si quadratum ex $BG \propto yy$ auferam è quadrato ex $BC \propto bb$, reliquum $bb - yy$ sit æquale quadrato ex GC . Quod idem & alio modo inveniri potest, considerando

perpendicularē GD secare hinc inde circumferentiam in C & A . Quia enim hinc per 35 Tertiū Elementorū rectangulum sub BG , GF est æquale rectangulo sub AG , GC , hoc est, quadrato ex GC : sicut si multiplicavero $GF \propto z - y$ per $BG \propto y$ productum $zy - yy$ sit denuo quadrato ex GC æquale. Habebitur ergo Æquatio inter $bb - yy$ & $zy - yy$, hoc est, addendo utrobique yy , inter bb & zy . Porro cum in hac quæstione tres suppositæ sint incognitæ lineæ x , y , & z , superest ut duas adhuc alias Æquationes inveniamus. Hinc, ductâ FE , quoniam, considerando lineam BD secare circumferentiam in E , similia sunt trianguia BGD & BEF , erit BG ad BD , hoc est, y ad $a + x$; ita BE ad BF , hoc est, a ad z . Ac proinde, cum productum sub extremis sit æquale producto sub mediis, erit $zy \propto aa + ax$. Quæ altera est Æquatio. In qua si in locum zy subrogetur ejus valor ante inventus bb , habebitur $bb \propto aa + ax$, hoc est, transferendo aa in alteram partem, atque deinde utrobique dividendo per a , erit $x \propto \frac{bb - aa}{a}$. Quæ quantitas est lineæ ED , quam investigare intendebamus. Cæterum, quia inventâ hâc lineâ $ED \propto x$, utraque reliquarum incognitarum BG & BF , per y & z designatarum, quæ ad eam inveniendam necessariæ videbantur, ad arbitrium sumi potest, cum in Problemate nulla ampliùs materia supersit, quâ perveniat ad Æquationes, quibus utraque ipsarum determinari queat, atque idcirco difficultas omnis Problematis jam sit evoluta: indicio est, rectam ED eandem semper inveniri, etiam si ad illam quærendam pro utraque linearum BG , BF diversa magnitudo accipiat, hoc est, alius atque alius circulus adhibeatur: quandoquidem Problema, si de linearum BG , BF longitudine ex datis BE , BC investigandâ quæritur, haud determinatum existit, sed tantum ipsius ED .

Qui plura in loci hujus illustrationem exempla desideret, videat quæ ad litteram G secundi libri à nobis sunt allata.

GGG *Postea verò si plures adhuc supersint, ordine quoque utendum erit unaquâque Æquationum reliquarum, sive illam considerando separatim, sive ipsam comparando cum aliis, ad explicandam unamquamque ex incognitis lineis.*] Sic, quoniam, reducto Problemate aliquo, in quo ad ipsum construendum tres supponen-

dx

de sunt incognitæ lineæ x , y , & z , ad duas Aequationes
 $xx \infty + 2cx + bb$, & $yy \infty aa + 2zx - xx$, pro incognita lineæ z ,
 $+ 2z - cc$

$$\begin{array}{r} -yy \\ -2cz \end{array}$$

cui nulla respondet Aequatio, ad arbitrium sumi potest linea co-
 gnita d : potero in locum duarum præcedentium Aequationum
 scribere $xx \infty + 2cx + bb$, & $yy \infty aa + 2dx - xx$. Hinc cum

$$\begin{array}{r} + 2d - cc \\ -yy \\ -2cd \end{array}$$

duæ supersint lineæ inveniendæ x & y , ordine quoque utenda
 erit unaquæque Aequationum reliquarum $xx \infty + 2cx + bb$, &

$$\begin{array}{r} + 2d - cc \\ -yy \\ -2cd \end{array}$$

$yy \infty aa + 2dx - xx$, siue eas considerando separatim, siue unam
 cum altera comparando, ad explicandam unamquamque ex in-
 cognitis lineis. Quocirca considerando separatim Aequationem
 $yy \infty aa + 2dx - xx$, cum, quantitativus $+aa$ & $-xx$ ad alte-
 ram partem sub contrario signo translatis, fiat $2dx \infty yy + xx$
 $-aa$: hinc si in altera Aequatione $xx \infty + 2cx + bb$ pro $2dx$

$$\begin{array}{r} + 2d - cc \\ -yy \\ -2cd \end{array}$$

substituatur $yy + xx - aa$, habebit Aequationem $xx \infty + 2cx$,
 $+ yy + xx - aa + bb - cc - yy - 2cd$. Hoc est, demptis æ-
 qualibus, ordinatæque æqualitate, habebitur $2cx \infty aa + cc$
 $- bb + 2cd$. Et fit, divisâ utrâque æqualitatis parte per $2c$,
 $x \infty \frac{aa + cc - bb + 2cd}{2c}$. Ostendens quâ ratione linea incognita

x ex cognitis a, b, c , & ex ad arbitrium sumendâ d sit inveniendâ.
 Inventâ autem lineâ x , ut habeatur y , oportet tantum in Aequa-
 tione superiori $yy \infty aa + 2dx - xx$ in locum x subrogare valo-
 rem inventum $\frac{aa + cc - bb + 2cd}{2c}$, & in locum xx huius valorem,

& fit $yy \infty \frac{2aabb + 2aacc + 2bbcc - a^4 - b^4 - c^4 + 4ccdd}{4cc}$. Vn-
 de,

de, extractâ radice, invenitur

$$y \propto \sqrt{\frac{2aabb + 2aace + 2bbcc - a^2 - b^2 - c^2 + 4ccdd}{4cc}}. \text{ Exhi-}$$

bens quo pacto linea incognita y ex cognitis a, b, c , & ex ad arbitrium sumenda d , obtineri possit.

Ceterum quoniam in Problemate, ad præcedentes Æquationes reducto, propter lineam d , quæ hic inodò major modò minor ad arbitrium sumi potest, lineæ quoque x & y inde majores ac minores evadunt, atque ob id Problema non determinatum existit, sed infinitas recipit solutiones: lubet & alterum Problema, quod omnino determinatum est, atque in cujus solutione, ad unumquemque ex quæsitis numeris investigandum, unam Æquationem cum aliâ comparavimus, in medium asserre.

PROBLEMA.

Invenire duos numeros, quorum summa multiplicata per summam suorum quadratorum faciat 715; & differentia per differentiam eorundem quadratorum faciat 99.

Supposito Problemate tanquam jam facto, pono pro majori numero quæsito $x + y$, & pro minori $x - y$: eritque summa quæsitorum numerorum $\propto 2x$, & eorundem differentia $\propto 2y$.

Jam quia $x + y$ & $x - y$ in se ducti faciunt $xx + 2xy + yy$ & $xx - 2xy + yy$, quorum summa est $2xx + 2yy$ & differentia $4xy$: restat ut $2xx + 2yy$ multiplicata per $2x$, & $4xy$ per $2y$, producta $4x^3 + 4xyy$ & $8xyy$ sint datis numeris 715 & 99 æqualia.

Quocirca inventis duabus Æquationibus $4x^3 + 4xyy \propto 715$ & $8xyy \propto 99$, ut ex iis obtineatur uterque numerus incognitus x & y , comparo unam Æquationem cum altera: multiplicando primum utramque partem prioris per 2, & fit $8x^3 + 8xyy \propto 1430$, ac deinde ex ea subtrahendo posteriorem $8xyy \propto 99$, & relinquitur $8x^3 \propto 1331$. In quâ, si utrobique extrahatur radix Cubica, habebitur $2x \propto 11$, & fit $x \propto 5\frac{1}{2}$.

Postea ad inveniendum y dividatur Æquatio posterior $8xyy \propto 99$ per jam inventam $2x \propto 11$, & orietur Æquatio $4yy \propto 9$.

In

In qua si utrinque extrahatur radix quadrata, habebitur $2y \propto 3$, & fit $y \propto 1\frac{1}{2}$.

Cæterum invento utroque numero incognito x & y , quoniam H pro majori quæstorum posueramus $x + y$ & pro minori $x - y$: erit major $\propto 7$, & minor $\propto 4$. Et solutum erit Problema.

Atque ita reducendo illas, efficere oportet, ut tantum una remaneat, equalis alteri cognitæ, aut cujus quadratum, sive cubus, sive quadrato-quadratum, sive surdesolidum, sive quadrato-cubus &c. equalis sit ei, quod provenit ex additione vel subtractione duarum pluriumve aliarum quantitatum, quarum una quidem cognita sit, reliquæ autem compositæ ex quibusdam mediis proportionalibus inter unitatem & dictum quadratum, sive cubum, sive quadrato-quadratum, &c. multiplicatis per alias cognitæ. Quod hoc pacto designo

$$z \propto b, \text{ aut}$$

$$zz \propto -az + bb, \text{ aut}$$

$$z^3 \propto +azz + bbz - c^3, \text{ aut}$$

$$z^4 \propto +az^3 + bbzz - c^3z + d^4, \text{ &c.]}$$

Hoc est, z , quam pro quantitate incognita sumo, est æqualis quantitati cognitæ b . Aut quadratum lineæ z est æquale ei, quod provenit subtrahendo az ex bb : quarum quidem bb cognita est; sed az composita ex z media proportionali inter unitatem & quadratum zz , ut supra explicavimus, & ex quantitate cognita a . Aut cubus lineæ z æqualis est ei, quod provenit ex additione & subtractione trium quantitatum azz , bbz , & c^3 ; quarum quidem c^3 cognita est; at bbz composita ex z , prima duarum mediarum proportionalium inter unitatem & cubum z^3 , & ex quantitate cognita bb ; ac denique azz , composita ex z , secunda duarum mediarum, & ex quantitate cognita a . Atque sic de cæteris.

Vbi notandum est, per quantitates cognitæ, intelligendas esse eas, quæ in quæstione vel datæ sunt, vel per certas operationes datarum quantitatum, jam traditæ & notæ, sic præparatæ sunt, ut pro cognitæ sive datæ sint habendæ, atque quæsitæ sive incognitæ æquiparandæ.

Sic cum ponitur $z \propto b$, indicatur lineam incognitam, quæ per

per z designatur, æqualem esse alicui ex cognitis, quæ designatur per b . Quod quidem rarò contingit, cum incognitæ linear ple-
runque aliqua operatione seu præparatione cognitarum linearum
indigeant, antequam cognitis evadant æquales.

Vt, si fuerit $z \propto \frac{e^d}{e}$. Assumptâ pro unitate alterutrâ quantita-
tum e, d , quæ in se invicem ductæ numeratorem constituunt, divi-
denda est reliqua per denominatorem, sive quantitatem e (quem-
admodum superius est ostensum); eritque quotiens divisionis æ-
qualis quantitati incognitæ z .

Eodem modo si habeatur $z \propto \frac{ee+ed}{e-f}$, erit ut $e-f$ ad $e+d$,
ita e ad z ; sive ut $e-f$ ad e , ita $e+d$ ad z .

Et si sit $z \propto \frac{ee-dd}{e+f}$, erit $e+f$ ad $e+d$, sicut $e-dd$ ad z ; vel
 $e+f$ ad $e-d$, sicut $e+d$ ad z .

Nec non si habeatur $z \propto \frac{e^d+ef}{g}$, & fiat, ut e ad e , sic f ad quar-
tam, quæ vocetur h : poterit pro ef scribi eh , atque ad eò loco
 $\frac{e^d+ef}{g}$ substitui $\frac{e^d+eh}{g}$. Vbi deinde si fiat ut g ad e , sic $d+h$ ad
quartam: sive permutando (quod eodem recidit) ut g ad $d+h$,
sic e ad quartam, quam vocare lubet b : erit $z \propto b$. Id quod &
aliis modis præstari potest.

Non secus si sit $z \propto \frac{edef}{ade-agb}$, & statuatur esse ut a ad e , sic
 e ad quartam, quæ sit i ; erit $ai \propto ee$, ita ut pro $\frac{edef}{ade-agb}$ scribi
possit $\frac{adif}{ade-agb}$ seu $\frac{dif}{de-gh}$. Rursus si ponamus esse ut d ad g ,
sic h ad quartam, quæ sit k : erit $dk \propto gh$, ita ut in locum
 $\frac{dif}{de-gh}$ subrogari possit $\frac{dif}{de-dk}$ seu $\frac{if}{e-k}$. Vbi denuo si fiat, ut
 $e-k$ ad i , ita f ad quartam, quam vocabo b ; fiet ut supra $z \propto b$.
Quod idem variis modis fieri potest.

Denique sit $z \propto \frac{acdd-aacc}{d^2+acd}$. Supponendo esse ut a ad d , ita
 d ad quartam, quæ nominetur e : erit $ae \propto dd$: poteritque pro
 $\frac{acdd-aacc}{d^2+acd}$ substitui $\frac{aace-aacc}{aed+acd}$ seu $\frac{acc-acc}{ed+cd}$. Rursus statuen-
do esse ut $e+e$ ad $e-e$, sic e ad quartam quæ appelletur f ,
fiet

fit $\frac{ce - ce}{e + e} \propto f$: licebitque pro $\frac{ace - ace}{ed + cd}$ reponere $\frac{af}{d}$. Vbi de-
 mum si fiat ut d ad f , ita a ad quartam, quæ vocetur b , fiet rursus,
 ut supra, $z \propto b$. Quod similiter pluribus modis expedire licet.
 Atque ita de cæteris.

E quibus constat, quantitatem incognitam z , post hujusmodi
 operationes atque cognitarum linearum requisitas præparationes,
 cõ reduci posse, ut sub una semper specie efferatur, & alteri co-
 gnitæ dicatur æqualis.

Notandum autem, huc quoque referendas esse æquationes in
 quibus quantitatis incognitæ quadratum, aut cubus, aut quadrato-
 quadratum, &c. æquatur quantitati alicui cognitæ, absque
 additione vel subtractione aliarum quantitatum, quæ componun-
 tur ex quibusdam mediis proportionalibus inter unitatem & di-
 ctum quadratum, aut cubum, aut quadrato-quadratum &c. mul-
 tiplicatis per alias cognitæ. Ubi incognita quantitas, extrahen-
 do tantum aliquam radicem, inveniri potest. Ut cum z æqua-
 tur aq . Suppositâ lineâ a pro unitate, erit radix quadrata extra-
 ctâ ex lineâ q , ut superius est ostensum, (nimirum inveniendõ
 inter lineas a & q mediam proportionalem,) æqualis quæ sitæ li-
 nę z , quæ hoc modo denotatur: $z \propto \sqrt{aq}$. Vbi apparet,
 quæstionem per hanc extractionem, dum planum aq transmuta-
 tur in quadratum bb , cujus latus est b , cõ esse reductam, ut inco-
 gnita quantitas alteri cognitæ dicatur æqualis.

Eodem modo si z^3 æquetur aaq , & quærat z . Assumptâ
 rursus a pro unitate, erit extractâ ex q radix cubica, hoc est, in-
 ventarum inter a primam & q quartam duarum mediarum pro-
 portionalium. (ut tertio libro ostenditur) prior, radici quæ sitæ
 z æqualis. Designabitur autem hoc pacto: $z \propto \sqrt[3]{Caaq}$. Vbi
 similiter constat, quod, dum hâc operatione solidum aliquod,
 utpote aaq , resolvitur in cubum b^3 , & utrobique deinde extra-
 hitur radix cubica, z rursus fiat ipsi b æqualis.

Nec aliter evenit cum $z^4 \propto aaqg$. Etenim dum extrahitur
 utrinque radix quadrato-quadrata seu bi-quadrata, hoc est,
 postquam radix semel extractâ, dat $z \propto ag$, eadem adhuc semel
 repetita radices extractio, dabit $z \propto \sqrt{ag}$, sive, supponendo ag
 in quadratum bb esse conversum, $z \propto b$. Atque ita ulterius in in-
 finitum.

Porro advertendum est, si quantitates cognitæ, ex quibus radix aliqua extrahi debet, sub alia specie, quàm hîc expositum fuit, oblatæ fuerint (ut si ex $aa + bb$, aut ex $\frac{aadd - aaff - aa}{dd + 2df + ff}$ &c. extrahenda sit radix quadrata): quòd tunc facile sit, non solum per ea, quæ jam tradita sunt, sed & aliis modis quantitates datas in alias transmutare: ita ut non aliter ex illis radices extrahendæ sint, ac si ex quantitate ag extrahendæ forent. Quod & de radice cubica, quadrato-quadrata, aliisque in infinitum, est intelligendum.

Atque ideo sufficiet vos monere, si quis in reducendis hisce æquationibus non omiserit uti divisionibus omnibus, quæ fieri possunt, &c.] Vbi notandum, inter quatuor operationum species, Additionem & Subtractionem non reddere terminos alicujus quæstionis difficiliore, quippe quos tantum signis + vel — conjungunt aut disjungunt; quæ quidem signa diversa genera non constituunt. Multiplicationem verò quod attinet, ea est, quæ termini involvuntur vel intrlicantur, & dimensiones augentur; quæ contra Divisione extricantur & minuuntur. Idem de radicum extractione intellige, quæ, ut supra dictum fuit, divisionis tantum species est habenda. Aded ut ad inveniendos terminos simplicissimos, ad quos quæstio aliqua reduci queat, maximopere observandum sit, ut in reducendis æquationibus, omnes divisiones atque extractiones, quæ fieri possunt, tentemus. Cujus rei exemplum non inelegans suggerere potest demonstratio proprietatis Parabolæ tertio libro adducta.

Erit tota OM æqualis z , lineæ quæsita. Quæ quidem sic exprimitur: $z \propto \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$.] Sciendum hîc est, æquationem propositam $z \propto az + bb$, juxta ea, quæ habentur lib. III. pag. 69, aliam adhuc habere radicem, minorem quàm nihil, quæ à D. des Cartes falsa appellatur, quæque hîc per lineam PM designatur, atque hoc modo exprimitur $z \propto \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. Quemadmodum facillè demonstrari potest. Si enim, posita $z \propto \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$ auferatur utrinque $\frac{1}{2}a$, & inde utraque pars $z - \frac{1}{2}a$, & $-\sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$ in se ducatur quadratè, fiet $z - \frac{1}{2}a \propto -\sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. Vbi si demum utrinque dematur $\frac{1}{4}aa$, & $-az$ in alteram partem transferatur, fiet $z \propto az + bb$.

Erit

Eritque reliqua PM equalis y, radici quesita: Ita ut fiat $y \propto -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$.] Verum æquatio $y \propto -ay + bb$ admittit adhuc aliam radicem, minorem quàm nihil, quæ per lineam OM designata ita exprimitur, $y \propto -\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. Cujus demonstratio ad exemplar præcedentis fieri potest.

Nec aliter fit, si proponatur $x^4 \propto -axx + bb$, PM enim esset xx , & haberetur $x \propto \sqrt{-\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}}$.] Quoniam enim $x^4 \propto -axx + bb$, transferendo $-axx$ in alteram æquationis partem, erit $x^4 + axx \propto bb$. & additâ utrique parti $+\frac{1}{4}aa$, proveniet $x^4 + axx + \frac{1}{4}aa \propto \frac{1}{4}aa + bb$. Iam verò extractâ utrobique radice, inveniatur $xx + \frac{1}{2}a \propto \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. ac proinde transponendo $+\frac{1}{2}a$, ut xx unam constituat æquationis partem, erit $xx \propto -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. Vnde extractâ rursum utrinque radice, fiet $x \propto \sqrt{-\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}}$.

Eodem modo si habeatur $z^4 \propto az^2 + bb$, erit

$z \propto \sqrt{\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}}$. Nam cum $z^4 \propto az^2 + bb$, erit per transpositionem $z^4 - az^2 \propto bb$. Addatur jam utrinque $\frac{1}{4}aa$, fietque $z^4 - az^2 + \frac{1}{4}aa \propto \frac{1}{4}aa + bb$. Vnde, extractâ utrobique radice, prodibit $z^2 - \frac{1}{2}a \propto \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. hoc est, $z^2 \propto \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, & per consequens

$$z \propto \sqrt{\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}}.$$

Similiter si sit $z^4 \propto az^2 - bb$, erit $z \propto \sqrt{\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}}$, nec non $z \propto \sqrt{\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}}$. Cum enim $z^4 \propto az^2 - bb$, & per transpositionem $z^4 - az^2 \propto -bb$; addatur utrinque $\frac{1}{4}aa$, fietque $z^4 - az^2 + \frac{1}{4}aa \propto \frac{1}{4}aa - bb$. Quare extractâ utrobique radice, emerget $z^2 - \frac{1}{2}a \propto \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$, hoc est, $z^2 \propto \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$, ac per consequens

$z \propto \sqrt{\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}}$. Porro, quoniam radix ex $z^4 - az^2 + \frac{1}{4}aa$ est quoque $\frac{1}{2}a - z^2$, hinc & $\frac{1}{2}a - z^2 \propto \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$, hoc est, $z^2 \propto \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$, ac per consequens

$$z \propto \sqrt{\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}}.$$

Caterum ut Geometricè inveniantur harum æquationum radices, sciendum est, quòd, dum omnes termini non æquè multas habent dimensiones, toties illic, ubi numero pauciores habentur, subintelligenda sit unitas, quoties requiritur; ut in æquatione $x^4 \propto -axx + bb$. Quia in termino axx tres duntaxat dimensiones reperiuntur, & in termino bb tantum: dux, cogitandum est, terminum axx , ut dimensiones fiant æquales, semel per unitatem esse multiplicatum; terminum autem bb bis. Adco ut, si pro unitate accipiamus c , æquatio sit $x^4 \propto -caxx + cbb$. Verùm expedit unitatem illam tantisper dissimulare, & æquationem hanc $xx \propto -ax + bb$ usurpare, donec radicem ejus Geometricè, ut traditum est, invenerimus, nimirum lineam P'M, quæ exprimitur hoc pacto: $x \propto -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. Ita ut deinde tantum opus sit ex $-\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$ extrahere radicem quadratam seu inter inventam lineam P'M & unitatem c invenire mediam proportionalem, ut Geometricè obtineatur radix $x \propto \sqrt{-\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}}$. Atque ita in aliis.

Vnde liquidò constat, ad inveniendas harum æquationum radices, nihil aliud requiri, quàm quod circa priores tres Æquationum formulas, & radicis quadratæ extractionem Auctor præcepit. Aded ut hinc simul manifestum sit, quo pacto, postquam sic linea aliqua pro unitate assumpta vel concepta fuerit, (quemadmodum hujus Geometriæ methodus requirit) Problemata omnia Geometriæ communis, hoc est, quæ rectarum linearum & circulorum beneficio construi possunt, per ea tantum, quæ ab Authore per 4 figuras 1^m libri exposita sunt, expediri queant, quemadmodum pag. 7 monuit.

- N *Quod si circulus, centrum suum habens in puncto N, transiensque per punctum L, non secet nec tangat lineam rectam MQR, nullam itidem Æquatio radicem admittet, ita ut inde asserere liceat, constructionem Problematis propositi esse impossibilem.*] Quod itidem ex Æquatione cognosci potest. Nam cum Æquatio sit certum medium, quo Problema aliquod resolvitur, sanè, si resolvendo incidimus in æquationem impossibilem, argumentum est, Problema quoque esse impossibile. Arguitur autem impossibilitas illa ex contradictione, quam.

quam involvit, cùm nempe in ea statuitur minor quantitas æquari alicui majori, vel cùm jubemur ad eam resolvendam aliquid præstare, quod fieri nullo modo potest, ut, quantitatem aliquam majorem à minore subducere. Quemadmodum in æquatione $z z \infty a z - b b$. quoniam ad inveniendam radicem z , $b b$ ex $\frac{1}{2} a a$ subtrahi debet; oportet ut $b b$ non sit majus quàm $\frac{1}{2} a a$, sive ut b non sit majus quàm $\frac{1}{2} a$. Aliàs enim radix ejus sic explicari non posset, & æquatio impossibilis foret. Quod & ex ejusdem constitutione licet agnoscere, si in ea duæ sint radices veræ. Si enim ponamus $z \infty c$, seu $z - c \infty 0$, itemque $z \infty d$, seu $z - d \infty 0$, atque deinde multiplicemus $z - c \infty 0$ per $z - d \infty 0$, exsurgit æquatio

$z z - \frac{c}{d} z + c d \infty 0$, seu $z z \infty \frac{c}{d} z - c d$. In qua si $+c + d$ interpretemur per $+a$, & $-c d$ per $-b b$, habebimus æquationem propositam $z z \infty a z - b b$. Adeò ut constet æquationem hanc duas veras radices admittere, seu quæ majores sunt quàm 0, quarum quidem summa est a , & productum ex earum multiplicatione $b b$.

Sed ut duas semper veras radices recipiat, requiritur, ut $b b$ non sit majus quàm $\frac{1}{2} a a$, seu, b non majus quàm $\frac{1}{2} a$: quoniam maximum productum quod fit ex partibus ipsius a , est, cùm a in duas partes æquales dividitur. Vbi notandum, quòd ubi $b b \infty \frac{1}{2} a a$, $\frac{1}{2} a$ esse z , quæ queritur, atque æquationem eo casu unam tantum sortiri radicem, aut duas quidem, sed æquales. At verò $b b$ existente majore quàm $\frac{1}{2} a a$, æquationem esse impossibilem, nec ullam admittere radicem. Id quod similiter de æquatione $z z \infty -a z - b b$ est intelligendum, quæ de duabus falsis radicibus est explicabilis. Ut patet ex ejus constitutione. Etenim ponendo $z \infty -c$ seu $z + c \infty 0$, nec non $z \infty -d$ seu $z + d \infty 0$, & multiplicando $z + c \infty 0$ per $z + d \infty 0$: proveniet Æquatio

$$z z + \frac{c}{d} z + c d \infty 0, \text{ seu } z z \infty -\frac{c}{d} z - c d.$$

In qua si interpretemur $-c - d$ per $-a$, & $-c d$ per $-b b$, emerget æquatio proposita $z z \infty -a z - b b$. Cujus porrò radices Geometricè inveniuntur perinde atque Æquationis præcedentis quæ denique sic exprimuntur $z \infty -\frac{1}{2} a + \sqrt{\frac{1}{4} a a - b b}$, & $z \infty -\frac{1}{2} a - \sqrt{\frac{1}{4} a a - b b}$.

Cæterum quod ad duas reliquas æquationes attinet, primam

videlicet $xx \infty az + bb$, & secundam $yy \infty -ay + bb$, ex
nulli determinationi sunt obnoxiz, & semper per duas radices
explicari possunt, unam veram & alteram falsam. Vt si ponat-
ur $z \infty c$, seu $z - c \infty 0$, & $z \infty -d$, seu $z + d \infty 0$, & multi-
plicetur $z - c \infty 0$ per $z + d \infty 0$; fiet $z^2 - c^2 + dz - cd \infty 0$, seu
 $z^2 \infty -\frac{c}{d}z + cd$. In qua æquatione si statuamus c majorem esse
quàm d , ita ut excessus sit penes c cum signo $+$, atque $+c - d$
interpretemur per $+a$, & $+cd$ per $+bb$, habebimus eandem
æquationem, quam prius, nimirum $z^2 \infty az + bb$. Aded ut per-
spicuum sit ipsam de duabus inæqualibus radicibus esse explica-
bilem, majore vera & minore falsa. At verò si ponamus c mino-
rem quàm d , ita ut excessus sit penes d cum signo $-$, atque
 $+c - d$ interpretemur per $-a$, & $+cd$ per $+bb$; prodibit
æquatio secundæ formæ: nimirum, $z^2 \infty -az + bb$, quippe
quæ à duabus inæqualibus radicibus explicatur, quarum minor
est vera, major autem falsa. Denique si d constituatur ipsi c æqua-
lis, destruent se invicem $+c$ & $-d$, & evanescet secundus ter-
minus az , & erit Æquatio $z^2 \infty +bb$, cujus duæ radices, ve-
ra $+b$ & falsa $-b$, sunt æquales.

E quibus omnibus apparet, ad æquationes allatas Geometricè
resolvendas, earumque radices juxta regulas hîc traditas commo-
dè explicandas, requiri, ut ultimus terminus designetur per bb , æt
ad eam formam, sicut superius est ostensum, reducatur.

A R G V M E N T V M

S E C V N D I L I B R I



Secundus liber agit de lineis curvis, earumque naturam explicat, docendo, quanam illa sint, quas in Geometriam recipere oportet, quaque Geometrica appellandae sunt, nemque quo pacto possint cognosci. Modus autem eas cognoscendi in eo consistit, quod describi possint per motum aliquem continuum, vel per plures ejusmodi motus, quorum posteriores regantur a prioribus. Verum enim verò licet allato modo descriptae curvae omnes in Geometriam sint recipiendae, atque pro Geometricis agnoscendae; tamen ad comprehendendas omnes, quae sunt in natura, & ipsas ordine distinguendas in certa genera, prout gradatim magis magisque in infinitum sunt compositae, aptius quidquam asserri nequit, quam ut in genere dicatur illas omnes Geometricas esse appellandas, quarum omnia puncta ad omnia lineae rectae puncta certam habent relationem, quae exprimi potest per aliquam aequationem, se indifferenter ad omnia utriusque lineae puncta extendentem. Et quidem, quod, cum aequatio illa ultra rectangulum sub duobus quantitatibus indeterminatis, (qua ad distans relationem explicandam requiruntur) aut ultra quadratum unius ex ipsis non ascendit, lineae curva tunc primi & simplicissimi sit generis (in quo tantum Circulus, Parabola, Hyperbola, & Ellipsis sunt comprehensae.) At verò cum ipsa ad tres quatuorve dimensiones ascendit, quod illa tunc sit secundi generis. Cum verò ad 5 aut 6 dimensiones ascendit, quod illa tunc sit tertii generis. Atque ita porro in infinitum.

Vbi porro facile est intelligere, quanam sint, quae ex Geometria sint rejiciendae, & inter Mechanicas ponendae: Quandoquidem curvae illae omnes, quae inter praedictas non comprehenduntur, ab hac Geometria rejiciuntur. Cujusmodi sunt illae omnes, quae per motus continuos describi nequeunt, & ubi posteriores a prioribus non dependent, sed per duos motus describi concipiuntur, qui sunt à se invicem distincti, nullamque relationem habentes, quae possit exakte mensurari, sive quarum omnia puncta ad omnia lineae rectae puncta relationem non habent, quae per aliquam aequationem omnibus communem exprimi possit.

Postquam autem ostendimus, quo pacto lineae curvae ab Auctore distinguantur, tam in illas, quas in Geometriam censet introducendas, quam in illas, quas pariter ab ea censet arcendas: ac denique quare ratio-

ne illa in certa genera sint distinguenda; opera pretium videtur ut deinceps ea, quæ Antiqui circa ipsas contemplati fuere, expendamus. Quæ quidem ex iis, quæ afferuntur à Pappo ad propositionem 4^{am} libri tertii, ut & ad prop^{am} 30 libri quarti Collectionum Mathematicarum, haud difficulter colligi possunt. Vbi, postquam explicavit, Problematum Geometricorum tria ab Antiquis genera fuisse constituta, quorum alia dicuntur Plana, alia Solida, alia denique Linearia; nimirum prout quedam ex ipsis solvi possunt, describendo tantum rectas lineas & circulorum circumferentias; & alia, quæ construi nequeunt, quin ad minimum adhibeatur aliqua Conica sectio; & reliqua denique quin in constructionem assumatur alia demum curva linea: Tandem de duarum mediarum inventionem loquitur, quas inquit Geometricæ rationi innixos invenire non potuisse. Quorum quidam, asserentes, Problema solidum esse, resolutionem per Conicas sectiones, sive solidos locos, fecerunt; alii autem per alias curvas, sive locos lineares; ac alii denique constructionem ejus instrumentis tantum perfecerunt. Nullum autem eorum fuisse, qui resolutionem per locos planos, sive rectas lineas & circulares, abolverit.

Vbi apparet, quod tantummodo constructiones illas Geometricas apollaverint, quæ per rectas lineas & circulorum circumferentias persciebantur; quodque constructiones in genere non aliter respicerint, quam quatenus ipsarum perfectio à manuum dexteritate & instrumentorum perfectione proficisceretur. Vnde cum ad planorum Problematum constructiones non nisi rectas lineas & circulorum circumferentias adhibendas esse viderent, quæ omnium facillimè atque expeditissimè regule & circini beneficio (utpote per instrumenta omnino simplicia) in plano describuntur, & sectiones Conicas reliquisque curvas lineas, varium & difficilem ortum habentes, in plano designare difficile existimarent, ideoque descriptionem earum minus certam statuerent; factum inde quoque, ut solam Planorum constructionem, Geometricam pronuntiarent: adeoque non nisi rectas lineas & circulares, reliquas verò non item, pro Geometricis agnoscerent. Quod quare ita distinxerint, non video. Quandoquidem rectas lineas & Circulos perinde atque Parabolas, Hyperbolas, & Ellipses ex Cono secari posse ab Apollonio scio ostensum. Qui porro postquam plurimas proprietates tribus hisce sectionibus pariter atque Circulo convenire ostendit, & quidem propter mirificas Conicorum Theorematum demonstrationes, cum non solum illa tempestare, verum etiam sequentibus sæculis, magnus Geometra sit appellatus, non apparet quam ob causam prædictæ lineæ non æquæ ac rectæ & circulares pro

Geometricis fuerint habita. Adeo ut non solum Veteribus illis, sed etiam Vieta ejusque affectis assentiri nequeam, dum Geometria defectum hic suspicantes, neque Hyperbolas, neque Parabolas xar' $\Delta\eta\sigma\iota\sigma\mu\alpha\varsigma$ in Geometricis describi asseverant, ac proinde Menachmi inventionem duarum mediarum per Parabola & Hyperbole, sive etiam per binarum Parabolarum intersectionem, veluti non Geometricam respiciunt. Quam sane (meo judicio) non minus Geometricam censere oportet, quam illam, quae ab Euclide affertur in Problema 1^{mo} Libri 1^{mi} Elementorum: siquidem punctum, in quo haec sectiones sibi mutuo occurrunt, non minus scientificè invenitur, quam illud, in quo bini circuli se invicem intersecant, ad describendum triangulum aequilaterum.

Ceterum si afferatur, ideo hasce lineas Geometricas non fuisse dictas, eo quod instrumentis describi viderent; Annon ob eandem rationem linea recta & circularis non Geometrica fuissent dicenda, cum ad illas in plano describendas regulam atque circino sit opus? Adeo ut si $\tau\epsilon\chi\eta\iota\sigma\mu\alpha\varsigma$ $\Delta\eta\sigma\iota\sigma\mu\alpha\varsigma$ $\chi\epsilon\iota\rho\epsilon\gamma\iota\alpha\varsigma$ Vieta vocaverit constructionem illam quatenus ipsa regula & circini beneficio perficitur; Annon pari jure artificiosam atque scientificam appellare licebit constructionem illam, quae non nisi instrumentis perfici potest, quae majorem industriam atque artificium in sui compositionem requirunt, cujusque demonstratio simul ex penitiori Geometria penus est depromenda? Quocirca cum recta & circularis non Geometrica non dicantur, neque etiam constructiones per ipsas factae; ratum igitur esto, quod neque Sectiones Conicae, quae cum circulari unum genus curvarum linearum, illudque primum (ut supra dictum fuit) apud Auctorem nostrum consueverunt; neque etiam omnes superiorum generum curvae, constructionesque quae per ipsas fiunt, alia quam Geometrica sint habenda, prout demonstratio illas tales esse comprobabit. Hac autem de curvis lineis dicta sufficiant. Restat ut porro ea, quae hoc libro ab Autore pertractantur, paucis exponamus.

Explicata linearum curvarum natura resumit questionem Pappi ab Antiquis quaesitam, quam primo libro explicuit, atque resolvere incepit; talem deinde ipsam declarans, ut postquam in aliis atque aliis lineis proposita est, illa quoque alias atque alias curvas lineas, solutionem prebentes, quaeque diversi generis sint, prout debita ratio numeri linearum habeatur, admittat. Adeo ut nulla curva linea sit sub calculum cadens, quaeque in Geometriam juxta ejus definitionem recipi possit

Y

(quod

quod sanè observatione dignum, & qua non etiam simul pro certis aliquo linearum numero utilis existat.

Vbi præterea notandum est, quòd eam sic resolvere doceat, ut simul omne illud, quod ad locorum planorum atque solidorum compositionem spectat, exponat, sicque paucis complectatur, non solum questionis propositæ solutionem in tribus quatuorve lineis, sed etiam solidorum locorum compositionem, tantopere à Veteribus quaesitam. Nullos enim ex istis locis omisit, præter omnium simplicissimos, quos facilitatis causâ neglexit.

Post hac autem, questione in 4 lineis propositâ, docet quam primâ & simplicissimâ sit linearum omnium, quæ ibidem inservire possint. Atque ita tandem illi finem imponit. Quibus peractis declarat, quòd, ad inveniendas omnes proprietates curvarum linearum, sufficiat scire resolutionem, quam illarum puncta habent ad puncta lineæ rectæ, sicut etiam, quo pacto inveniri possint lineæ rectæ, quæ ipsas secant in datis punctis ad angulos rectos. Quod quidem subtilissimâ ac mirabili prosequitur methodo, meoque iudicio digna, ut inter ingeniosissima hominum inventa celebretur. Postea verò ne quid desit, quod ad usum curvarum linearum ibidem propositarum spectare videretur, ostendit ipsas diversas habere proprietates, quæ nequaquam sectionum Conicarum proprietatibus cedunt, describique quadam Ovalium genera, ad radiorum reflexionem atque refractionem per specula & vitra, apprimè conducibilia: adeoque in Catoptrica atque Dioptrica usum insignem habentia. Denique ostendit, quo pacto, quæ de lineis curvis explicuit, applicari etiam possint ad lineas curvas, quæ per motum aliquem ordinatum quorundam punctorum alicujus corporis in spatio trium dimensionum describi possunt. Atque ita, quæcunque ad curvarum linearum cognitionem necessaria sunt, breviter absolvit. Quantum autem ad Geometriam promovendam, ejusque arcana detegenda, nec non varias illius functiones cognoscendas hic liber faciat, vel ea ipsa quæ in illo pertractantur, ac modo recensuimus, testari possunt; tum etiam, quia in eo via ad surdesolida, altioraque loca, hætenus incognita, investiganda sternitur, atque in eo infinitæ speculationis campi aperitur.

mus; hoc est, angulus DEA æqualis sit angulo CKB. Producatur autem BC, ut secet DF in I; & per Dagatur recta DH parallela ipsi AF, occurrens cum BC in H. Quoniam igitur similia sunt triangula DHI & KLN triangulo FAD, erunt & ipsa inter se similia. Vnde erit ut KL ad LN, hoc est, ut b ad c , ita DH seu AB, hoc est, x , ad HI, quæ ideo erit $\frac{cx}{b}$. Deinde subductâ HI ex HB seu DA, hoc est, $\frac{cx}{b}$ ex $a+c$, relinquetur IB, $a+c-\frac{cx}{b}$. Equæ si auferatur BC seu y , remanebit EC, $a+c-\frac{cx}{b}-y$. Quia verò in Hyperbola rectangulum ICB æquatur rectangulo DEA, per 10 prop. 2^{di} libri Conicorum Apollonii; ideo si multiplicetur IC per CB, hoc est, $a+c-\frac{cx}{b}-y$ per y , fiet rectangulum ICB, $ay+cy-\frac{cxy}{b}-yy$, æquale rectangulo DEA seu ac , hoc est, ei quod fit ex ductu ipsius DE seu GA in EA. Quare ordinatâ æquatione, factâque transpositione, ut yy unam obtineat æquationis partem, invenietur $yy \propto cy - \frac{cxy}{b} + ay - ac$. Quæ æquatio eadem est, quæ supra ex motu regulæ GL & rectæ lineæ CK fuit inventa. Aded ut affirmare liceat, descriptam lineam curvam CE Hyperbolam esse, cujus Asymptoti AF, FD; quemadmodum supposuimus. Quorum pleniorẽ demonstrationem qui desiderat, consulat caput 6^{um} tractatus nostri de Organica Conicarum Sectionum in plano descriptione, ubi casus omnes profecuti sumus.

Sed utile fuerit unum aut alterum Problema simile adjuungere.

In plano quocunque concipiatur moveri AB regula, mobilis circa punctum fixum A, atque huic regulæ affixa alia æqualis regula BD, in puncto B, ut similiter circa punctum B in eodem plano moveri possit. Assumpto autem in BD inter B & D quovis puncto E, & commoto puncto D per rectam lineam AD; Quæritur cuius generis sit curva linea, quam punctum E motu illo describit?

Quoniam igitur ad hanc quæstionem oportet cognoscere relationem, quam hujus curvæ puncta habent ad puncta lineæ rectæ AD, in qua punctum A est datum: suppono ex puncto E, ad quod

ordinetur, ita ut xx unam teneat æquationis partem (si sit x quam invenire volumus, relinquendo y indeterminatam), invenietur

$$xx \propto \frac{4aab - 4ab + b^2 - bbyy}{4aa - 4ab + bb}, \text{vel } xx \propto bb - \frac{bbyy}{4aa - 4ab + bb}.$$

Vnde cum æquatio non ascendat ultra quadratum unius ex quantitibus indeterminatis, quemadmodum & superius in Hyperbola evenit: constat, lineam curvam descriptam esse primi generis, quippe quæ alia non est quam Ellipsis, juxta ea quæ secundo capite tractatus nostri de Organica Conicarum sectionum descriptione demonstravimus. Vbi advertere licet praxin (quam & Clavius lib. 1. suæ Gnom. affert prop. 26^a) describendi Ellipsin per puncta, quæ ex inventa æquatione colligi potest, quæque lignariis & cæmentariis in extruendis fornicibus familiaris est, atque in orthographicis Sphæræ delineationibus usum habet insignem. Nam si producta $A B$ ad I , ut $B I$ sit æqualis $B E$, centro A intervallo $A I$ circulus describatur, secans $A D$, hinc inde productam, in L & K erit $L K$ axis transversus Ellipsis. Rectus autem invenitur, si ex eodem centro, intervallo $D E$, circulus describatur per $G F g$, secans $A I$ in F . Erit enim $A G$ semissis axis recti. Et si à puncto F ipsi $A D$ ducatur $F E$ parallela, secans $I N$ in E : erit punctum E unum ex punctis, per quod Ellipsis transire debet. Quo quidem modo infinita alia puncta inveniuntur. Quod & ex calculo sit manifestum: Est enim $A I = 2a - b$, & $A N = y$; estque ut $A I$ seu $2a - b$ ad $A N$ seu y , ita $A F$ seu b ad $A n$, quæ ideo est $\frac{by}{2a - b}$. Cujus quadratum $\frac{bbyy}{4aa - 4ab + bb}$ si auferatur à quadrato ex $A F$ seu bb , remanebit quadratum ex $n F$ $bb - \frac{bbyy}{4aa - 4ab + bb}$, utpote, æquale xx quadrato lineæ NE . Quemadmodum fuit inventum.

Eodem modo operaberis in quæstione sequenti, quæ ultima est propositio lib. 4^{ta} collectionum Mathematicarum Pappi Alexandrini.

Quæritur cujus generis sit curva linea $A F D B$, cujus hæc est proprietas: ut, deducta, à quolibet ejus puncto, ut D , perpendiculari $D C$, in rectam $A B$, positione & magnitudine datam, id quod sub perpendiculari $D C$ & alia quadam data linea & continetur, æquale sit rectangulo, quod sub segmentis $A C$, $C B$ comprehenditur.


Secūda



Secū AB bifariam in E, pono AE vel EB $\propto a$, EC $\propto y$, CD $\propto x$: eritque AC $\propto a + y$, & CB $\propto a - y$. Cum igitur ejusmodi sit relatio punctorum curvæ ADB ad puncta rectæ AB, ut rectangulum sub CD & k æquetur rectangulo sub AC, CB: erit $a - y \propto kx$. Quæ æquatio ad omnia utriusque lineæ puncta referri potest, quandoquidem y & x duæ quantitates indeterminatæ existunt, quæ ad omnes lineas EC, CD applicari possunt. Exceptis punctis F & E, quo casu quantitas y nulla est, & EF æquatur $\frac{a^2}{k}$. quod & de duobus præcedentibus Problematis est intelligendum. Ceterum cum in æquatione inventa $a - y \propto kx$ una quantitatū incognitarum y adscendat ad quadratum, indicio est, lineam curvam esse primi generis. Quam aliam non esse, quàm Parabolam, demonstravit Pappus loco citato.

Non aliter concludet, æquatione existentæ $xy \propto ab$, vel $xy \propto by - ax$, lineam curvam, quæ hanc æquationem produxit, esse primi generis: cum tantum ascendat ad rectangulum duarum quantitatū indeterminatarum x & y . Est autem curva illa linea Hyperbola. Quod faciliè intelligetur, si in prima æquatione, ubi $xy \propto ab$, concipiamus ab constituere rectangulum aliquod parallelogrammum ABCD, cujus unum latus AB sit a , & alterum BC sit b ; atque per punctum C circa Asymptotos DA, AB Hyperbolæ describamus CF; ac denique à quovis in

ca



ea puncto F agamus duas rectas lineas FG, FE, ipsis AB, BC parallelas: Erit enim parallelogrammum A EFG parallelogrammo ABCD æquale, per 12 prop. 2^{di} libri Conicorum Apollonii. Aded ut AE & EF sumi possint pro duabus quantitibus indeterminatis y & x , quæ in se invicem ductæ efficiant $xy \propto ab$. quod exigitur proposita æquatio.

Eodem modo, si æquatio fuerit $xy \propto by - ax$, & producantur rectæ DC, EF, donec concurrant in punctum H: erit iidem parallelogrammum DHFG parallelogrammo CHEB æquale. Ac proinde si DC ponatur $\propto a$, & CB $\propto b$, (ut ante) & binæ quantitates indeterminatæ y & x ad binas lineas CH & HF referantur, atque DH seu $a + y$ ducatur in HF seu x : erit rectangulum DF seu $xy + ax$ æquale rectangulo CE seu by , utpote quod invenitur multiplicando CB seu b per CH seu y . Adeoque si utrinque auferatur ax , relinquetur $xy \propto by - ax$. Quæ est æquatio posterior.

Equibus manifestum sit, quod, licet plurimi referat, quænam rectæ pro quantitatibus indeterminatis sumantur, ut æquatio brevis atque facilis reddatur, semper tamen linea ejusdem generis appareat, quocunque tandem modo sumantur.

Omitto alios æquationum modos seu formulas, eandem curvam designantes, quandoquidem complures sunt. In genere hoc dicam, totam æquationum illarum varietatem oriri tantum ex varia harum curvarum ad diversas rectas lineas relatione. Nam, ut ostendatur quænam differentia obtineri possit, cum curva linea ad diversas rectas lineas referatur: Sunto duæ rectæ lineæ positione data AB, DF, sibi mutuò occurrentes in D; punctum au-

tem

$y + b + \frac{bx}{a}$ ad CG; erit $CG \propto \frac{ab + bx + ay}{\sqrt{aa + bb}}$. E quibus perspicuum fit, differentiam omnem, quæ in referendis curvæ punctis C, tum ad puncta rectæ AB, tum ad puncta rectæ DF, obtrineri potest, in eo tantum consistere, quod, cum AB indeterminata relinquitur, CB exprimitur per y ; sed CG per $\frac{ab + bx + ay}{\sqrt{aa + bb}}$, & DG per $\frac{aa + ax - by}{\sqrt{aa + bb}}$. Ita ut si y speciem induat, quæ ex proprietate curvæ convenit; constabit simul ratio, quam curvæ puncta C obtinebunt ad puncta utriusque rectæ AB, DF. Id quod eodem modo in omni alia datarum linearum positione ostendi posset, nisi breviores esse vellemus.

B *Saltem si supponamus quantitatem e z majorem quàm c g. nam si minor foret, mutanda essent omnia signa + & —.] Existente enim e z minore quàm c g, & multiplicando utrobique per z^2 , foret $e z^3$ minor quàm $c g z^2$. Quo casu omnes quoque numeratoris termini, qui signo + adficiuntur, minores erunt illis, qui signo — adficiuntur; adeo ut tantum mutanda sint omnia signa. Aequationem autem hoc facto illam manere, ita ostenditur. Esto $y \propto \frac{fe - dk}{d - e}$ (sufficit enim id per facile aliquod exemplum ostendere), suppositaque d minori quàm e , mutantur omnia signa + & —: fietque $y \propto \frac{-fe + dk}{-d + e}$.*

Quoniam enim ex hypothesis $y \propto \frac{fe - dk}{d - e}$, erit, multiplicando utrinque per $d - e$, $dy - ey \propto fe - dk$. Vnde factâ transpositione, ut totum æquetur nihilo, erit $dy - ey - fe + dk \propto 0$. Transferantur rursus $+dy - ey$ in alteram æquationis partem, & fiet $-fe + dk \propto -dy + ey$. Quæ æquatio à præcedenti non differt, nisi quod termini omnes contrariis signis sint adfecti. Quare si utraque æqualitatis pars dividatur per $-d + e$, prodibit $y \propto \frac{-fe + dk}{-d + e}$. ut erat propositum.

Vnde colligere licet: Si quantitates quædam signis + & — junctæ æquantur aliis quibusdam quantitatibus etiam signis + & — junctis: erunt quoque eadem contrariis signis affectæ inter se æquales.

Vnde

Vnde si in hac æquatione quantitas y nulla sit, aut minor quàm nihil, postquam punctum C supposuimus in angulo D A G, oporteret & illud supponere in angulo D A E, aut E A R, aut R A G, mutando signa + & —, prout ad effectum hunc requireretur. Quòd si verò in quatuor hisce positionibus valor ipsius y nullus reperiretur, indicio esset, quæstionem casu proposito esse impossibilem.] Sciendum hic ab Autore obiter notari, ad plenam compositionem loci, in quem cadit quæsitum punctum C, opus esse ut investigemus id ipsum in omnibus 4^{or} angulis D A G, D A E, E A R, & R A G, quærendo nempe ad hoc 4^{or} æquationes diversas. Id quod notat facile esse, unà æquatione jam inventâ, quoniam ad reliquas obtinendas tantummodo mutare oportet signa + & —, pro diversa habitudine quantitatum inventarum ad figuræ lineas; ut punctum C, quando cadit intra angulum D A E, aut E A R, aut R A G quærat eadem ratione, quâ illud hîc invenire docuit, cùm intra angulum D A G cadere supponitur. Manifestum enim est, quòd, si in 4^{or} hisce positionibus valor ipsius y nullus repeririatur, quæstio proposita futura sit impossibilis. Quod ipsum hîc in genere de puncto C intelligi debet, etiamsi quæstio alias condiciones præsupponat: cum illa vix alioquin Autori (ob exiguam ejus utilitatem) istius momenti visa sit, ut in constructione hujus loci totus esset, nisi quatenus hîc unà simul compositionem Locorum Planorum & Solidorum traderet, sicut ipsius verba indicant p. 12 & 34. Quippe aliàs in hac positione datarum linearum contingit, quando videlicet rectangulum sub C B, C F ponitur æquale rectangulo sub C D, C H, ut punctum C non tantum ubivis cadat in Circulum, qui transit per puncta A, G, & duas intersecctiones linearum F E, G H, & ipsarum D A, F E; verùm etiam in utramque duarum oppositarum Hyperbolarum, quarum una transit per A & G puncta, & altera per duas reliquas intersecctiones dictas. Quemadmodum etiam, si duæ ex datis lineis sunt parallele, fieri potest, ut punctum C ubilibet cadat in duas oppositas Hyperbolas & insuper in Parabolam vel in duas alias oppositas Hyperbolas; aut etiam in duas oppositas Hyperbolas & in rectam lineam, ubi videlicet bina sunt parallelarum paria sese intersecantia. atque ita de aliis. Idem observare licet


Vide fig.
pag. 12.

in Apollonii Locis Planis, à me restitutis, in quorum nonnullis, ad plenam loci compositionem, quæsitum punctum præter lineas jam expressas etiam alia plana loca contingit, quæ pari facilitate investigari & construi possunt, prout nimirum idem punctum ad id in aliis tantum angulis suppositum fuerit, quemadmodum & ibidem fuit indicatum.

His similia notare quoque licet circa Problemata omnino determinata, in quibus non nisi certus est punctorum numerus. Cuiusmodi est sequens

P R O B L E M A.

IN recta interminata assignatis duobus punctis A, B, in eadem aliud assignare punctum C, ut rectangulum



ACB, quod sit sub rectis AC, CB, ad assignata puncta A, B abscissis, dato spatio d æquale sit, quod tamen minus sit quartâ parte quadrati ex AB, quæ sit ∞a .

Quoniam hîc juxta mentem Problematis punctum C indeterminatum est respectu puncti A, ut & respectu puncti B, hoc est, indeterminatum quò magis ad dextram quàm ad sinistram utriusque cadat, hinc si concipiatur determinatum inter A & B, æquatio huc pertinens comprehendet plus quàm oportet, neque legitima erit, si ei soli acquiescere velimus. Quocirca & illud ipsum extra A & B ab utraque parte supponendum est, si velimus ut solutio Problematis omnibus numeris sit absoluta.

Vnde supponendo C primùm cadere extra AB ad sinistram ipsius A, erit, assumptâ x pro AC, $xx + ax \infty d$; ac deinde supponendo C cadere inter A & B, erit $ax - xx \infty d$; & denique supponendo C cadere extra AB ad dextram ipsius B, erit $xx - ax \infty d$. Hoc est in numeris, si a sit $\infty 20$, $d \infty 96$, habebitur $x \infty 4$, $x \infty -24$; $x \infty 12$; $x \infty 8$; $x \infty 24$, & $x \infty -4$. Quæ quidem omnes sunt radices, quæ ad propositum Problema pertinent. Quarum prima & ultima designant longitudinem lineæ AC ∞x , qualis

qualis ipsa sumenda est ab A versùs sinistram, & quatuor reliquæ, qualis ipsa sumi debet ab A versùs dextram, cadente puncto C inter A & B, vel ultra B; adeò ut in toto sint 4^{or} diversa puncta, quæ quæsito satisfaciant.

Caterum si velimus, ut una obtineatur æquatio, quæ hæc omnes radices simul includat, oportet tantùm, ubicunque accepto puncto C, factâque A c ∞ x, multiplicare $xx + 20x - 96 \infty 0$ per $20x - xx - 96 \infty 0$, & id quod fit rursus per $xx - 20x - 96 \infty 0$, & invenietur $-x^6 + 20x^5 + 496x^4 - 11840x^3 + 47616xx + 184320x - 884736 \infty 0$ seu $x^6 - 20x^5 - 496x^4 + 11840x^3 - 47616xx - 184320x + 884736 \infty 0$.

Id quod etiam universaliùs fieri potest multiplicando C B ∞ $\text{B } 20 \text{ B } x$ per A C ∞ x, obtinebitur enim $\text{B } 20x \text{ B } xx \infty 96$. Quæ æquatio præter radices superiores etiam continet $x \infty 8$, & $x \infty 12$, quippe quæ eliciuntur ex æquatione $-xx - 20x \infty 96$.

Vbi demum notandum, ex æquatione inventa $\text{B } 20x \text{ B } xx \infty 96$ facile quoque esse aliam vulgari modo affectam invenire, quæ omnes easdem radices cum illa comprehendat, utpote multiplicando utramque partem in se quadratè, & fit $400xx \text{ B } 40x^3 + x^4 \infty 9216$. Vnde servatâ $\text{B } 40x^3$ ab una parte, & deinde utrâque rursus quadratâ, invenitur æquatio $x^3 - 800x^6 + 141568x^4 - 7372800xx + 84934656 \infty 0$, cujus radices eadem sunt quæ præcedentis æquationis $\text{B } 20x \text{ B } xx \infty 96$, quas enumeravimus. Ratio autem, cur D. des Cartes hujusmodi æquationibus ad solutionem quæstionis ex Pappo allatæ non fuerit usus, vel ea videtur, quòd alias tum vulgares, tum etiam à quolibet faciliùs perceptibiles animadverterit; ita ut, dum quæstio per se satis difficilis existit, præstare judicaverit, specialem æquationem pro C puncto investigare, postquam illud in angulo D A G supponitur, ulteriùsque tantùm digito indicare, si Problemati penitus satisfaciendum sit, eodem modo in reliquis angulis D A E, E A R, & R A G esse procedendum; quàm æquationem universalem, quæ omnia simul puncta respiceret, invenire.

Hinc nihil mihi ampliùs restare video pro linea L C præter hosce terminos: $L C \infty \sqrt{mm} + ox - \frac{p}{m}xx$.

Z 3


Vnde

Vnde cognoscitur, quòd si nulli fuissent, futurum fuisse ut punctum C reperiretur in linea recta IL; & si tales extitissent, ut inde radix extrahi potuisset, hoc est, ut, $mm \& \frac{p}{m} x x$ signo + notatis, 00 fuisset æqualis $4 p m$, sive etiam termini $mm \& 0 x$, aut $0 x \& \frac{p}{m} x x$ nihilo fuissent æquales, punctum hocce C in aliam rectam lineam cecidisset, quæ quidem inventu difficilior non fuisset quàm IL.] Hæc verba tres conditiones complectuntur ad determinandum punctum C, quando in lineam rectam cadit.

Nam cum facienda sit $LC \propto \sqrt{mm + 0x - \frac{p x x}{m}}$, reperietur illud punctum in linea recta IL, si termini, quibus ipsa exprimitur, nulli sint. Et si tales fuerint, ut radix ex iis extrahi possit, hoc est, ut, $mm \& \frac{p}{m} x x$ signo + notatis, 00 sit æqualis $4 p m$, hoc est,

ut LC sit $\sqrt{mm + \frac{p x x}{m}} \& x \sqrt{4 p m}$ seu $m \& x \sqrt{\frac{p}{m}}$: punctum C similiter in recta linea reperietur. Idem continget, si termini $mm \& 0 x$, aut $0 x \& \frac{p x x}{m}$ fuerint nulli, dummodo reliquus $\frac{p x x}{m}$, aut mm semper signo + adfectus sit.

CC Sed si hoc non fiat, punctum C reperietur semper in aliqua trium Conicarum sectionum, aut in Circulo, cuius, &c.] Quòd ista, quæ hîc deinceps pag. 29, 30, & 31 ab Autore traduntur, cuius manifestiora fiant, sequentia in medium afferre visum fuit.



Primus casus, cùm Sectio est Parabola, in quâ linea LC una ex iis existit, quæ ordinatim ad diametrum, quæ semper in lineam IL cadit, applicantur; & cujus vertex N in ea ex altera parte puncti L sumendus est respectu puncti I, linea LC existente $\propto \sqrt{mm + 0x}$. Ad quem inveniendum, si. ut & latus rectum

Etum r , pono pro NI f , eritque $NL \propto f + \frac{ax}{x}$,

deinde ita procedo:

$$\text{Mult. } NL. f + \frac{ax}{x}$$

$$\text{per } \frac{r}{x}$$

$$\text{fit } \square LC. fr + \frac{arx}{x}, \text{ aequale } mm + ox.$$

$$\frac{ar}{x} \propto o$$

$$\frac{ar}{x} \propto oz$$

$$r \propto \frac{ox}{a}$$

$$fr \propto mm, \text{ dele } r$$

$$\frac{fox}{a} \propto mm$$

$$fox \propto am$$

$$f \propto \frac{am}{ox}$$



2^{us} casus,
ubi vertex N
in linea IL ex
eadem parte
puncti L su-
mendus est re-
spectu puncti
 I , linea LC
existente \propto
 $\sqrt{mm - ox}$.

Quod sic liquet


$$\text{Mult. } LN. f - \frac{ax}{x}$$

$$\text{per } \frac{r}{x}$$

$$\text{fit } \square LC. fr - \frac{arx}{x} \text{ aequale } mm - ox.$$

$$\text{Et fit, ut ante, } r \propto \frac{ox}{a} \text{ \& } f \propto \frac{am}{ox}.$$

3^{us} ca-




3^{us} casus, ubi vertex N in
linea I L sumi debet inter
puncta I & L, lineâ LC exi-
stente $\propto \sqrt{-mm + ox}$.

Quod sic liquet

$$\text{Mult. } NL \cdot \frac{ax}{x} - f \\ \text{per } r \\ \text{fit } \square LC \cdot \frac{arx}{x} - fr, \text{ aequa-} \\ \text{le } -mm + ox.$$

Et fit, ut ante, $r \propto \frac{ox}{a}$, & $f \propto \frac{amm}{ox}$.



4^{us} casus, ubi vertex N cadit
in punctum I, cum quantitas mm
nulla est, lineâ LC existente \propto
 \sqrt{ox} .


Quod sic liquet

$$\text{Mult. } NL \cdot \frac{ax}{x} \\ \text{per } r \\ \text{fit } \square LC \cdot \frac{arx}{x}, \text{ aequale } ox.$$

Et fit, ut ante, $r \propto \frac{ox}{a}$.

E quibus colligitur, cum in omnibus hisce Parabolæ casibus si-
ve diversis ejus positionibus latus rectum sit $\propto \frac{ox}{a}$, atque in iis
nullibi reperiatur quantitas in xx ducta, nec præter easdem ulla
alia excogitari possit, quâ linea LC talis, qualis in his omnibus ca-
sibus data fuit, obtineatur, quæ situm punctum C cadere in Para-
bolam, cujus latus rectum est $\frac{ox}{a}$, quæque pro diversa termino-
rum ipsius LC constitutione, positiones jam explicatas admit-
tat.

Pri-



Primus casus, cùm linea est Circulus, & centrum ejus M in linea I L ex eadem parte puncti L sumendum est respectu puncti I, lineâ L C existente

$$\propto \sqrt{mm + ox - \frac{p}{m}xx}.$$

Ad quod inveniendum, ut & diametrum N Q, pono pro NM vel M Q c, &

$$\text{pro I M } d; \text{ eritque } NL \propto c - d + \frac{ax}{z}, \text{ \& } LQ \propto c + d - \frac{ax}{z}.$$

Deinde ita procedo :

$$\text{Mult. NL. } c - d + \frac{ax}{z}$$

$$\text{per L Q. } c + d - \frac{ax}{z}$$

$$cc - cd + \frac{acx}{z}$$

$$+ cd - dd + \frac{adx}{z}$$

$$- \frac{acx}{z} + \frac{adx}{z} - \frac{aaxx}{zz}$$

$$\text{fit } \square NLQ \text{ seu } \square LC. cc - dd + \frac{2adx}{z} - \frac{aaxx}{zz}, \text{ æquale } mm + ox - \frac{p}{m}xx.$$

Intellige hîc c majorem esse quàm d.

$$\frac{aa}{xz} \propto \frac{p}{m} \quad \frac{2ad}{z} \propto o$$

$$aam \propto pzz \quad 2ad \propto oz$$

$$d \propto \frac{oz}{2a} \text{ seu } \frac{aom}{2pz}. \text{ Est enim } aam \propto pzz. \text{ Et fit } dd \propto \frac{oozz}{4aa}.$$

$$cc - dd \propto mm, \text{ dele } dd$$

$$cc \propto \frac{oozz}{4aa} + mm$$

$$4cc \propto \frac{oozz}{aa} + \frac{4aam}{aa}, \text{ dele } aam$$

$$4cc \propto \frac{oozz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}$$

$$2c \propto r \propto \sqrt{\frac{oozz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}.$$

Λ α

2^{des}


$$cc - dd \infty mm, \text{dele } dd$$

$$cc \infty \frac{00xz}{4aa} - mm$$

$$4cc \infty \frac{00xz}{aa} - \frac{4aamm}{aa}, \text{dele } aamm$$

$$4cc \infty \frac{00xz}{aa} - \frac{4mpxz}{aa}$$

$2c \infty \sqrt{\frac{00xz}{aa} - \frac{4mpxz}{aa}}$. Vbi etiam liquet, ut punctum C
 cadat in Circulum, quemadmodum supposuimus, quantitatem oo
 hoc casu maiorem requiri quàm $4mp$.



5^{us} casus, ubi ver-
 tex N cadit in pun-
 ctum I, cum quan-
 titas mm non repe-
 ritur, lineâ LC exis-
 stente ∞

$$\sqrt{ox - \frac{p}{m}xx}. \text{ Et fit}$$

$$d \infty c \infty \frac{0x}{2a} \text{ seu } \frac{aom}{2pz}$$

$$\& 2c \infty \frac{0x}{a}.$$

Quod sic liquet

$$\text{Mult. NL. } \frac{ax}{x}$$

$$\text{per LQ. } 2c - \frac{ax}{x}.$$

$$\text{fit } \square \text{NLQ seu } \square \text{LC. } \frac{2acx}{x} - \frac{aax}{x^2}, \text{ xquale } ox - \frac{p}{m}xx.$$

Intellige hîc c & d esse x quales.

$$\frac{2ac}{x} \infty 0$$

$$\frac{2aac}{x} \infty 0x$$

$$2c \infty \sqrt{\frac{0x}{a}}$$

$$\frac{aa}{x^2} \infty \frac{p}{m}$$

$$aamm \infty pzz$$

Hinc cum in omnibus hîc Circuli casibus five diversis ejus po-
 sitionibus quantitas in xx ducta ubique signo — adfecta reperia-
 tur, ut & quantitas $aamm \infty pzz$; nec præter positiones hæc ul-

A 2 3

la alia

$$\frac{ccr-ddr}{zc} \propto mm$$

$$ccr-ddr \propto 2cmm, \text{ dele } c \text{ \& } cc$$

$$\frac{aaddr}{oozz} - ddr \propto \frac{2admm}{oz}$$

$$aaddr \propto dooz + 2ammoz$$

$$rr \propto \frac{oozz}{aa} + \frac{2mmoz}{ad}, \text{ dele } d, \text{ \& extr. } \sqrt{}$$

$$r \propto \sqrt{\frac{oozz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}. \text{ Hinc ad inveniendum latus transfer-}$$

sum, fiat ut pzz ad aam , ita

$$\sqrt{\frac{oozz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}, \text{ ad } \sqrt{\frac{a4oomm}{ppzz} + \frac{4aam^3}{pzz}}.$$



2^{us} casus, ubi centrum M in linea IL ex altera parte est su-
mendum puncti L respectu puncti I, linea LC existente

$$\propto \sqrt{mm - ox - \frac{p}{m}xx}.$$

Quod sic liquet

lat. transv. lat. rect. $\square QLN$

$$zc - r - cc - dd - \frac{2adx}{z} - \frac{aaxx}{zz},$$

$\square LC$


$$adccr-ddr - \frac{2adrz}{z} - \frac{aarxz}{zz}, \text{ xquale } mm - ox - \frac{p}{m}xx.$$

Intellige hic similiter c maiorem quam d .

Et fit, ut ante, r ad zc , ut pzz ad aam , $d \propto \frac{aom}{2pz}$,

$$r \propto \sqrt{\frac{oozz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}, \text{ \& } zc \propto \sqrt{\frac{a4oomm}{ppzz} + \frac{4aam^3}{pzz}}.$$

Ubi notandum, in allatis tribus casibus, sicut in Circulo, propter c ipsâ d majorem, verticem N cadere ad alteram partem puncti M respectu puncti I , hoc est, quando habetur $+mm$.



4^{us} casus, ubi vertex N cadit ad eandem partem puncti M respectu puncti I , nimirum inter puncta I & L , cum oo est major quàm $4mp$. lineâ $L C$ existente ∞

$$\sqrt{-mm+ox-\frac{p}{m}xx}$$

$$\text{Et fit } d \infty \frac{aom}{2pz}$$

$$r \infty \sqrt{\frac{ooxz}{aa} - \frac{4mpxz}{aa}}, \text{ \& } 2c \infty \sqrt{\frac{aaommm}{ppxz} - \frac{4aam}{pzx}}$$

Quod sic liquet

lat. transv. lat. rect.

$\square NLQ$

$$2c \text{ --- } r \text{ --- } cc \text{ --- } dd + \frac{2adx}{z} - \frac{aaxx}{zx}, \text{ ad}$$

$\square LC$

$$ccr \text{ --- } ddr + \frac{2adrx}{z} - \frac{aarxx}{zx}, \text{ xquale } -mm+ox-\frac{p}{m}xx$$

Intellige hîc c minorem quàm d .

$$\frac{adr}{cz} \infty 0$$

$$adr \infty cox$$

$$\frac{adr}{ox} \infty c, \text{ \& } \frac{aaddrr}{ooxz} \infty cc$$

$$\frac{aar}{cxz} \infty \frac{p}{m}$$

dele c , $aamr \infty 2cpz$. Hinc utrad $2c$,

$$aamr \infty \frac{2adpx}{o} \text{ ita } pzx \text{ ad } aam.$$

$$aom \infty 2dpz$$

$$d \infty \frac{aom}{2pz}$$

Bb

ccr—

Deinde ita procedo:

$$\text{Mult. NL. } d - c - \frac{ax}{z}$$

$$\text{per L Q. } d + c - \frac{ax}{z}$$

$$\frac{dd - cd - \frac{adx}{z}}{z}$$

$$+ cd - cc - \frac{acx}{z}$$

$$- \frac{adx}{z} + \frac{acx}{z} + \frac{aaxx}{zz}$$

lat. tr. lat. reā.

$$2c - r - \square \text{NLQ. } dd - cc - \frac{2adx}{z} + \frac{aaxx}{zz}$$

$$\text{ad } \square \text{L C. } \frac{ddr - ccr - \frac{2adr}{z} + \frac{aaxx}{zz}}{2c}, \text{ æquale } mm - ox + \frac{p}{m} xx.$$

Intellige hic d majorem esse quàm c .

$$\frac{adr}{cz} \propto o$$

$$\frac{adr}{cz} \propto coz$$

$$\frac{adr}{oz} \propto c, \& \frac{aaddr}{oozz} \propto cc$$

$$\frac{aar}{2czz} \propto \frac{p}{m}$$

dele c , $aamr \propto 2cpz$. Hinc ut r ad

$$aamr \propto \frac{2adpz}{o} \quad 2c, \text{ ita } pz \text{ ad } aam$$

$$\frac{aom}{2pz} \propto 2dpz$$

$$\frac{aom}{2pz} \propto d$$

$$\frac{ddr - ccr}{2c} \propto mm$$

$$ddr - ccr \propto 2cmm, \text{ dele } c \& cc$$

$$ddr - \frac{aaddr}{oozz} \propto \frac{2admm}{oz}$$

$$doozz - aaddr \propto 2ammoz$$

$$doozz - 2ammoz \propto aaddr$$

$$\frac{doozz}{aa} - \frac{2ammoz}{ad} \propto rr, \text{ dele } d, \& \text{ extr. } \sqrt{\quad}$$

$\sqrt{\frac{doozz}{aa} - \frac{4mpzz}{aa}} \propto r$. Hinc ad inveniendum latus transversum, fiat ut pzz ad aam ; ita

$$\sqrt{\frac{doozz}{aa} - \frac{4mpzz}{aa}}, \text{ ad } \sqrt{\frac{aaomm}{ppzz} - \frac{4aam}{pzz}}$$


Vbi

Similiter hinc d majorem intellige quàm e .

Et fit, ut ante, $rad\ 2c$, ut $p\ 2z$ ad aam , $d \propto \frac{aom}{2pz}$.

$$r \propto \sqrt{\frac{00zz}{aa} - \frac{4mpzz}{aa}} \ \& \ 2c \propto \sqrt{\frac{aaommm}{ppzz} - \frac{4aam^3}{pz^3}}.$$

Vbi etiam liquet, ut punctum C cadat in Hyperbolam, quemadmodum supposuimus, quantitatem oo & hoc casu majorem requiri quàm $4mp$.



3^{us} casus, ubi vertex N sumendus est inter puncta I & L , lineâ

LC existente $\propto \sqrt{-mm + ox + \frac{p}{m}xx}$.

$$\text{Et fit } d \propto \frac{aom}{2pz}, r \propto \sqrt{\frac{00zz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}, \& \ 2c \propto \sqrt{\frac{aaommm}{ppzz} + \frac{4aam^3}{pz^3}}.$$

Quod sic liquet

$$\text{Mult. } QL. \quad c + d + \frac{ax}{z}$$

$$\text{per } LN. \quad -c + d + \frac{ax}{z}$$

$$-cc - cd - \frac{acx}{z}$$

$$+cd + dd + \frac{adx}{z}$$

$$+ \frac{acx}{z} + \frac{adx}{z} + \frac{aaxx}{zz}$$

lat. tr. lat. rect.

$$2c - r - \square QLN. dd - cc + \frac{2adx}{z} - \frac{aaxx}{zz}$$

$$ddr - ccr + \frac{2adrx}{z} + \frac{aarxx}{zz}$$

$$\text{ad } \square LC. \frac{\quad}{2c}, \text{ æquale}$$

$$-mm + ox + \frac{p}{m}xx.$$

In-

Intellige hic d minorem esse quàm c .


$$\begin{aligned} \frac{adr}{cz} &\propto o \\ \frac{adr}{oz} &\propto ooz \\ \frac{adr}{oz} &\propto c, \& \frac{aaddr}{oozz} \propto cc \\ \frac{aar}{zcz} &\propto \frac{p}{m} \\ \text{dele } c, \frac{aamr}{zcz} &\propto \frac{2cpz}{z} \\ \frac{aamr}{zcz} &\propto \frac{2adpz}{o} \\ \frac{aom}{2pz} &\propto \frac{2dpz}{z} \\ \frac{aom}{2pz} &\propto d \end{aligned}$$

Hinc ut rad
2c, ita pzz
ad aam.

$$\begin{aligned} \frac{ddr - ccr}{zc} &\propto -mm \\ \frac{ddr - ccr}{zc} &\propto -2cm, \text{ dele } c \& cc \\ \frac{ddr - aaddr}{oozz} &\propto -\frac{2admm}{oz} \\ \frac{doozz + 2ammoz}{oozz} &\propto aadrr \\ \text{dele } d, \& \frac{oozz}{aa} + \frac{ammoz}{ad} &\propto rr \\ \text{extr. } \sqrt{\frac{oozz}{aa} + \frac{ammoz}{ad}} &\propto rr \end{aligned}$$

$\sqrt{\frac{oozz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}} \propto r$. Hinc ad invenienđum latus
transversum fiat ut pzz ad aam, ita

$$\sqrt{\frac{oozz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}, \text{ ad } \sqrt{\frac{aaomm}{ppzz} + \frac{4aam}{pzz}}$$




4^{us} casus, ubi centrum M & vertex N sumi debent inter puncta
I & L, lineâ LC existente $\propto \sqrt{-mm - ox + \frac{p}{m}xx}$.

Quod

Intellige hîc c & d esse æquales.

Et fit, ut ante in Ellipsi, rad $2c$, ut pzz ad aam ,

$$d \propto c \propto \frac{aom}{2pz}, r \propto \frac{oz}{a}, \& 2c \propto \frac{aom}{pz}$$



6^{us} casus, ubi vertex Q cadit in punctum I, cùm quantitas mm non reperitur, lineâ LC existente

$$\propto \sqrt{-ox + \frac{p}{m}xx}.$$

Quod sic liquet

Mult. QL.

$$\frac{ax}{r} \cdot \frac{ax}{r} \\ \text{per LN.} - 2c + \frac{ax}{r}$$

lat. transv. lat. rect.


$$2c - r - \square QLN. - \frac{2acx}{r} + \frac{aax}{r^2},$$

$$- \frac{2acrx}{r} + \frac{aax}{r^2}$$

$$\text{ad } \square LC. \frac{2acrx}{2c} + \frac{aax}{r^2}, \text{ æquale } -ox + \frac{p}{m}xx.$$

Intellige hîc similiter c & d esse æquales.

Et fit, ut ante, rad $2c$, ut pzz ad aam , $d \propto c \propto \frac{aom}{2pz}, r \propto \frac{oz}{a},$
 $\& 2c \propto \frac{aom}{pz},$



7^{mus} casus, ubi centrum M cadit in punctum I, cùm quantitas

$$ox \text{ nulla est, lineâ LC existente } \propto \sqrt{-mm + \frac{p}{m}xx}.$$

Cc

Quod

Quod sic liquet

$$\text{Mult. QL. } c + \frac{ax}{z}$$

$$\text{per LN. } -c + \frac{ax}{z}$$

$$-cc - \frac{acx}{z}$$

$$\text{lat. tr. lat. rect. } + \frac{acx}{z} + \frac{aax}{zz}$$


$$2c - r - \square \text{QLN. } -cc + \frac{aax}{zz},$$

$$-ccr + \frac{aarxx}{zz}$$

$$\text{ad } \square \text{LC. } \frac{-ccr + \frac{aarxx}{zz}}{2c}, \text{ æquale } -mm + \frac{p}{m}xx.$$

Intellige hic d esse ∞o .

Unde, ut ante in Ellipti, invenitur, r esse ad $2c$, sicut pzz ad aam , & $r \propto \sqrt{\frac{4mpzz}{aa}}$, at verò $2c \propto \sqrt{\frac{4aam^3}{pzz}}$.



8^{us} casus, ubi linea LC est parallela diametro, ad quam illa, quæ est in linea IL, ordinatim applicatur, & ubi centrum M in linea IL ex eadem parte puncti L sumendum est respectu puncti I, cum quantitas oo est minor quàm $4mp$, lineâ LC existente $\propto \sqrt{mm - ox + \frac{p}{m}xx}$.

Hinc ad inveniendum centrum M, latus rectum R pertinens ad diametrum OP, & latus transversum OQ, pono, ut ante, pro IMd, & pro OM vel MQe.

Dein-

Deinde ita procedo:

$$\text{Mult. LM vel CP. } d - \frac{ax}{z}$$

$$\text{per CP. } d - \frac{ax}{z}$$

$$dd - \frac{adx}{z}$$

$$- \frac{adx}{z} + \frac{aaxx}{zz}$$

lat. rect. lat. transv.

$$R \text{ --- } ze \text{ --- } \square \text{ CP. } dd - \frac{2adx}{z} + \frac{aaxx}{zz},$$

$$\text{ad } \square \text{ QPO. } 2dde - \frac{4adx}{z} + \frac{2aaxx}{zz},$$

$$\text{add. } \square \text{ MO. } ee$$

$$\text{fit } \square \text{ MP vel LC. } \frac{2dde + eeR - \frac{4adx}{z} + \frac{2aaxx}{zz}}{R},$$

$$x \text{ quale } mm - ox + \frac{p}{m} xx.$$

$$\frac{\frac{4ade}{Rz} \infty o}{4ade \infty oRz}$$

$$e \infty \frac{oRz}{4ad}$$

$$\frac{2aax \infty \frac{p}{m}}{Rzz \infty \frac{p}{m}}$$

$$\text{dele } e, \frac{2aaxm \infty pRzz}{aomRz \infty pRzz} \text{ Hinc ut } ze \text{ ad } R, \text{ ita } pzz \text{ ad } aam.$$

$$\frac{aom \infty 2dpz}{aom \infty 2dpz}$$

$$\frac{aom}{2pz} \infty d$$

$$\frac{2dde + eeR}{R} \infty mm$$

$$\frac{2dde + eeR \infty mmR, \text{ dele } e}{aomR}$$

$$\frac{aomR}{za} + eeR \infty mmR$$

$$\frac{aom}{4p} + ee \infty mm$$

$$e \infty mm - \frac{aom}{4p}$$

$$e \infty \sqrt{mm} - \frac{aom}{4p}, \& ze \infty \sqrt{4mm} - \frac{oam}{p}$$


Cc 2

Hinc

Hinc ad inveniendum latus rectum, fiat ut $p z z$ ad $a a m$, ita

$$\sqrt{4 m m - \frac{00 m}{p}}, \text{ ad } \sqrt{\frac{4 a^4 m^4}{p p z^4} - \frac{a^4 00 m^4}{p^3 z^4}}.$$

Ubiliquet, ut punctum C cadat in Hyperbolam, quemadmodum supposuimus, quantitatem $o o$ hoc casu minorem requiri quàm $4 m p$, contra quàm in primo casu.



9^{mus} casus, ubi centrum M in linea I L sumendum est ex altera parte puncti L respectu puncti I, cum $o o$ est minor quàm $4 m p$, linea L C existente

$$\propto \sqrt{m m + o x + \frac{p}{m} x x}.$$

Quod sic liquet

$$\text{Mult. ML vel PC. } d + \frac{a x}{z}$$

$$\text{per PC. } d + \frac{a x}{z}$$

$$\frac{d d + \frac{a d x}{z}}{d d + \frac{a d x}{z}}$$

$$+ \frac{a d x}{z} + \frac{a a x x}{z z}$$

lat. rect. lat. transv.

$$R \text{ ————— } 2 e \text{ ————— } \square P C. d d + \frac{2 a d x}{z} + \frac{a a x x}{z z},$$

$$\square Q P O$$

$$\text{ad } \frac{2 d d e + \frac{4 a d e x}{z} + \frac{2 a a e x x}{z z}}{R}$$

$$\text{add. } \square M O. e e$$

$$\text{fit } \square M P \text{ vel } L C. \frac{2 d d e + e e R + \frac{4 a d e x}{z} + \frac{2 a a e x x}{z z}}{R}$$

$$x \text{ quale } m m + o x + \frac{p}{m} x x.$$

Et fit, ut ante, $2 e$ ad R , ut $p z z$ ad $a a m$, $d \propto \frac{00 m}{2 p z}$,

$$2 e \propto \sqrt{4 m m - \frac{00 m}{p}}, \text{ \& } R \propto \sqrt{\frac{4 a^4 m^4}{p p z^4} - \frac{00 m^4}{p^3 z^4}}.$$

Ubi

Ubi etiam liquet, ut punctum C cadat in Hyperbolam, quemadmodum supposuimus, quantitatem oo & hoc casu minorem requiri quàm $4mp$, contra quàm in 2^{do} casu.



10^{mus} casus, ubi centrum M cadit in punctum I, cum quantitas oo nulla est, lineâ L existente $\propto \sqrt{mm + \frac{p}{m}xx}$.

Et fit $2e \propto 2m$, & $R \propto \frac{2aamm}{pzz}$; & ratio $2e$ ad R ,

ut pzz ad aam .

Quod sic liquet.

Mult. ML vel P C. $\frac{ax}{z}$

per P C. $\frac{ax}{z}$

lat. rect. lat. transv.

$R \text{ --- } 2e \text{ --- } \square P C. \frac{aaxx}{zz}$, ad $\square QPO. \frac{2aexx}{Rzz}$

add. $\square MO. ee$

fit $\square MP$ vel L C. $ee + \frac{2aexx}{Rzz}$

$ee \propto mm$

$e \propto m$, & $2e \propto 2m$

$\frac{2aee}{Rzz} \propto \frac{p}{m}$

x quale $mm + \frac{p}{m}xx$.

dele e , $2aam \propto pRzz$. Hinc ut $2e$ ad R , ita pzz ad aam .

$\frac{2aamm}{pzz} \propto pRzz$

$\frac{2aam}{pzz} \propto R$

Ce 3

Hinc

Hinc cum in omnibus hisce Hyperbolæ casibus sive diversis ejus positionibus quantitas in xx ducta ubique signo $+$ adfecta reperiatur, & in prioribus septem latus rectum ad transversum sit, ut pzz ad aam , at in tribus posterioribus ut aam ad pzz ; nec præter has positiones ulla alia excogitari queat, quâ linea LC talis, qualis in his omnibus casibus data fuit, obtineatur: sequitur, si in quæstione terminus $\frac{p}{m} xx$ signo $+$ denotatus fuerit, punctum quæsitum C cadere in Hyperbolam, cujus rectum latus ad transversum sive etiam transversum ad rectum, pro diversa terminorum ipsius LC constitutione, sit ut pzz ad aam , ac ejusdem positio, qualis jam ostensa fuit, existat.

Ubi denique notandum, quod, sicut punctum C in Hyperbolam cadere ostensum est, cujus vertex N vel O , id ipsum similiter in Hyperbola opposita pro libitu assumi possit, cujus vertex est Q , non autem indifferenter in 4^{or} ejusmodi sectionibus, quæ Conjugatæ vocantur, simul.

ccc

Quâ quidem ratione inde facile est invenire hanc Parabola per Problema I. primi libri Conicorum Apollonii.] Quod illis, quibus hi Apollonii libri, aut etiam aliorum, qui de Conicis scripserunt, non sunt ad manus, hæc in parte satisfaciat: lubet hoc loco adducere ea, quæ mihi olim circa hæc, dum me inter peregrinandum in hac Geometriæ methodo exercebam, exciderant, simili occasione ipse investiganda proposui ac inveni. Quod etiam iis in hac Methodo se oblectare cupientibus, ut proprio Marte propositiones invenire addiscant, inservire potest, prout iis, hisce tanquam exemplis, quibus ad alias quærendas & investigandas instigentur, prævero; ne ad universalem Matheos complexionem plura librorum volumina evolvere & propositiones in iis singulas excutere (quod plerisque summus est scopus) opus habeant; quin potius quo pacto illæ inventæ fuerint perpendant, novæque alias innumeras, quibus scientia hæc non parvum incrementum capere valeat, invenire moliantur.

Verum enimvero ut non solum pateat, quâ ratione illa, quæ hoc loco Autor ab Apollonio ostensa citavit, juxta Geometriæ suæ methodum inveniri possint; sed etiam illa, quæ ex ipso p. 29, 31, & 32 allegavit (quæ omnia, quod sciam, ea sunt, quæ ab eo ad Geometriam suam ex Apollonio præsupponuntur): non abs


re

re fuerit illa præfenti commentario simul comprehendere atque ad Autoris mentem sic explicata exhibere.

DE LOCIS SOLIDIS SIVE CONICARVM
SECTIONVM PROPRIETATIBVS.

Suppositiones.

1. **R**ectam lineam BA vel BC , quæ à vertice coni B ducitur ad basim AC circumferentiam, esse in superficie conica.
2. Sectionem KFL , basi coni AC parallelam, esse circulum.



De *PARABOLA*, quæ est sectio coni ABC per planum $GFEH$, in quâ linea ED , communis sectio trianguli per axem ABC & plani secantis $GFEH$, quæ & sectionis diameter dici consuevit, parallela est uni laterum AB, BC ejusdem trianguli, ut hîc ipsi BC ; lineâ GH , quæ Basis Sectionis $GFEH$ vocatur, ipsam AC , basin trianguli per axem, ad rectos angulos secante.

Esto

Esto $AB \propto a$
 $BC \propto b$ Fiat propter similitudinem $\Delta^{rum} ABC \& KEI$
 $AC \propto c$
 $EB \propto d$ ut BC ad CA , ita EI ad IK
 $EI \propto x$ $b \text{ — } c \text{ — } x$ / $\frac{cx}{b}$
 $FI \propto y$ Rursum fiat propter similitudinem
 $\Delta^{rum} ABC \& EBS$
 ut AB ad AC , ita EB ad ES seu IL
 $a \text{ — } c \text{ — } d$ / $\frac{cd}{a}$ } Mult.

 $\square FI$
 fit $\square KIL$. $\frac{ccd}{ab} x \propto yy$.

Hinc si fiat, ut a b ad c c , hoc est, ut $\square ABC$ ad $\square AC$, ita d , hoc est, EB , ad quartam, quæ sit EN : erit $EN \propto \frac{ccd}{ab}$. Quæ si brevitatis causâ nominetur r , habebitur $rx \propto yy$. Quod ipsum est, quod ab Apollonio est ostensum Theoremate 11^{mo} primi libri Conicorum, ubi docet, rectangulum quodlibet, sub rectâ EN seu r sic inventâ, & diametri segmento EI , quod inter verticem ejus E & ordinatim adplicatam FI intercipitur, comprehensum, esse æquale quadrato ejusdem ordinatim adplicate FI .

Ubi notandum, lineam hanc inventam EN seu r , ab Apollonio vocari Latus rectum Parabolæ, vel etiam Lineam, juxta quam possunt, quæ ad diametrum ED ordinatim adplicantur. à Mydorgio autem hæc linea Parameter appellatur. Quam porro lineam brevius obtinere licet, quàm hîc cum Apollonio ostendimus. Et enim lineâ E Sexistente $\propto \frac{c}{a}$, cum BC sit ad CA , hoc est, b ad c , sicut ES , hoc est, $\frac{cd}{a}$ ad $EN \propto \frac{ccd}{ab}$: inveniri poterit EN , quærendo tantum ipsis BC , CA , & ES quartam proportionalem. Quemadmodum ex ostensis est manifestum.


Hinc si fiat, ut $b b$ ad $a c$, hoc est, ut \square BM ad \square AMC, ita q , hoc est, DE, ad quartam, quæ sit EN: erit $EN \propto \frac{a c q}{b b}$. Ipsa autem brevitatis causâ nominetur r .

Deinde fiat rursus, ut $b b$ ad $a c$, hoc est, ut DE ad EN, ita x , hoc est, EI seu NQ ad QP $\propto \frac{a c x}{b b}$. Eritque $r x + QP$ in $x \propto y y$. Quod ipsum est, quod ab Apollonio est ostensum Theoremate duodecimo primi libri Conicorum, ubi docet, rectangulum quodvis, sub rectâ EN seu r sic inventâ, & diametri segmento EI seu x , quod inter ejus verticem E & ordinatim adplicitam FI interjicitur, comprehensum, unâ cum rectangulo NQP, quod sub eodem diametri segmento EI vel NQ, & lineâ QP, ad quam NQ eandem rationem habet, quam DE ad EN, continetur, quadrato ejusdem ordinatim adplicitæ FI esse æquale.

Ubi notandum, lineam DE ab Apollonio vocari Latus transversum Hyperbolæ, & lineam inventam EN Latus rectum, vel etiam Lineam, juxta quam possunt, quæ ad diametrum ER ordinatim adplicantur, à Mydorgio verò hæc ipsa Parameter appellatur. Quæ porro linea facilius obtineri potest, hoc modo; Ductâ scilicet ES ipsi AC parallēlâ, ac deinde ipsis BM, MA, & SE quærendo quartam proportionalem EN. Etenim cum BM sit ad MC, hoc est, b ad c , sicut DE, hoc est, q , ad ES: erit $ES \propto \frac{c q}{b}$. Unde cum præterea BM ad MA sit, hoc est, b ad a , sicut ES, hoc est, $\frac{c q}{b}$, ad quartam $\frac{a c q}{b b}$, quæ hic eadem est, quæ linea EN superiori modo inventa: manifestum est id, quod proponitur.

De ELLIPSI, quæ est sectio Coni ABC per planum GFEH, in quâ linea ER, communis sectio trianguli per axem ABC & plani secantis GFEH convenit cum utroque latere AB, BC ejusdem trianguli in E & D; lineâ GH, quæ basis sectionis GFEH vocatur, ipsam AC, basin trianguli per axem, eandemve productam, ad rectos angulos secante.

Esto $AM \propto a$
 $MB \propto b$
 $MC \propto c$
 $ED \propto q$
 $EI \propto x$, eritque $ID \propto q - x$
 $FI \propto y$.



Fiat propter similitudinem $\triangle^{rum} BCM \& DLI$
 ut BM ad MC , ita DI ad IL

Rursus fiat propter similitudinem $\triangle^{rum} ABM \& KEI$
 ut BM ad MA , ita EI ad IK

$$\left. \begin{array}{l} b - c - q - x \mid \frac{cq - cx}{b} \\ b - a - x \mid \frac{ax}{b} \end{array} \right\} \text{Mult.}$$

$\square FI$

fit $\square KIL. \frac{acqx - acxx}{bb} \propto yy$

Hinc si ut in Hyperbola fiat, ut bb ad ac , hoc est, ut $\square BM$
 ad $\square AMC$, ita q , hoc est, DE , ad quartam, quæ sit EN :
 erit $EN \propto \frac{acq}{bb}$. Ipsa autem brevitatis causâ nominetur r .

Deinde fiat rursus, ut bb ad ac , hoc est, ut DE ad EN , ita x ,
 hoc est, IE seu PO , ad $ON \propto \frac{acx}{bb}$. Eritque $rx - NO$ in $x \propto yy$.

D d 2

Quod

Quod ipsum est, quod ab Apollonio est ostensum Theoremate decimotertio primi libri Conicorum, Ubi docet, rectangulum quodvis, sub rectâ NE seu r sic inventâ, & diametri segmento EI seu x , quod inter ejus verticem E & ordinatim adplicatam FI interjicitur, comprehensum, minus rectangulo NOP, quod sub eodem diametri segmento EI vel OP, & lineâ NO, ad quam OP eandem rationem habet, quam DE ad EN, continetur, quadrato ejusdem ordinatim adplicatæ FI esse æquale.

Ubi notandum lineam ED, sectionis diametrum, ab Apollonio vocari Latus transversum ut & Diametrum transversam Ellipsis, & lineam inventam NE Latus rectum, vel etiam Lineam, juxta quam possunt, quæ ad diametrum ED ordinatim adplicantur, à Mydorgio autem hæc linea NE Parameter appellatur. Quæ porro linea, ut ante in Hyperbola, postquam linea ES ipsi AC ducta est parallela, brevius obtineri potest, si tantum ipsis BM, MA, & SE quærat quarta proportionalis: quandoquidem hæc semper eandem existit, quæ ipsa NE, inventa, ut supra. Sicut superius à nobis in Hyperbola est ostensum.

Ex his porro facilè liquet, quam inter se rationem habeant quadrata ordinatim adplicatarum ad diametrum in unaquaque harum trium sectionum. Etenim si in Parabolâ linea ED vocetur z , & ordinatim adplicata GD vocetur v , erit, ut supra,

$$\frac{cdz}{ab} \propto vv : \text{ac proinde } yy \text{ ad } vv, \text{ hoc est, } \square FI \text{ ad } \square GD, \text{ ut}$$

$\frac{cdx}{ab}$ ad $\frac{cdz}{ab}$, seu x ad z , hoc est, EI ad ED. Hoc est, in Parabolâ quadrata ordinatim adplicatarum FI, GD inter se sunt, sicut lineæ EI, ED, quæ ab ipsis ex diametro ED ad verticem E abscinduntur. Quod ipsum est, quod docet Apollonius Prop^{ne} 20^{ma} libri 1^{mi} Conicorum.

Vide fig.
2. & 3.

Eodem modo in Hyperbola & Ellipsi acceptâ pro EI aliâ magnitudine quàm ante, ut puta z , erit in Hyperbola $vv \propto \frac{acgz + acxz}{bb}$, & in Ellipsi $vv \propto \frac{acgz - acxz}{bb}$. Unde yy ad vv in Hyperbola fit, ut $\frac{acgx + acxx}{bb}$ ad $\frac{acgz + acxz}{bb}$, hoc est, ut $qx + xx$ ad $qz + zz$; at in Ellipsi, ut $\frac{acgx - acxx}{bb}$ ad $acgz -$

$\frac{acgz - acxz}{bb}$, hoc est, ut $gx - xx$ ad $gz - zz$. Hoc est, in Hyperbola & Ellipsi quadrata ordinatim adplicatarum inter se sunt, ut rectangula contenta lineis, quæ inter ipsas & vertices transversis lateris interjiciuntur. Denique, quia in Hyperbola $\square FI \propto \frac{acgx + acxz}{bb}$ est ad $\square EID \propto gx + xx$, ut ac ad bb ; similiterque in Ellipsi $\square FI \propto \frac{acgx - acxz}{bb}$ ad $\square EID \propto gx - xx$, ut ac ad bb , hoc est, ut NE ad ED : patet in utraq; figurâ quadrata ordinatim adplicatarum FI esse ad rectangula EID , quæ sub rectis EI , ID , inter FI & vertices transversis lateris E , D interceptis, comprehenduntur, ut figuræ rectum latus NE ad transversum ED . Omnino ut habet Prop^o 2 1^æ libri 1^æ Conicorum Apollonii. Eadem est ratio in Circulo, qui non nisi certa Ellipsis species censenda est, quippe in qua rectum latus & transversum sunt æqualia.

Ostensis igitur quo pacto Cono dato, eoque secto, ita ut sectio Parabola, Hyperbola, vel Ellipsis existat, sectionis sive figuræ hujus latera inveniri queant: restat ut è contra ostendamus, quâ viâ Conus inveniri possit, & in eo unaquæque trium harum figurarum exhiberi, cujus latera sint datis rectis lineis æqualia.

Ut ad inveniendum Conum ABC , in eoque sectionem vide $GFEH$, quæ Parabola appellatur, cujus latus rectum sit fig. 1. $\propto \frac{oz}{a}$, facio $\frac{ecd}{ab} \propto \frac{oz}{a}$ seu $\frac{boz}{ab}$, & sit rejecto ab , communi denominatore, $ecd \propto boz$. Hoc est, diviso utrobique per ec , erit $d \propto \frac{boz}{cc}$. Hinc assumpto triangulo quolibet ABC , cujus latera sint, $AB \propto a$, $BC \propto b$, & $AC \propto c$, si in ipso sumatur $EB \propto \frac{boz}{cc}$, atque ex E ducatur ED ipsi BC parallela: erit AC diameter circuli sive basis Coni, & ABC triangulum per axem. Ac proinde si per D in plano basis hujus Coni ipsi AC ad rectos angulos ducatur GH , atque per rectas GH , DE sectio instituitur, faciens in superficie Conica curvam lineam $GFEH$: erit hæc ipsa Parabola, cujus latus rectum NE sit datæ $\frac{oz}{a}$ æqualis, quemadmodum requirebatur. Quod si verò ipsa talis præterea exhiberi debeat, ut rectæ FI , quæ semper ipsi GH parallela: intelli-

guntur, in dato angulo ad diametrum E D adplicentur, opus tantum erit angulum G D E sive E D H dato æqualem efficere, intelligendo ad id circulum A G C H moveri circa A C, tanquam axem, eritque Problematis ex omni parte satisfactum.

Vide 2.

& 3. fig.

Similiter ad inveniendum Conum A B C, & in eo sectionem G F E H, quæ sit vel Hyperbola vel Ellipsis, cujus latus rectum

$$\text{sit} \propto \sqrt{\frac{00zz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}, \text{ \& transverſum} \propto \sqrt{\frac{aa00mm}{ppzz} + \frac{4aam^3}{pzz}}.$$

$$\text{facio} \frac{acq}{bb} \propto \sqrt{\frac{00zz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}, \text{ \& } q \propto \sqrt{\frac{aa00mm}{ppzz} + \frac{4aam^3}{pzz}}.$$

$$\text{Hoc est, assumptis horum quadratis, erit} \frac{aacqq}{b^2} \propto \frac{00zz + 4mpzz}{aa}.$$

$$\text{\& } qq \propto \frac{aa00mm + 4aam^3p}{ppzz}. \text{ Adeoque si in termino } \frac{aacqq}{b^2} \text{ pro}$$

$$qq \text{ hic numerus substituatur, habebitur } \frac{a^2ccoomm + 4a^2ccm^3p}{b^2ppzz} \propto$$

$$\frac{00zz + 4mpzz}{aa}. \text{ Hoc est, multiplicato per crucem, erit}$$

$$a^2ccoomm + 4a^2ccm^3p \propto b^200ppz^2 + 4b^2mp^3z^2: \text{ \& fit, si utrinque per } 00ppz^2 + 4mp^3z^2 \text{ dividatur,}$$

$$\frac{a^2ccoomm + 4a^2ccm^3p}{00ppz^2 + 4mp^3z^2} \text{ seu } \frac{a^2ccmm}{ppz^2} \propto b^2. \text{ Unde, extrahendo}$$

$$\text{utrobique radicem biquadratam, invenitur } \sqrt{\frac{a^2ccm}{ppz}} \propto b. \text{ Hinc}$$

assumptis ad libitum duabus lineis A M & M C, iisque in directum seu in unam lineam positis, quarum major A M sit $\propto a$, &

minor M C $\propto c$, duco ex M in angulo quocunque rectam M B

$$\propto \sqrt{\frac{a^2cm}{ppz}}, \text{ jungoque B A \& B C; ita ut habeatur triangulum}$$

per axem A B C, cujus basis A C diametrum circuli referat, qui

Coni basis existit, & punctum B verticem ipsius Coni. Deinde

productâ B C, ad Hyperbolam obtinendam, inter angulum A B D

$$\text{pro utrâque figurâ aptanda erit recta E D} \propto \sqrt{\frac{aa00mm}{ppzz} + \frac{4aam^3}{pzz}};$$

ita ut ipsa parallela sit lineæ B M, (quod facile est,) continuataque

occurrat rectæ A M in R. Quibus sic positis, si per R in plano

basis hujus Coni ipsi A M ad rectos angulos ducatur G H, atque

per rectas G H, R E sectio instituat, faciens in superficie conica

curvam lineam F E: erit hæc ipsa Hyperbola vel Ellipsis quæſita,

$$\text{hoc est, cujus rectum latus est} \propto \sqrt{\frac{00zz}{aa} + \frac{4mpzz}{aa}}, \text{ \& transverſum}$$

sum $\propto \sqrt{\frac{aaem}{ppxz} + \frac{4aam^2}{pxz}}$. Quòd si verò insuper tales exhibendæ sint, ut rectæ FI, quæ semper ipsi GH parallelæ intelliguntur, in dato angulo ad diametrum ER adplicentur, oportet tantum (ut ante in Parabola) angulum GRE sive ERH dato æqualem efficere, intelligendo ad id planum basis hujus Coni esse mobile circa AM, tanquam axem: eruntque sic conditiones quæstionis omnes adimpletæ, ita ut his primo, secundo, & tertio Problematis primi libri Conicorum Apollonii satisfactum putem. Quorum quidem omnium veritas ex præcedentibus fit manifesta.

Eodem modo reliquos casus Ellipseos & Hyperbolæ, in quibus latera recta & transversa alias quantitates ab his diversas sortiuntur, qualesque eas in antecedentibus determinare docuimus, persequi licet.

Denique ut appareat, quâ ratione Propositiones de Hyperbolæ Asymptotis agentes, de quibus Apollonius secundo atque sequentibus Conicorum libris multas egregias proprietates demonstravit, inventæ fuerint; sequentia protulisse juvabit.

Sit A M ∞ μ


MB 306

$$M C \propto c$$
$$DE \propto q$$
 $E \propto x$

F I ∞,

$$E R \propto z, \text{ eritque } D R \propto q + z.$$
$$GR \propto v$$
$$E \propto f$$

$X_M \propto t$, critique $X_C \propto t - \epsilon$.



Mult. X A. $t + a$

per X C. $t = c$
$$-tC-A$$

Ad □ X M. t t

add. ☐ C M A feu ☐ M V. ac
$$tt + ta$$
 $\square C X \bar{A}$

per 47. 1^{mi} $\square XV. it + ac \propto it + ta - tc - ac.$ per 36. 3rd
Elem. Elem.

$$2AC \propto tA - tC$$

XM. $\frac{2ac}{a-c} \infty$

Fiat

Fiat propter similitudinem \triangle^{nm} BMA & ERA
ut BM ad MA, ita ER ad RA

$$b \text{ — } a \text{ — } z \quad / \quad \frac{az}{b}$$

Rurfus fiat propter similitudinem \triangle^{nm}
BMC & DRC

ut BM ad MC, ita DR ad RC

$$b \text{ — } c \text{ — } q+z \quad / \quad \frac{cq+cz}{b}$$

} add.

$$CA. \frac{az+cz+cq}{b} \propto a+c$$

$$az+cz+cq \propto ab+cb$$

$$az+cz \propto ab+cb-cq$$

$$z \propto \frac{ab+cb-cq}{a+c}$$

$$\text{Ad R C. } \frac{cq+cz}{b}$$

$$\text{adde X C. } z-c$$

Fiat propter similitudinem
 \triangle^{nm} XMB & XRA.

XM MB

RA

$$z \text{ — } b \text{ — } XR. \frac{cq+cz+bt-bc}{b} \quad / \quad \text{ad } f+z$$

Eritque, per 16. $zf+tz \propto cq+cz+bt-bc$

6^o Elem.

$$zf+tz-bt \propto cq+cz-bc$$

$$z \propto \frac{cq+cz-bc}{f+z-b} \propto \frac{zac}{a-c}$$

$$aq+az-ab-cq-cz+cb \propto 2af+2az-2ab$$

$$ab+cb+aq-cq-cz \propto 2af+2az$$

$$\frac{ab+cb-cq}{a+c} \propto \frac{ab+cb+aq-cq-2af}{a+c} \propto z$$

$$ab+cb-cq \propto ab+cb+aq-cq-2af$$

$$2af \propto aq.$$

fit $aE \propto f \propto \frac{1}{2}q$. Id quod ostendit, rectas, quæ oppositarum sectionum Asymptotæ dicuntur, in medio transversæ lateris DE se invicem decussare. Ubi etiam patet, angulos, quos comprehendunt, angulo verticis trianguli TBV, cui planum harum sectionum æquidistat, esse æquales.

E c

Fiat


Fiat propter similitudinem $\triangle^{nm} BMV \& eRY$

$\square BM \square MV$ $bb \rightarrow ac$	}	$\square aE$ $\frac{1}{2}qq$ $\square aI$ $\frac{1}{2}qq + qx + xx$ $\square aR$ $\frac{1}{2}qq + qz + zz$	}	ad	$\square Eb$ $\frac{1}{2}\frac{acqq}{bb}$ $\square Id$ $\frac{1}{2}\frac{acqq + acqx + acxx}{bb}$. A quo sub- ducto $\square^{to} IF$ ante invento, ∞ $\frac{acqx + acxx}{bb}$, relinquetur, per 5. 2^{di} Elem., $\square eFd \infty \frac{1}{2}\frac{acqq}{bb}$. $\square RY$ $\frac{1}{2}\frac{acqq + acqx + acxx}{bb}$. A quo sub- ducto $\square^{to} RG$, ante invento, ∞ $\frac{acqx + acxx}{bb}$, relinquetur, per 5. 2^{di} Elem., $\square ZGY \infty \frac{1}{2}\frac{acqq}{bb}$.
--	---	---	---	------	--

Jam cum $\square Eb$, $\square eFd$, & $\square ZGY$ singula sint inventa $\infty \frac{1}{2}\frac{acqq}{bb}$, constat ipsa inter se esse æqualia. Eadem est ratio de quibuscunque aliis hujusmodi rectangulis, in infinitum assumptis. Quod ipsum est, quod docet Prop^o 10. 2^{di} libri Conicorum Apollonii.

Porro, quoniam $\frac{1}{2}\frac{acqq}{bb}$ est $\frac{1}{2}$ pars rectanguli sub latere transverso $DE \infty q$ & latere recto NE , ante invento, $\infty \frac{acq}{bb}$, manifesta hinc etiam est Prop^o 1^{ma} ejusdem libri.

Præterea supponatur e vel $E b \propto e$



$e F \propto f$, eritque

$$F d \propto \frac{e}{f}$$

$g E \propto g$

$E F \propto b$

$E h \propto i$, eritque

$E b \propto b + s$

$E i \propto k$

$a i \propto l$

$F k \propto m$

& $a k \propto n$, eritque

$$i k \propto n - l$$

Tum fiat propter similitudinem $\Delta^{lorum} e g E$ & $e g F$

ut $g E$ ad $E e$, ita $g F$ ad $F e$

$$\frac{g}{e} = \frac{g + h}{f}$$

Eritque per 15. 6^o Elem. $g f \propto e g + e h$

$$g f - g e \propto e h$$

Rursum fiat propter similitudinem $\Delta^{lorum} F d h$ & $E b h$.

ut $F h$ ad $F d$, ita $E b$ ad $E b$

$$i = \frac{e}{f} = h + i / e$$

Eritque per 16. 6^o Elem. $i \propto \frac{e h + e i}{f}$

$$f i \propto e h + e i$$

$$\text{Et fit } g f - g e \propto f i - e i \propto e h$$

Id est, dividendo utrinque per $f - e$, erit $g \propto i$. Hoc est, $g E$ est æqualis $F h$. Eadem est ratio de recta $E F$, quomodocunque per duo quælibet alia puncta in Hyperbolâ ducta, & utrinque Asymptotis terminata. Id quod cum octava convenit Propositione secundilibrî Conicorum Apollonii.

Ad hæc fiat propter parallelas $E i$ & $F k$

ut $g E$ ad $E F$, ita $a i$ ad $i k$

$$\frac{g}{e} = \frac{h}{l} = \frac{l}{n - l}$$

Eritque per 16. 6^o Elem. $g n - g l \propto h l$

Hoc est, in locum g substituto i , habebitur $i n - i l \propto h l$, & fit $h \propto \frac{i n - i l}{l}$.

i^2

E e 2

Deni-

Denique fiat propter similitudinem $\Delta^{locum} Eib$ & Fkb
 ut Ei ad Eb , ita Fk ad Fb

$$k \text{ --- } b + i \text{ --- } m / i$$

Eritque per 16. 6^{ta} Elem. $ki \propto hm + im$

$$\text{vel } k \text{ --- } m i \propto hm$$

$$\& \text{ fit } b \propto \frac{ki - mi}{m} \propto \frac{in - il}{l}$$


$$\frac{kl - ml \propto mn - ml}{kl - ml \propto mn - ml}$$

& $kl \propto mn$. Hoc est, rectangulum

sub Ei & ia est æquale rectangulo sub Fk & ka .
 Id quod eodem modo de omnibus aliis rectangu-
 lis, sub similibus lineis comprehensis, manife-
 stum est; prout nimirum ad hoc præter puncta
 E & F alia quævis in Hyperbola assumpta fuerint.
 Quibus haud dissimilia sunt ea, quæ Apollonius
 demonstravit Prop^{ne} 12^{ma} libri 2^{di} Conicorum.

Unde demum facile est inferre, cum puncta hæc ulterius at-
 que ulterius semper in Hyperbola assumi possint, ac inde uno la-
 tere horum rectangulorum continuè accrescente latius alterum
 ipsorum perpetuò decrescat; quod idcirco Asymptoti ab , ac , &
 Hyperbola EF in infinitum productæ ad se ipsas propius acce-
 dant, & ad intervallum perveniant, minus quolibet dato inter-
 vallo. Quibus & illa quadrant, quæ ab Apollonio Prop^{bus} 1^{ma} &
 14^a ejusdem libri sunt ostensa.

Cæterum quoniam D^{ms} des Cartes universim iis tantum pro-
 positionibus usus fuisse videtur, quæ non nisi proprietates decla-
 rant, quæ cum subjecto suo omnimodè reciprocantur, & à Logi-
 cis proprietates 4^{ti} modi appellari solent: visum fuit hoc loco
 deinceps modum, quo cognosci possunt, qualem cum eruditissi-
 mus atque ingeniosissimus Vir-Juvenis D. Johannes Hudde-
 nius, Amstelodamensis, Gerh. fil. excogitavit, per unum aut al-
 terum exemplum exponere.



Ut ad inquirendum, utrum proprietas circuli, quæ declarat, quadrata ordinatim adplicatarum ad diametrum esse æqualia rectangulis sub segmentis diametri, cum circulo sit reciproca nec ne: supponatur recta AB , & in eam perpendicularis CD , hanc habens proprietatem, ut quadratum super ipsâ sit æquale rectangulo sub segmentis AC , CB . Quæritur qualis sit linea ADB .

Ad quod investigandum, sectâ AB bifariam in E , ponatur AE vel $EB \propto a$, $CE \propto x$, & $CD \propto y$: eritque $AC \propto a - x$, & $CB \propto a + x$. Jam cum AC multiplicatâ per CB proveniat $aa - xx$, pro rectangulo ACB ; hocque ex data proprietate æquetur quadrato ex CD : erit $aa - xx \propto yy$. Deinde, quoniam, lineâ CD perpendiculari existente super AB , quadratum ex ED , per 47 Primi Elementorum Euclidis, est æquale duobus quadratis ex EC & CD : erit quadratum ex $ED \propto xx + yy$. Ac proinde si in hac summa pro yy subrogetur $aa - xx$, habebitur quadratum ex $ED \propto aa$, hoc est, $ED \propto a$. Id quod ostendit, rectis AE , ED , & EB singulis ipsi a æqualibus existentibus, lineam ADB esse circum, cujus centrum E , ac idcirco proprietatem allegatam cum circulo esse reciprocam. Quod ipsum & hoc modo cognosci potest. Advertendo scilicet, utrum proprietas proposita lineæ necessariâ subjecti inclusione demonstrari possit nec ne. Si enim ea absque necessaria subjecti inclusione demonstrari nequeat, proprietas erit reciproca; sin secus, proprietas communis.



Ut ad intelligendum, num proprietas hæc cum triangulo rectangulo sit reciproca, nimirum: tres angulos simul sumptos æquales esse duobus rectis: advertendum tantummodo est, utrum demonstratio illius triangulum rectangulum præsupponat nec ne; ac proinde cum ipsa absque ulla discretione in quolibet triangulo locum obtineat, concludendum

Ec 3.

est.

est eandem non nisi pro communi trianguli rectanguli proprietate esse habendam.

Ita etiam considerando demonstrationem supradictæ proprietatis circuli, quoniam ipsa radiorum æqualitatem, in quâ circuli natura consistit, omnino exposcit, convincitur eandem proprietatem soli circulo competere ac cum eodem reciprocari.

Similiter, si quis naturam demonstrationis perpendat, quâ ostenditur, quadrata ordinatim applicatarum inter se esse, sicut rectangula sub segmentis diametri: comperietur, eandem demonstrationem radiorum æqualitatem non includere, adeoque proprietatem hanc non nisi communem proprietatem circuli existere: quandoquidem & Ellipsi, cujus Circulus non nisi speciem refert, omnino convenit.

Sed & usum horum perpendere, cum in universa Mathesi haud exigui sit momenti, non inutile fuerit sequentia, quibus eundem quadrantenus indicasse existimamus, in medium asferre.

Primo itaque, postquam in quærenda æquatione proprietates reciproca adhibita fuit, ceru sumus totam subjecti naturam hæc ratione in ea esse inclusam; adeoque, ad aliam adhuc æquationem à præcedenti diversam obtinendam, non licere ut ad id alia ejusdem subjecti proprietates adhibeatur, nisi accedat aliquid, quod in præcedenti æquatione nondum sit involutum: quandoquidem sic circulum committi manifestum est.

2^{do}, Theoremata omnia, quæ necessitatem subjecti inferunt ex proprietate jam ostensâ, (ut, verbi gratiâ, Prop. 48. primi libri Elementorum) quæque ut plurimum indirectè per deductionem ad absurdum demonstrari solent, possunt directè demonstrari, dummodo ostendatur, proprietatem illam cum subjecto suo esse reciprocam.

3^{to}, Si quis ad solvenda Problemata naturam subjecti retinere velit, commodissimè id præstare poterit, retinendo tantum proprietatem aliquam, cum eodem subjecto reciprocam, quæ aut omnium facillimè memoriæ mandari queat aut etiam simplicissima existat: cum minimè necessum sit, ut is retinendis omnibus illius Theorematis aggravetur, quippe quæ omnia Geometrix hujus Methodo certâ arte ex hujusmodi proprietate deducuntur.

4^{to}, Hinc etiam perspicuum est, quàm parum necesse sit, libros, qui Theorematis referti sint, conscribere, quæ aut usum nul-

lum

Iam habent, aut difficulter retineri possunt, aut etiam beneficio alicujus facilioris sive simplicioris proprietatis reciproca è natura subiecti sui nullo negotio cruuntur.

Nimirum silatus hocce rectum statuatur $\sqrt{\frac{0022}{aa} + \frac{4mp22}{aa}}$, D

transversum erit $\sqrt{\frac{aa00mm}{pp22} + \frac{4aam^2}{p22}}$.] Qui termini hoc

etiam pacto scribi possunt $\frac{2}{a}\sqrt{00+4mp}$, & $\frac{a}{p}\sqrt{00+4mp}$, quemadmodum postea in demonstratione pag. 33 à Domino des Cartes sunt assumpti. Similiter, si habeatur, ut paulò superius,

$\sqrt{\frac{0022}{aa} - \frac{4mp22}{aa}}$: poterit ejus loco scribi $\frac{2}{a}\sqrt{00-4mp}$. Eo-

dem modo cùm habetur $\sqrt{\frac{4a2mm^2}{pp22} - \frac{a^200mm^2}{p22}}$ (ut paulò post pa-

gin. 31): possumus ejus loco scribere $\frac{aam}{p22}\sqrt{4mm - \frac{400m}{p}}$, tol-

lendo scilicet ex signo radicali quicquid est rationale. Haud secus

fit, cùm pro $\sqrt{\frac{3aa}{66}}$ scribitur $\frac{a}{6}\sqrt{3}$. Quæ scribendi ratio non

ineptè quoque ad radicem commensurabilium species sive opera-

tiones adhiberi potest. Ut, ad addendum $\sqrt{27}$ ad $\sqrt{75}$: quoniam

$3\sqrt{3}$ idem est quod $\sqrt{27}$, & $5\sqrt{3}$ idem quod $\sqrt{75}$, hinc sum-

ma earum erit $8\sqrt{3}$, & differentia $2\sqrt{3}$, productum verò mul-

tiplicationis $15, 3$ seu 45 ; & quotiens ex divisione majoris per mi-

nozem $\frac{2}{3}$ seu $1\frac{1}{3}$. Sic ad multiplicandum $\frac{8}{27\sqrt{3}}$ per $3\sqrt{3}$, divido

$27\sqrt{3}$ per $3\sqrt{3}$, seu, quod idem est, 27 per 3 , & fit productum $\frac{8}{3}$.

Similiter ad dividendum fractiones $\frac{2}{3}, 1$, & $\frac{1}{3}$ per $\sqrt{3}$, multiplico

earum denominatores per $\sqrt{3}$, & sunt quotientes $\frac{2}{3\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}$, &

$\frac{4}{3\sqrt{3}}$ seu $\frac{2}{3}\sqrt{3}, \frac{1}{3}\sqrt{3}$, & $\frac{4}{3}\sqrt{3}$, perinde enim est sive hoc sive illo

modo scribantur. Idem de sequentibus formulis, quas hîc sub-

jungere visum fuit, intellige. Ut si habeatur \sqrt{ac} , ejus loco scri-

bere possumus $a\sqrt{\frac{c}{a}}$, vel $c\sqrt{\frac{a}{c}}$. Et si habeatur $\frac{ab}{\sqrt{ac}}$ scribi ejus

loco potest $b\sqrt{\frac{a}{c}}$; adeò ut, si habeatur $\frac{acc+aa}{2\sqrt{aa+cc}}$, ejus loco sub-

stitui possit $\frac{a}{2}\sqrt{aa+cc}$. Ita pro $b\sqrt{\frac{ac}{bb}}$ ponere licet \sqrt{ac} , nec

non

Vide pag. 75. lin. permult. & ult.

Vide pag. 76. lin. 7.

Vide pag. 82. lin. 18

non pro $2b\sqrt{\frac{ebb}{a}}$ reponere $\frac{abb}{a}\sqrt{ac}$. Similiter pro $d + \frac{bb-bd}{b+d}$ scribi potest $\frac{dd+bb}{b+d}$. Sic etiam loco $d + \frac{bb}{b+d}$ scribi potest $b + \frac{dd}{b+d}$: cum sub eodem denominatore reducti faciant $\frac{bb+bd+dd}{b+d}$. Et denique pro $\frac{c}{\sqrt{c}} - \frac{a}{\sqrt{a}}$ scribere possumus $\frac{c-a}{\sqrt{c}+\sqrt{a}}$ vel $\sqrt{c} - \sqrt{a}$. Et sic de aliis, ut passim in hisce commentariis est videre.

E *Sed si sectione Hyperbolæ existente &c.*] Notandum hic, applicatam esse Hyperbolam ei linearum positioni, cui postea Circulus quadrare ab Authore ostenditur. Quod tam perspicuitatis quàm brevitatis studio factum; quandoquidem ea, cum literæ A, B, C, D, &c. in iisdem omnium figurarum locis reperiuntur, quæ ibidem scripsit, sic facilius intelligi possunt, quàm si nunc in uno, nunc in alio essent quærendæ.

Etenim cum requiritur, ut productum, quod oritur ex multiplicatione CB per CF, æquale sit ei, quod fit ex ductu CD in CH, oportet lineam illam curvam transire per quatuor intersectionum puncta datarum linearum: nimirum, per intersectionem A, linearum DA, AB (quoniam eo casu lineæ BC & CD nullæ sunt, ac proinde singulæ, in singulas ex reliquis ductæ, nihil producant), & per intersectionem G linearum AB, GH, (quo casu lineæ CH & CB nullæ sunt): nec non per utramque reliquam, utpote ipsarum FE, GH (quo casu CF & CH nullæ sunt), & ipsarum DA, EF (quo casu CD & CF nullæ sunt), quæ in hac figura non sunt expressæ, sed in Circulo observatæ apparent. Unde, cum D^{mus} des Cartes, brevitati studens, referre voluerit casus omnes ad unum exemplum, figuræ nempe pag. 12. mirum videri non debet, quodd, postquam hujus exempli locum Circulus esse ostendit, nec in quæstione quicquam mutavit, eidem linearum positioni non Hyperbola sicut Circulus responderit. Nec etiam hinc ullus sequitur error, quandoquidem tota quæstio nondum determinata existit, sed pagin. 33 primò determinatur. Quippe fieri potest, ut, paucis in ea mutatis, eidem linearum positioni, cui Circulus competit, quadret Hyperbola; & quidem Hyperbola, quæ non transeat per ulla datarum linearum intersection-

sectiones. Ut, exempli causâ; si rectangulum ex FC in CD debeat esse majus, quàm rectangulum ex CB in CH , datâ quâdam quantitate, vel aliud quid simile: sequitur eam sic applicari posse, ut, manentibus literis I, K, L, B, C, D , &c. suis locis, ea pauca, quæ de Hyperbola asserre voluit, faciliùs intèlligantur, quàm si figura mutata fuisset.

Ejusdem brevitatis studio nulla etiam hîc mentio fit oppositarum Hyperbolarum, non quòd ab Authore ignorentur, utpote qui paulò post pag. 37. quatuor lineas Hyperbolæ affines, inter se oppositas, exhibuit: Sed quòd faciliora ferè semper in hac Geometria neglexerit. In difficilioribus certè, quæ tractanda suscepit, nihil omisit. Atque idcirco hîc maluit eam linearum positionem exhibere, cui conveniret Circulus, quàm cui competeret Ellipsis, aut Hyperbola, quia ejus inventio peculiarem habet difficultatem.

Quippe hæc loca nihil aliud sunt, quàm cum in quæstione aliqua est inveniendum punctum, in quâ una deficit conditio, ut ipsa prorsus sit determinata.] Nimirum, ubi ad inveniendum illud punctum duas supponere oportet lineas incognitas, & materia tantum pro una æquatione suppetit. Ut in hoc exemplo, ubi ad determinandum punctum C , duz supponendæ sunt incognitæ lineæ AB & BC ; quarum una ostendat, ad quod punctum lineæ AB duci debeat recta BC in dato angulo; & altera, ubinam illud ipsum in eadem recta sit sumendum. Ubi porrò, postquam conditiones omnes sunt adimpletæ, inventa est æquatio

$$yy \infty \frac{-dekkz - cfszlx}{+cfszlx} y - \frac{-dekkz - cfszlx}{+bcfszlx} y - \frac{-dekkz - cfszlx}{+bcfszlx} y, \text{ duas continens quanti-}$$

$$\frac{cx^2 - cgsz}{cx^2 - cgsz}$$

tates incognitas x & y . Adedò ut, cum in ipsâ una defit conditio ut sit prorsus determinata, quantitatem aliquam cognitam pro arbitrio assumere liceat pro incognita x , cui non respondet aliqua æquatio, atque tot inde invenire puncta C , quot ipsi radici x tribuerimus diversos valores.

Cæterùm quoniam hæc quæstio extendi potest ad omnes lineas curvas, quæ sub calculum cadunt, atque in Geometriam recipi possunt: ita ut nulla sit linea curva primi generis, quæ ad illam non sit utilis, quando in quatuor lineis proponitur: nec ulla



Ff

scun-

secundi, quando in 8 lineis: nec ulla tertiū, quando in 12 lineis est proposita, atque ita porro: placuit hīc quoque subungere casum, quando in duabus tantum lineis est proposita, qui quidem omnium simplicissimus existit.

*Locus ad
duas li-
neas.*

Datis positione duabus rectis lineis AB , CD , inter se parallelis, aut concurrentibus in puncto D ; punctum extra ipsas invenire, ut E , à quo si in datis angulis F & G ad positione datas AB , CD , duæ ducantur rectæ lineæ EH , EC , ipsæ datam inter se habeant rationem r ad s .



Supponantur anguli $B A I$, $D C B$ æquales angulis F , G ; & con-

concurrant rectæ AI, CB, (ubique hosce æquales angulos ad positionem datas constituentes) in punctum I. Deinde ratio, quam HE ad EC servare debet, detur ut A I ad K, vel si non ita detur, ad hanc formam reducat.

Resolutio. Puta factum esse, quod quaeritur, ponaturque $BC \propto q$, $AI \propto r$, $K \propto f$, $BI \propto t$, & $BE \propto x$. Unde, cum propter triangulorum BIA, BEH similitudinem, BI sit ad IA, hoc est, t ad r , sicut BE seu x ad EH, erit $EH \propto \frac{rx}{t}$. Deinde quoniam AI est ad

K, hoc est, r ad f , sicut HE ad EC, sive $\frac{rx}{t}$ ad $q + x$: erit productum sub extremis $rq + rx$, æquale producto sub mediis $\frac{rx^2}{t}$.


Ac proinde si utrinque dividatur per r , atque multiplicetur per t , æquatio erit $fx - tx \propto tq$. Hoc est, revocatâ æqualitate ad proportionem, erit ut $f - t$ ad t , ita q ad x . Unde talis emergit *Constructio*. Fiat, ut excessus, quo K excedit BI, ad BI; ita BC ad BE. Tum per E ducatur E d ipsi AB seu CD parallela (ut in prima fig.); aut ex D per E agatur recta DE indefinîtè (ut in secunda fig.): Dico si ex quolibet ejus puncto, ut e , ad positionem datas A, B, C, D, dux ducantur rectæ lineæ eb , ec in datis angulis F & G, hoc est, ipsis AI, IC parallelæ, dictas lineas datam inter se rationem servaturas, hoc est, b e fore ad c , sicut AI ad K, seu r ad f .

Demonstratio. Quoniam enim est, ut excessus, quo K excedit BI, ad BI, ita BC ad BE: erit quoque componendo K ad BI, sicut CE ad EB. Unde cum ratio CE ad EB composita sit ex ratione CE ad EH, & ex ratione HE ad EB seu AI ad IB: erit quoque ratio K ad BI ex eisdem rationibus composita. Eodem modo, quoniam item ratio K ad BI componitur ex ratione K ad AI, & ex ratione AI ad IB: erit ratio composita ex ratione CE ad EH, & ex ratione AI ad IB, eadem cum ratione, quæ componitur ex K ad AI, & ex AI ad IB. Quare si communis auferatur ratio AI ad IB, erit quoque reliqua ratio CE ad EH eadem reliquæ rationi K ad AI, seu f ad r . Quod erat faciendum. Eadem est ratio ubique tandem in recta DE punctum e assumatur. Unde manifestum sit, punctum quaesitum e rectam lineam contingere DE, positione datam, ac proinde in loco plano esse. Omitto reliquos hujus quaestionis casus, cum à quovis ad horum imitationem facile construi possint.

G. *At verò duabus conditionibus deficientibus ad hujus puncti determinationem, locus, in quo illud reperitur, superficies est, quæ similiter aut plana, aut Sphærica, aut magis composita esse potest.]* Quæ verba, ut rectè intelligantur, exemplis sequentibus illustrare conabimur.

Locus ad
Superficiem.

Dato triangulo æquilatelo ABC, à cujus vertice B ad basin AC demissa sit perpendicularis BD: oporteat intra ipsum invenire punctum, ut E, à quo si ad opposita latera deducantur perpendiculares EF, EG, & EH, ipsæ simul sumptæ æquantur perpendiculari BD.



Factum jam sit, & producta FE, usque dum secet latus AB in I, BC verò productum in K; ponatur AD seu DC $\propto a$, DB $\propto b$, AF $\propto x$, & FE $\propto y$. Hinc cum similia sint triacula AD B, & AFI, erit licut AD ad DB, hoc est, a ad b , ita AF seu x ad FI; quæ ideo erit $\frac{bx}{a}$. E qua si auferatur FE $\propto y$, relin-

quetur EI $\propto \frac{bx}{a} - y$. Similiter, quoniam similia sunt triacula CDB & CFK, erit CD ad DB, hoc est, a ad b , ut CF seu z ad FK; quæ ideo erit $z b - \frac{bx}{a}$. E qua si auferatur FE $\propto y$, restabit EK $\propto z b - \frac{bx}{a} - y$. Eodem modo cum, propter similitudinem triangulorum ADB, EGI, AB sit ad AD, hoc est, z ad a , seu z ad 1 , sicut IE seu $\frac{bx}{a} - y$ ad EG; erit EG $\propto \frac{bx}{a} - \frac{1}{z} y$. Non secus, cum similia sint triacula EKH & DBC, erit ut BC ad CD, hoc est, z ad a , seu z ad 1 , ita EK seu $z b - \frac{bx}{a} - y$ ad EH; quæ ideo erit

erit $b - \frac{bx}{2a} = \frac{1}{2}y$. Adeoque si addantur perpendiculares inventæ EF, EG, & EH, erit earum summa b , æqualis b , perpendiculari trianguli ABC.

Ubi patet, quòd, postquam incidimus in æquationem, in qua ab utraque parte reperitur eadem quantitas, quæstio proposita non sit Problema, sed Theorema; seu quòd conditio, ex qua hæc æquatio deducta fuit, in quæstionis datis sit comprehensa, neque unquam sine hac conditione esse possit: Atque adeò, duas in ea conditiones desiderari, ad dicti puncti determinationem; unam, ad æquationem pro x inveniendam, quâ innotescat, ad quod punctum lineæ AC duci debet perpendicularis EF; atque alteram, ad æquationem pro y inveniendam, quâ cognoscatur, ubinam illud ipsum in hac perpendiculari sit sumendum: quibus mediantibus quæstio penitus determinata reddatur. Quare, *vide ea, postquam conditiones in quæstione præstandæ executæ sunt, & quæ habentur pag. 4.* neutri linearum incognitarum AF, FE æquatio respondet, poterunt illæ ad arbitrium accipi, atque idcirco quæsitum punctum E ubique intra triangulum ABC assumi. Cujus demonstratio facilis est.

Ducantur enim rectæ AE, EB, & EC, ut constituentur tria triangula AEC, AEB, & BEC.


Quoniam igitur horum triangulorum bases sunt æquales, ac quælibet ex ipsis æqualis basi trianguli ABC; habebunt ipsa ad triangulum ABC eandem rationem, quam perpendiculara FE, EG, & EH. Quare cum triangula AEC, AEB, & BEC simul sumpta ipsi triangulo ABC sint æqualia: erunt quoque perpendiculares EF, EG, & EH simul sumptæ ipsi perpendiculari BD æquales. Quod erat demonstrandum.

Porro notandum est, quòd, quemadmodum punctum E, intra triangulum ABC assumptum, exhibet semper eandem summam perpendicularium EF, EG & EH, quæ ab eo ad trianguli latera deducuntur, & æqualem perpendiculari BD, ita contra, si sumatur extra triangulum ABC, atque ab eo ad singula ejus latera, si opus est, producta perpendiculares demittantur, obtineatur semper eadem perpendicularium differentia, quæ rursus perpendiculari BD sit æqualis. Oportet autem perpendicularem, quæ ducitur in latus subtensum angulo, intra quem punctum sumptum

ff 3 erit,

erit, auferre ex summa duarum reliquarum. Quæ simili ratione aliis quoque figuris rectilineis ordinatis competunt, cum eadem in omnibus sit demonstratio.

Alterum exemplum, quod hîc afferendum duxi, desumpsi ex inventis Nobilissimi & præclari Juvenis D. Christiani Hugonii, quibus sibi jam pridem apud Doctos tantam paravit laudem atque admirationem, ut non nisi magna quæque ab eo expectanda esse affirmare non veriti fuerint.



Dato Circulo A G B, dataque positione diametro A B: invenire extra ipsam punctum E, à quo si ad A B demittatur perpendicularis E D, & per idem punctum agatur recta quædam linea F G utrinque à circumferentiâ terminatâ, ut rectangulum F E G, sub segmentis ejus F E, E G comprehensum, unâ cum quadrato perpendicularis demissæ E D, æquetur rectangulo A D B, sub segmentis diametri A D, D B.

Ductâ per E rectâ K I parallêlâ ipsi A B, deducatur ex centro C in eam perpendicularis C H, jungaturque C I. Positâ igitur A C vel C B $\propto a$, C D $\propto x$, & D E $\propto y$: erit H I $\propto \sqrt{aa - yy}$, E I $\propto \sqrt{aa - yy} + x$, & E K $\propto \sqrt{aa - yy} - x$. Unde si multiplicaverit E K $\propto \sqrt{aa - yy} - x$ per E I $\propto \sqrt{aa - yy} + x$, fiet
rectan-

rectangulum KEI seu FEG $\infty aa - yy - xx$. Cui si addatur ^{35 Tertij}
quadratum ex ED ∞yy , erit summa $aa - xx \infty aa - xx$, re- ^{Elem.}
ctangulo ADB, utpote æqualis ei, quod fit ex $a - x$ in $a + x$.

Quia igitur hic utrinque eadem reperiuntur quantitates, & adimpletis omnibus conditionibus nulla amplius inveniri potest æquatio, quâ innotescat utraque incognita quantitas x & y : liquet eas ad arbitrium sumi posse, atque Problema propositum esse Theorema. Defectus itaque duarum in hac quæstione conditionum, ad determinandum punctum E, ostendit, illud ubique extra diametrum, intra circulum cadere posse, & locum ejus esse ad superficiem Circuli. Id quod faciliè demonstrari potest.

Quoniam enim CH perpendicularis est ad KI, secabit rectam KI bifariam in H. Unde cum in E quoque inæqualiter sit secta, erit rectangulum KEI, sub inæqualibus segmentis comprehensum, seu, quod idem est rectangulum FEG, unâ cum quadrato segmenti intermedii EH, æquale quadrato dimidiæ lineæ HI. Eodem modo, quoniam recta AB bifariam divisa est in C, & non bifariam in D: erit rectangulum ADB unâ cum quadrato intersegmenti DC, æquale quadrato ex CB seu CI. Quare cum quadratum CI æquetur quoque quadratis CH, HI, quorum quidem quadratum HI æquale est ostensum rectangulo FEG, unâ cum quadrato EH: sequitur rectangulum ADB unâ cum quadrato DC seu EH æquari rectangulo FEG unâ cum duobus quadratis CH, EH. Ac proinde, dempto communi quadrato EH, remanebit rectangulum ADB æquale rectangulo FEG, unâ cum quadrato CH seu ED. Quod erat demonstrandum. Non secus demonstrabitur, omne aliud punctum, intra Circulum extra diametrum AB assumptum, præstare id quod quæritur: Quocirca, Si in Circulo extra diametrum, sumatur aliquod punctum, à quo ad diametrum demittatur perpendicularis, & per idem punctum agatur recta linea à circumferentia utrinque terminata: erit rectangulum sub segmentis hujus rectæ comprehensum, unâ cum quadrato perpendicularis demissæ, æquale rectangulo sub segmentis diametri. Idem ferè contingit si extra Circulum acceptum fuerit punctum.

3 Tertij
Elem.

5 Secundi
Elem.

35 Tertij
Elem.

Et enim,

rectæ lineæ in data differentia : punctum ad inflexionem erit ad superficiem Hyperbolicam , positione datam. Etenim si in plano quocunque, quod per data puncta transit, describatur Hyperbola, cujus foci hæc puncta existant, & axis transversus differentia data: & manentibus punctis Hyperbola circa axem circumvertatur, donec ad eum locum, à quo moveri cœpit, redeat; describetur superficies curva, quæ in infinitum extenditur, & Hyperbolica dicitur (quippe Hyperbolâ in infinitum extensâ), in qua si ad libitum sumatur punctum, à quo ad data puncta agantur duæ rectæ lineæ, servabunt illæ inter se differentiam datam.

Atque sic progrediendo curvæ superficies ostendi possunt, in infinitum magis magisque compositæ, quæ quæsitum punctorum determinationi inserviunt. Verùm cum sufficiat nobis per exempla aliquot modum explicuisse, quo hæc loca per calculum detegantur, & à locis planis, solidis, aliisve magis compositis discernantur: ulteriori explicationi supersedebimus.

Cæterùm, ne quid, quod ad hanc materiam spectare possit, desideretur, sed Geometria omnibus numeris sit absoluta, paucis subijciam, quomodo cognosci possit, quando locus alicujus puncti est ad solidum: cum id neque ab Antiquis, neque à Recentioribus (quod sciam) hætenus sit deprehensum.

Tribus igitur conditionibus deficientibus, ad puncti alicujus determinationem, locus, in quo illud reperitur, Solidum est: & vel planis constans superficibus, vel Sphæricâ, vel aliâ magis compositâ, vel denique mixtis ex planis & curvis. Solida autem hæc vel sunt terminata, vel indefinitè extensa.

Ut, si intra Tetraëdram, inveniendum sit punctum, ita ut summa perpendicularium, ab eo in quatuor ejus plana, quibus constat, demissarum, æquetur perpendicularo Tetraëdri: cadet illud quovis loco intra Tetraëdram, ita ut nullum intra ipsum punctum assumi possit, quod quæsito non satisfaciat. Quod eodem modo indagatur & demonstratur, atque superius in triangulo æquilatèro est ostensum. Nam, cum ad hujus puncti determinationem tres requirantur radices seu incognitæ quantitates (quarum una inservit determinandæ longitudini perpendicularis,

Gg

quæ

quæ à quæſito puncto cadit ſupra unum ex planis, & reliquæ duæ, ad locum hujus perpendicularis in eodem plano determinandum, & adimpletis conditionibus omnibus tandem in æquationem incidamus, ubi utrinque eædem occurrunt quantitates: indicio eſt, incognitas quantitates ad libitum ſumi poſſe, atque Problema propoſitum eſſe Theorema. Nihil igitur refert quodcunque intra Tetraëdrum aſſumatur punctum, cum omnia quæſito ſatisſaciant.

Non diſſimili ratione demonſtrare poſſumus: Si extra Tetraëdrum ſumatur punctum, à quo ad ſingula ejus plana demittantur perpendiculares, earum differentiam æquari perpendiculari Tetraëdri. Adeò ut, ſi quæſtio fuerit de inveniendi puncto, à quo demiffæ perpendiculares ſimul collectæ, æquantur Tetraëdri perpendiculari, punctum illud futurum ſit in ſolido terminato, utpote ubique intra Tetraëdrum; ſi verò poſtuletur, ut differentia ipſarum eidem perpendiculari ſit æqualis, reperietur punctum illud in ſolido indefinitè extenſo, atque ſumi poterit extra Tetraëdrum, ubicunque libuerit. Idem de aliis figuris ordinatis, planiſque ſuperficiebus contentis, dici & demonſtrari poſſe, perſpicuum eſt.

Alterum exemplum, quod hîc adducemus, ex Hugeniano Problemate deduci poteſt, quemadmodum præcedens Tetraëdri ex triangulo æquilatèro deduximus, & eſt hujusmodi: Si Sphæra plano per centrum ſecetur, ſumatur autem extra planum quodlibet punctum intra Sphæram, ab eoque ad planum demittatur perpendicularis, & per ſubjectum punctum in eodem plano utcunque ducatur recta linea, utrinque à Sphære ſuperficie terminata: erit rectangulum, ſub ſegmentis hujus rectæ comprehenſum, æquale rectangulo ſub ſegmentis rectæ, utcunque per aſſumptum punctum ad Sphære ſuperficiem ductæ, unà cum demiffæ perpendicularis quadrato. Idem ſermè contingit ſi punctum ſumatur extra Sphæram.


His adde ſequens Problema, quod occasione iſtius Hugeniani ſibi ante tres annos à veſtigio inquirendum propoſuit Vir Celeber-

berrimus atque undequaque Doctissimus D. Johannes Wallisius, S. T. D., & in Academia Oxoniensi Geometriz Professor SAVILIANUS. Estque hujusmodi:

In circulo, cujus centrum C, assignato ubivis puncto A, per quod ducta recta peripheriæ occurrat in punctis B, D: inveniantur alia quotlibet puncta, ita ut, si per quodvis eorum ducatur recta peripheriæ occurrens in punctis L, M, quadratum distantiae AE æquetur vel differentiæ vel summæ rectangulorum LEM, BAD.

$$\text{Puta } \square A E \propto \begin{cases} \square L E M - \square B A D. \\ \square B A D - \square L E M. \\ \square B A D + \square L E M. \end{cases}$$

Diametro A C describatur circellus, quem contingat recta infinita FAG. Dico, singula puncta in peripheria circelli præstare



primum quæsitum: quæ verò in recta FG intra circulum, secundum: quæ denique in eadem continuata extra circulum, tertium.

Nam 1^{mo}, si sit E in peripheria circelli, (ductis diametris SACT, HECK,) erit * $\square BAD \propto \square SAT \propto \square^{\circ} \text{Radii}$ * per 35
 ($-\square AC \propto$) $-\square EC - \square AE$ *. Et $\square LEM \propto \square HEK$ Tertii
 $\propto \square^{\circ} \text{Radii} - \square EC$. Ergo $\square LEM - \square AE \propto \square BAD$, Elem.
 vel $\square LEM - \square BAD \propto \square AE$. * per 5
 Secundi

2^{do}. Si in recta FG intra circulum sumatur E vel e: erit \square Elem.
 $BAD \propto \square FAG \propto \square FA \propto \square FeG + \square Ae$. Et $\square lem$
 $\propto \square FeG$. Ergo $\square BAD - \square lem \propto \square Ae$.

G g 2

3^o.


• per 36
Tertii
Elem.
• per 6
Secundi
Elem.

^{3^{us}}. Si in FC continuatâ sumatur e vel e extra circulum, erit
 $* \square \lambda \epsilon \mu \infty \square F \epsilon G \infty \square A \epsilon (- \square F A \infty) - \square B A D *$.
 Ergo $\square B A D + \square \lambda \epsilon \mu \infty \square A \epsilon$. Quod erat faciendum. Idem,
 mutatis paucis, procederet pariter, etiamsi punctum A extra circulum assignaretur.

Quoniam igitur assumpto puncto A ceu dato, puncta invenienda E cadunt in locum planum, utpote in peripheriam circelli, aut in rectam FG intra circulum, aut denique in eandem extra circulum continuatam: patet, si in locum horum circulorum accipiantur duæ sphæræ, quod similiter hæc puncta E ubique pro lubitu sumi possint in superficie convexa sphæræ AEC , aut in superficie plana circuli, cujus diameter FG , aut denique in eodem plano, extra hujus circumferentiam in infinitum extenso, prout scilicet, ut ante, dictorum rectangulorum vel differentia vel summa quadrato distantie horum sumendorum punctorum E à puncto A requiritur æqualis. Quod si verò idem punctum A non unum locum obtineat, sed abivis intra circulum SLT assignetur, quod tunc quidem locus puncti E ubique in solido intra vel extra superficiem sphæræ SLT , pro diversa quæsitæ ratione, sit futurus. Atque ita de aliis.

H *Iam verò ex hoc solo, quòd scitur relatio, quam omnia lineæ curvæ puncta habent ad puncta omnia lineæ rectæ, modo illo, quem supra explicavi; facile quoque est invenire relationem, quam habent ad omnia alia puncta & datas lineas: atque exinde cognoscere diametros, axes, centra, aliasque lineas, & puncta, ad quæ unaquæque curva lineæ relationem habebit specialem vel simpliciorē, quàm ad alia: atque ita imaginari diversos modos illas describendi, ex quibus faciliores eligi possunt.]*
 Ita, cum relatio, quam habent puncta lineæ CE , per motum regulæ GL & plani rectilinei $CNKL$ descriptæ, (quam superius Hyperbolam esse ostendimus) ad puncta lineæ rectæ AB exprimitur per æquationem $y \infty cy - \frac{c^2}{b} y + ay - ac$; prout nimirum in ea assumitur punctum A , tanquam certum ac determinatum, à quo calculus incipiat: facile quoque est invenire relationem, quam habent ad puncta ejusdem AB , quando in ea, loco pun-

puncti A, assumitur aliud punctum nempe F, à quo calculus initium sumat. Etenim si fiat, ut NL ad LK, hoc est, ut c ad b , ita DA seu $a + c$ ad AF, erit ipsa $\propto \frac{a b}{c} + b$. E qua si dematur AB



$\propto x$, relinquetur $BF \propto \frac{a b}{c} + b - x$. Hinc si in æquatione inventa $yy \propto cy - \frac{c x}{b} y + ay - ac$ loco x substituamus $\frac{a b}{c} + b - x$: inveniemus æquationem $yy \propto \frac{c x}{b} y - ac$, quâ ostenditur relatio, quam habent puncta Hyperbolæ CE ad puncta rectæ BA, respectu puncti F. Quæ æquatio, cum præcedenti sit simplicior, arguit, Hyperbolæ puncta ad puncta rectæ BA speculiozem seu simpliciozem habere relationem, quando in AB punctum F pro certo & determinato assumitur, quàm cum in ea accipitur punctum A.

Cæterùm relationem, quam Hyperbolæ puncta servant ad omnia alia puncta & lineas datas, cognosces ex pag. 177. Ubi ex relatione, quam habent puncta alicujus curvæ ad puncta rectæ

Gg 3 • possi-

positione datæ, datus est modus inveniendi relationem eorundem punctorum ad puncta alterius cujuscvis rectæ positione datæ. Adeoque tot inventis æquationibus diversis, ad quot diversas rectas curva illa fuerit relata, atque ex iis juxta æquationum regulas extractis radicibus: constabunt totidem modi eam describendi, ex quibus faciliores seligi poterunt.

I Immo verò, potest quoque ex hoc solo inveniri propemodum omne id, quod determinari potest, atque ad spacii, quod comprehendunt, magnitudinem spectat: ita ut non opus sit de his agere apertius.] Sic ad comparandam Ellipsin cum Circulo, atque ad inveniendam relationem, quam inter se habent, prout circa eundem axem sunt descriptæ: Esto axis ∞q , latus rectum pertinens ad axem ∞r , segmentum axis inter verticem & utriusque ordinatam interceptum ∞x , ipsa verò adplicata ∞y . Hinc cum in Circulo latus transversum sive diameter æquale sit lateri recto, & æquatio exprimens relationem punctorum Circuli ad puncta diametri vel axis sit $yy \infty qx - xx$; at verò quæ relationem exprimit punctorum Ellipsis ad puncta axis sit $yy \infty rx - \frac{rxx}{q}$: quæ inter se sunt ut q ad r , hoc est, ut axis ad latus rectum pertinens ad eundem axem; quæ quidem ratio duplicata est rationis, quam habet hic axis ad axem secundum, sequitur Circulum ad Ellipsin esse, ut axis primus ad axem secundum. Id quod demonstratum est ab Archimede prop^æ 5^{ta} libri de Conoïdibus & Sphæroïdibus, ut & à nobis cap. 2^{do} tractatus de organica Conicarum Sectionum in plano descriptione.


Porro extendi potest hoc ipsum ad cognoscendam quoque relationem, quam habet Sphæra ad Sphæroïdes, prout eundem habent axem.

Etenim, cum ostensum sit, quadrata ordinatim adplicatarum utriusque curvæ esse inter se, sicut axis ad latus rectum, pertinens ad eundem axem; & quadrata illa ad se invicem sint ut Circuli, qui ab ipsis tanquam radiis conversione semicirculi & semi-ellipsis sunt & utramque figuram describunt: patet Sphæram ad Sphæroïdes esse, ut axis ad latus rectum, pertinens ad eundem axem: vel, ut quadratum ejusdem axis ad quadratum axis minoris. Quod & ab Archimede ostensum.

Adeo ut non modò ex hoc solo inveniri propemodum possit
omne

omne id, quod determinari potest, atque ad magnitudinem spaci, quod hæ curvæ comprehendunt, spectat, quemadmodum Auctor innuit; sed etiam, quod spectat ad magnitudinem solidi, à superficie aliqua curva comprehensi, atque ab hujusmodi linea generati. Sic ut ex his omnibus constet, Authorem id præcipuè operam dedisse, ut, neglectis particularibus, & præsuppositis iis, quæ ab aliis vel inventa vel demonstrata essent, ea tantum traderet, quæ difficilia, utilia, & maximè generalia essent, omniaque paucis comprehenderet; quæ verò faciliora & levioris momenti, non nisi obiter tantum perstringeret. Quod sanè raro ab Auctoribus hodie observatum cernimus, cum plerique id studeant, ut eorum opera in amplissima volumina excrescant.

Cæterum cum ex hac spaci aut solidi magnitudine deinceps facile sit invenire ejusdem centrum gravitatis, non abs re fuerit si hîc similiter modum, quo id investigari possit, uno atque altero exemplo exponam.




Igitur ad inveniendum, exempli causâ, gravitatis centrum Parabolæ ABC ac ejus portionis AEF, abscissæ videlicet per rectam EF ipsi AC parallelam: suppono centrum totius ABC esse H, Parabolæ autem EBF centrum esse I, & centrum portionis AEF esse K. Deinde factâ BD $\propto a$, AD vel DC $\propto b$, EG vel GF $\propto c$, BH $\propto x$, & HK $\propto y$, jungo AB, BC, EB, & BF. Quibus positis, quæro rationem, quæ est inter triangulum ABC & triangulum EBF. Hinc cum ex natura Parabolæ quadratum ex AD seu bb sit ad quadratum ex EG seu cc , sicut DB seu a ad GB

GB

GB: erit $GB \propto \frac{acc}{bb}$. Ac proinde cum AD multiplicata per DB producat ab , at EG multiplicata per GB producat $\frac{ac^1}{bb}$, erit ratio trianguli ABC ad triangulum EBF quæ ab ad $\frac{ac^1}{bb}$ seu b^1 ad c^1 . Hæc autem cum eadem sit rationi, quam inter se habent Parabolæ ABC & EBF (siquidem Parabola quælibet trianguli sibi inscripti maximi est sesquitercia): sequitur rationem portionis A E F C ad Parabolam EBF eandem fore quam $b^1 - c^1$ ad c^1 . Porro cum eadem sit situs ratio centri I in Parabola EBF, quæ centri H in Parabola ABC: erit DB seu a ad BH seu x , sicut GB seu $\frac{acc}{bb}$ ad BI $\frac{ccx}{bb}$. Quâ subductâ ex BH seu x , relinquitur IH $\propto \frac{bbx - ccx}{bb}$. Denique cum IH ad HK, hoc est, $\frac{bbx - ccx}{bb}$ ad y , eandem habere debeat rationem, quam portio A E F C ad Parabolam EBF seu $b^1 - c^1$ ad c^1 , fiet, abbreviando primum & tertium terminum per $b - c$, ac deinde multiplicando extremos tum medios, $\frac{bc^1x + c^4x}{bb} \propto bby + bcy + ccy$, vel $\frac{bc^1x + c^4x}{b^1 + b^1c + bbcc} \propto y$. E quibus liquet, invento H, centro gravitatis Parabolæ ABC, ad inveniendum K, centrum gravitatis portionis A E F C, faciendum esse, ut BH seu x sit ad HK seu y , sicut $b^1 + b^1c + bbcc$ ad $bc^1 + c^4$; hoc est, inventis in ratione AD ad EG quinque continuè proportionalibus, erit BH ad HK, ut summa priorum trium ad summam duarum posteriorum. Ubi demum, ad obtinendum ipsum punctum H, opus tantum est concipere rectas AD & EG esse æquales, hoc est, $b \propto c$, ita ut EGF coïncidat cum ADC, quo casu & punctum I in punctum H cadet, & K in D, lineaque DH seu y æqualis fiet $\frac{1}{2}x$, hoc est, duabus tertiis ipsius HB. Quod ipsum monstrat, scetâ diametro BD in 5 æquales partes, pro linea BH seu x tunc earundem sumendas esse tres. Id quod aliter quoque à nobis est ostensum in Exercitationibus nostris Mathematicis libr. 5. sectione 19.

Eodem modo si in Conoide Parabolico ABC & ejusdem portione A E F C centra gravitatum H & K invenire velimus, oportet, iisdem quæ supra positis, quærere rationem, quæ est inter Conum ABC & Conum EBF: invenieturque ut b^1 ad c^1 . Hæc enim



enim cum eadem quoque sit ratio, quæ est inter duos Conoïdes ABC & EBF (quandoquidem per 23 Prop. de Conoïdibus & Sphæroïdibus Archimedis Conoïis quilibet Parabolicus sesquialter esse probatur Coni, qui eandem habet basin eundemque axem cum Conoïde): patet portionem $A E F C$ ad Conoïdem EBF fore, ut $b^4 - c^4$ ad c^4 . E quibus porro, ut supra, invenitur $\propto \frac{c^4 x}{b^4 + b b c c}$, hoc est, invento H , centro gravitatis Conoïdis ABC , ad obtinendum K , centrum gravitatis portionis $A E F C$, faciendum esse ut BH sit ad HK , sicut $b^4 + b b c c$ ad c^4 , seu, quod idem est, ad DB & GB quærendam esse tertiam proportionalem L , atque deinde faciendum ut BH sit ad HK , sicut summa ipsarum DB , GB ad tertiam L . Ubi tandem, si ad ipsum punctum H habendum statuamus, ut ante, $b \propto c$, invenietur $\gamma \propto \frac{1}{2} x$. Quod ipsum docet diametrum BD in 3 æquales partes esse dividendam, atque pro BH earundem sumendas esse duas. Atque ita de aliis.


Sit CE linea curva, oporteatque per punctum C , &c.] K
 Quæ hæc lineæ & sequentibus usque ad paginæ sequentis lineam 25 continentur, in genere referri debent ad illa, quæ deinceps ab Authore afferuntur usque ad pag. 44, quibus in specie agit de natura quarundam curvarum, quas, postquam ad æquationes reduxit, deinde hæc æquationes cum alia comparat, nempe $\gamma \gamma - 2 e \gamma + e e \propto 0$ aut $z z - 2 f z + f f \propto 0$, aliæque ex hac vel illa sit composita, ut inveniantur tandem quantitas incognita v .

Quemadmodum si CE est Ellipsis, in qua MA sit segmentum diametri, ad quam CM sit ordinatim applicata, quodq;

Hh

pro

pro latere recto habeat r , pro transverso autem q : fiet per
 13^{um} Theorema 1^{um} libri Conicorum Apollonii: $xx \propto ry$
 $-\frac{1}{q}yy$, unde tollendo xx , restabit $sf - vv + 2vy - yy$
 $\propto ry - \frac{yy}{q}$, vel $yy + \frac{q^2y - 2qvy + qvv - qsf}{q - r}$ æquale ni-
 bilo.] Etenim AD latere existente recto $\propto r$, eoque ad AG per-
 pendiculari: erit, propter triangulorum GAD, DHF similitu-
 dinem, ut GA ad AD, hoc est, q ad r , ita HF seu MA, hoc est, y , ad
 FD, quæ ideo est $\frac{ry}{q}$. Quam si per HF multiplicemus, fiet rectan-




gulum HFD $\propto \frac{yy}{q}$.
 Deinde quoniam per
 13^{um} Prop. 1^{um} libri
 Conicorum Apolloni
 rectangulum MA
 D, minus rectangu-
 lo HFD, æquatur
 quadrato ex CM; &
 quidem rectangulum
 MAD sit ry : erit re-
 ctangulum MF $\propto ry$
 $-\frac{yy}{q}$. Atque idcir-

co æquatio talis: $ry - \frac{yy}{q} \propto xx$; hoc est, $ry - \frac{yy}{q} \propto ss - vv$
 $+ 2vy - yy$: quippe quod similiter ipsi xx est æquale. Hæc au-
 tem æquatio ut ad superiorem reducat, oportebit utrobique
 per q multiplicare, ut fractio evanescat: fietque $qry - yy \propto qss$
 $- qvv + 2qvy - qyy$. Denique factâ transpositione, ut quan-
 titates in yy ductæ unam teneant æquationis partem, reliquæ au-
 tem alteram, dividatur utrinque per $q - r$, habebiturque
 $yy \propto \frac{qss - qvv + 2qvy - qyy}{q - r}$ sive $yy \propto \frac{-qss + qvv - 2qvy + qyy}{q - r} \propto 0$.

Cætera, quæ hac spectant, inveniuntur inter lin. 21. pag. 45.
 & lin. 9. p. 46: quæ, cum satis sint clara, explicatione non egent.

Eodem modo, si CE sit curva lineæ per motum Parabole descripta, &c.] Cum enim, propter similitudinem triangulorum



*Inventio
dilatationum
linearum
in Hyper-
bola.*

Sit latus transversum $AG \propto q$, rectum verò $\propto r$, CM vel $AB \propto x$, MA vel $BC \propto y$, $PA \propto v$, & $PC \propto f$. Deinde, propter similitudinem triangulorum GAD , DFH , fiat, ut GA ad AD , hoc est, q ad r , ita HF feu MA , hoc est, y , ad FD , quæ ideo erit $\frac{ry}{q}$. Hæc si multiplicetur per $HF \propto y$, prodibit rectangulum $HFD \propto \frac{ryy}{q}$. Cui porro si addatur rectangulum DM , $\propto ry$, fiet rectangulum $MAF \propto \frac{ryy}{q} + ry$. Jam verò, quia, per 12^{am} Prop^{tem} 1^{mi} libri Conicorum Apollonii, rectangulum MAF æquale est quadrato ex MC seu xx , erit æquatio $\frac{ryy}{q} + ry \propto xx$, vel $\frac{ryy}{q} + ry \propto ff - vv + 2vy - yy$, subrogando nempe $ff - vv + 2vy - yy$ in locum xx . Unde multiplicatâ utrâque parte per q , fiet $ryy + qry \propto qff - qvv + 2qvy - qyy$; transpositisque qyy & qry in contrarias partes, $qyy + ryy \propto -qry + 2qvy - qvv + qff$; ac denique utrâque parte divisâ per $q + r$,

$$yy \propto \frac{-qry + 2qvy - qvv + qff}{q + r}, \text{ vel}$$


$$yy \propto \frac{+qry - 2qvy + qvv - qff}{q + r} \propto 0, \text{ collocando nimirum}$$

quantitates omnes ad unam partem.

Dein-

Deinde, ad inveniendam quantitatem quaesitam v , comparatur æquatio inventa cum æquatione ejusdem formæ $yy - 2ey + ee \propto 0$, ubi y æquatur e . Quare cum utriusque prius terminus planè sit idem, comparatur secundus cùm secundo, nempe, $\frac{+qyy - 2qvy}{q+r}$ cum $-2ey$, vel, quod idem est, $\frac{+qr - 2qv}{q+r}$ cum $-2e$: ac idcirco multiplicetur utrinque per $q+r$, & fiet $+qr - 2qv \propto -2qe - 2re$. Postea translato $2re$ ad alteram partem dividatur utrinque per $2q$, fietque $\frac{1}{2}r + e + \frac{r}{q} \propto v$, vel $v \propto y + \frac{r}{q} + \frac{1}{2}r$, quandoquidem e ipsi y supposita est æqualis.

E quibus patet, ad inveniendam rectam PC , latus rectum AD secundum esse bifarium in I , & rectam PM ipsi IF sumendam esse æqualem. Quod in Ellipsi quoque est observandum.



His adde sequentem constructionem, quam Vir insignis ac Geometra præstantissimus D. Auzotius utrique huic sectioni pariter convenientem invenit, ejusque me quinquennio abhinc per literas participem fieri voluit, & talis est.

Existente AD , ut ante, latere recto, & AG latere transverso, ad inveniendam PC , ductis CM , AD ordinatim ad AG , junctaque GD , agatur per centrum

sectionis K eidem parallela KI , secans CM in L . Dein assumptâ PM æquali ML , jungatur PC , eritque secans quaesita.


Quod ita patet.

Est enim propter similitudinem triangulorum GAD , KML , ut GA ad AD , hoc est, q ad r , ita KM , hoc est, $\frac{1}{2}q$ ad ML , hoc est, $\frac{1}{2}r$. Unde cum AP inventa sit $\propto y \propto y + \frac{r}{q} + \frac{1}{2}r$, adeoque $PM \propto \frac{1}{2}r$, liquet PM & ML esse æquales. Quemadmodum fuerunt assumptæ:

Ubi porro animadvertere licet, si ex puncto P ceu dato recta P C sit ducenda, quæ utramque sectionem vel earum contingentes ad rectos angulos secet, sive ut circulus, qui ex P ejus intervallo describitur, utramque curvam tangat, opus tantum esse ducere P L, ita ut angulus A P L sit semissis anguli A M C: si enim per L, ubi hæc recta ipsi K I L occurrit, ducatur M L C ordinatum ad A G, hoc est, ipsi A D parallela, erit juncta P C secans quæ sita, sive circulus ex P intervallo P C descriptus utramque curvam in C continget, ut requirebatur.


In Parabola.

Sit latus rectum A D $\propto r$, C M vel A B $\propto x$, M A vel B C $\propto y$, P A $\propto v$, & P C $\propto s$. Quoniam igitur per 11^{ma} Prop^{tem} 1^{mi} libri Conicorum Apollonii rectangulum sub segmento diametri M A & latere recto A D æquatur quadrato ordinatum applica-



te C M: erit $r y \propto x x$, vel $r y \propto s s - v v + 2 v y - y y$, substituendo nempe $s s - v v + 2 v y - y y$ in locum $x x$. Deinde quantitatis omnibus ab una parte in alteram translatis, ut $y y$ sit adfecta signo +, habebitur æquatio $y y + \frac{r}{2v} y - \frac{v v}{2r} \propto 0$.

Quam si porro compares cum æquatione $y y - 2 e y + e e \propto 0$, ubi y & e sunt æquales, conferendo nempe singulos terminos unius cum singulis alterius: nimirum, secundum $+r - 2v$ cum secundo $-2e$, invenietur $v \propto e + \frac{1}{2}r$, vel $v \propto y + \frac{1}{2}r$. E quibus manifestum fit, ad ducendam rectam P C, opus tantum esse, dividere latus rectum A D bifariam in puncto I, atque deinde assumere P M ipsi A I seu I D æqualem.



Quod si verò ipsa tangens C T sit investiganda, poterimus, ut ante, supponendo latus rectum $\propto r$, C M $\propto x$, & M A $\propto y$, querere A T $\propto v$, & A S $\propto s$, hoc pacto:

Fiat

Fiat propter similitudinem triangulorum AST & MCT, ut AT ad AS, hoc est, v ad s , sic MT, hoc est, $y + v$, ad MC. Quare ideo erit $\frac{sy + sv}{v}$. Unde cum & MC sit ∞x , erit $\frac{sy + sv}{v} \infty x$.

Hoc est, ductâ utrâque parte in se quadratè, habebitur

$\frac{ssyy + 2ssvy + ssvv}{vv} \infty xx$. Quoniam autem, multiplicatâ MA per latus rectum, rectangulum ry , quod inde fit, similiter ipsi xx , hoc est, quadrato ex MC est æquale: erit pariter

$\frac{ssyy + 2ssvy + ssvv}{vv} \infty ry$. Unde ordinatâ æquatione, terminis-

que omnibus ad unam partem transpositis, fit $yy - \frac{+ 2v}{vv} y + vv$

$\infty 0$. Quam si porrò compares cum æquatione $yy - 2ey + ee \infty 0$, conferendo singulos terminos unius cum singulis alterius, tertium videlicet cum tertio, obtinebitur $vv \infty ee$, hoc est, $v \infty e$. Ac proinde si in locum e substituatur y : fiet $v \infty y$. Id quod ostendit, ad ducendam rectam CT ad datum punctum C, opus tantummodo esse assumere AT æqualem AM, atque connectere puncta C & T.

Quòd si autem quæzratur AS, poterimus secundum terminum cum secundo comparare, subrogando y in locum v , ut & y in locum e : inveniaturque $s \infty \frac{1}{2} \sqrt{ry}$.


Eodem modò procedendo in binis reliquis sectionibus, inveniatur in Ellipsi $v \infty \frac{qy}{q-2y}$ & $s \infty \frac{1}{2} \sqrt{\frac{qyy}{q-y}}$; at in Hyperbola $v \infty \frac{qy}{q+2y}$, & $s \infty \frac{1}{2} \sqrt{\frac{qyy}{q+y}}$.

Porrò ut appareat, quo pacto è puncto T, in axe vel diametro dato, recta TC sit ducenda: oportet duntaxat, assumptâ quantitate v ceu datâ, quæzrere y , reliquis manentibus invariatis. Ac proinde, cum in Parabola v & y æquantur, opus tantum erit accipere MA æqualem AT, & ductâ MC ordinatim applicatâ ad MA, jungere deinde puncta C & T, ut habeatur tangens quæzita.

Quoniam vero in Ellipsi v æquatur $\frac{qy}{q-2y}$, multiplicando utrinque per $q-2y$, fiet $qv - 2vy \infty qy$, seu $qy + 2vy \infty qv$. Adeoque si dividatur utrobique per $q+2v$, inveniatur MA ∞y

$$\infty \frac{qv}{q+2v}.$$

Pari ratione si quæzatur MA in Hyperbola erit ipsa $\propto \frac{qy}{q-2y}$.
 Ubi liquet, ad ducendam ex puncto T rectam TC, quæ tangat Hyperbolam AEC, quantitatem y sive lineam AT minorem semper debere dari quàm $\frac{1}{2}q$, hoc est, minorem semisse lateris transversi, cum aliàs propter Asymptotos Problema hoc impossibile sit futurum. Quæ determinatio, cum in Parabola & Ellipsi nullum locum habeat, ostendit, quòd in duabus hisce sectionibus ejusmodi Asymptotæ non sint suspiciendæ; sed in iis ex omni puncto, ubi libet in producta MA assumpto, rectas duci posse, quæ eadem sectiones contingant.



Ad hæc, si ex puncto O, extra axem vel diametrum dato, rectam lineam ducere velimus, ut OC, quæ Parabolam CE contingat: ponatur, ut supra, latus rectum $\propto r$, MA $\propto y$, MC $\propto x$, AN $\propto a$, & NO $\propto b$, eritque ex jam inventis MT $\propto 2y$ & NT $\propto y - a$.

Deinde cum propter similitudinem triangulorum MCT & NOT, MC ad MT, hoc est, x ad $2y$, sicut NO ad NT, hoc est, b ad $y - a$: erit $xy - ax$, productum sub extremis, æquale $2by$, producto sub mediis. Quoniam verò ex natura Parabolæ, ry , ut supra, æquatur xx , hoc est, dividendo utrinque per r , y est æqualis $\frac{xx}{r}$: hinc si in æquatione inventa $xy - ax \propto 2by$ in locum y substituamus $\frac{xx}{r}$, habebimus

Etum in recta AB, per quod quaesita linea CP transire debet, calculus occurrat nullo antecedentium brevior, licet constructio sit valde brevis. *Oportet enim tantum in recta CG sumere CD, aequalem CB, quae perpendicularis est ad AB; & deinde ex puncto D rectam ducere DF, parallelam ipsi AG, atque aequalem GL: habebiturque hac ratione punctum F, per quod quaesita linea CP erit ducenda.*

Quoniam autem in hoc exemplo calculus multò est brevior, si in recta AG quaeratur punctum P, per quod linea quaesita CP transire debet, quàm si quaeratur in recta AB, atque etiam constructio allata ex illo facilius potest ostendi: visum fuit breviorē hanc subjungere, atque constructionem ex eo patefacere.

Esto ergo GA $\propto b$, AE vel LC $\propto c$, CM vel AB $\propto x$, M A vel BC $\propto y$, AP $\propto v$, & PC $\propto s$; eritque tota PM $\propto v+y$. Cujus quadratum $vv+2vy+yy$ si subtrahatur à quadrato rectae PC $\propto ss$, relinquetur quadratum rectae CM $\propto ss-vv-2vy-yy$. Vnde cum CM sit $\propto x$, & quadratum ejus $\propto xx$: erit $xx \propto ss-vv-2vy-yy$.

Eodem modo, si in triangulo rectangulo BCL à quadrato ex LC $\propto cc$ auferatur quadratum rectae BC $\propto yy$, relinquetur quadratum rectae BL $\propto cc-yy$: adeoque ipsa BL $\propto \sqrt{cc-yy}$: quâ ab AB $\propto x$ sublatâ, restabit AL $\propto x-\sqrt{cc-yy}$.

Iam verò, cum, propter similia triangu-
la GMC & GAL, GM sit ad MC, hoc est, $b+y$ ad x , sicut GA ad AL, hoc est, b ad $x-\sqrt{cc-yy}$: erit rectangulum sub extremis aequale rectangulo sub mediis, nimirum

$$bx+xy-\sqrt{bbcc+2bccy} \overset{-bb}{+cc} yy-2by^3-y^4 \propto bx. \text{ \& deletis utrobique } bx, \text{ ordinataque æquatione:}$$

$$xy \propto \sqrt{bbcc+2bccy} \overset{-bb}{+cc} yy-2by^3-y^4. \text{ Deinde ut evanescat signum radicale, ducatur utraque pars in se quadratè, atque ad tollendum } xx \text{ substituatür ejus loco } ss-vv-2vy-yy, \text{ fietque æquatio } ssyy-vvyy-2vy^3-y^4 \propto bbcc+2bccy \overset{-bb}{+cc} yy-2by^3-y^4. \text{ Vbi si utrinque auferatur } y^4, \text{ \& fiat transpositio ut quantitates in } y^3 \text{ ductæ unam obtineant æquationis partem,}$$

tem, reliquæ verò alteram, ac demum utraque pars dividatur per $2v - 2b$, orietur æquatio talis :

$$\begin{array}{r} +bb \\ y^3 - \frac{cc}{ff} yy - 2bccy - bbcc \\ -vv \\ \hline 2v - 2b. \end{array}$$

Hoc est, translatis quantitativis omnibus ad unam partem, erit:

$$\begin{array}{r} -bb \\ y^3 + \frac{cc}{ff} yy + 2bccy + bbcc \\ +vv \\ \hline 2v - 2b \end{array}$$


Quæ æquatio relationem ostendit, quam puncta Conchoïdis CE habent ad puncta lineæ rectæ BA. Quare, postquam in ipsa quantitas y est data, quandoquidem punctum C datum est, superest ut inveniamus quantitates v & f , determinantes punctum quæsitum P. Hunc in finem aliam æquationem instituo, quæ æquæ multas habeat dimensiones, & in qua y duas valeat quantitates, quæ sibi invicem sint æquales. Ideoque supponendo $y = e$, sive $y - e = 0$: duco $y - e$ in se, & fit $yy - 2ey + ee = 0$. æquatio duas habens radices æquales. Hanc porro multiplico per $y + f$, ut ascendat ad aliam trium dimensionum, ejusdemque formæ cum præcedente, & provenit æquatio $y^3 + \frac{f}{-2e} yy + \frac{-2ef}{ee} y + \frac{ee}{ee} = 0$. Cujus terminos separatim conféro cum terminis præcedentis

$$\begin{array}{r} -bb \\ y^3 + \frac{cc}{ff} yy + 2bccy + bbcc \\ +vv \\ \hline 2v - 2b \end{array}$$

Vnde cum primus terminus in utraque æquatione sit idem, comparo secundum cum secundo, ac reliquos cum reliquis. Aded ut, si statuamus $\frac{bbcc}{2v - 2b} = eef$, & utrinque dividamus per ee , oriatur $f = \frac{bbcc}{2vcc - 2bcc}$. Pari ratione, si $\frac{+2bccy}{2v - 2b} = \frac{-2ef}{+ee} y$, seu $\frac{bcc}{v - b} = -2ef + ee$, in locum f subrogetur valor ejus inventus

$\frac{bbcc}{2vee-2bce}$ habebitur $\frac{bcc}{v-b} \propto \frac{-bbcc}{2vee-2bce} + ee$, hoc est, sub eodem denominatore $\frac{-bbcc}{ve-bce} \propto \frac{+bbcc+be^3-e^3v}{ve-bce}$. Et omisso denominatore, adhibitaque decenti transpositione, ut quantitas e^3v unam constituat æquationis partem, reliquæ verò alteram; dividatur utrinque per e^3 , inveniaturque $v \propto b + \frac{bcc}{ee} + \frac{bbcc}{e^3v}$. Sive, substituendo y in locum quantitatis suppositæ e , $v \propto b + \frac{bcc}{yy} + \frac{bbcc}{y^3}$.

Eodem modo si reliquus terminus cum reliquo comparetur, inveniatur quantitas incognita s . Quia verò quantitas inventa v satis determinat punctum P , quod modò in recta AG quærebatur; & tantùm ab invento puncto P rectam lineam PC ducere oportet, ut quæstioni satisfiat: ulteriori operationi incumbere supervacaneum fuerit.



Vt verò ad demonstrationem supra dictæ constructionis accedamus, producat inventa linea CF donec secet AG productam in P , atque per L agatur recta LH parallela AG , occurrens ipsi PC in H : unde ducta HI ipsi CG parallelâ, quæ secet AP in I ; Dico AP seu v æqualem esse inventæ quantitati $b + \frac{bcc}{yy} + \frac{bbcc}{y^3}$.

Cum enim, propter similitudinem triangulorum $BC L$, $AG L$, BC sit ad CL , hoc est y ad e , sicut AG , hoc est b , ad GL : erit

$GL \propto \frac{be}{y}$. Deinde, quia, propter similia triangula CDF & CLH , $CD \propto y$ est ad DF seu $GL \propto \frac{be}{y}$, sicut $CL \propto e$ ad LH :

crit

erit $LH \propto \frac{bcc}{yy}$. Denique, cum, ob similia triangula CDF, HIP , CD sit ad DF seu GL , hoc est, y ad $\frac{bc}{y}$, sicut HI seu GL , hoc est, $\frac{bc}{y}$, ad IP : erit $IP \propto \frac{bbcc}{y}$. Quare si ducatur recta GC , in eaque assumatur CD æqualis CB , ac deinde ex puncto D recta agatur DF æqualis GL , & parallela AG : manifestum est, rectam, quæ puncta F, C , connectit, esse lineam quæsitam, quippe quæ Conchoïdem secat ad angulos rectos. Quandoquidem, si producat ad P, GI sit $\propto \frac{bcc}{yy}$, $IP \propto \frac{bbcc}{y}$, atque adeò tota $AP \propto b + \frac{bcc}{yy} + \frac{bbcc}{y}$. Quod erat faciendum.

Porro, ut constructio adhuc brevior evadat, operæ pretium est considerare, rectam ab H ad G ductam ipsi GC esse perpendicularem. Id quod, ab acutissimo nostro Hugenio primum observatum, deinde sic verum deprehendi:

Quoniam enim LH ipsi AG est parallela, erit angulus HLG æqualis angulo LGA . Deinde, quoniam $GA \propto b$ multiplicata per $LH \propto \frac{bcc}{yy}$ facit $\frac{bbcc}{yy}$, quadratum ipsius GL , quæ est $\frac{bc}{y}$: erit AG ad GL , sicut GL ad LH . Vnde cum in triangulis AGL, LGH latera circa æquales angulos ad G & L sint proportionalia, erunt itidem anguli GAL & LGH æquales. Est autem GAL rectus. Quare & LGH rectus erit.

Hinc talis emergit constructio:

Ductâ CG , secante AB in L , agatur ex L ipsi AG parallela LH , donec occurrat perpendiculari GH in H : eritque recta HC , quæ ex H per C ducitur, secans quæsitâ.

Non dissimili ratione invenire licet constructionem exempli pag. 47.

Verum enim verò quoniam lineæ CP alio quoque modo investigari queunt, beneficio Methodi de Maximis & Minimis, cujus Author est Vir Clarissimus $D. de Fermat$, in Parlamento Tolosano Consiliarius, quàm Herigonius in supplemento Curius sui Mathematici exemplis aliquot illustravit, atque ibidem etiam ad inveniendas tangentes adhibere docuit: haud abs re fore duxi, si

hoc loco viam, quâ lineæ CP ope ejusdem Methodi sint inveniendæ, sequenti calculo exposuero.

Esto, ut supra, GA $\propto b$, AE vel LC $\propto c$, AM $\propto y$, & PA $\propto v$: eritque GM $\propto b+y$, & PM $\propto v+y$. Deinde quæro quadratum ex PC, supponendo illud esse minimum quadratorum omnium, quæ fiunt à lineis ex P ad Conchoïdem ductis. Hoc pacto:

$$\begin{array}{r}
 \text{AM} \quad \text{LC} \quad \text{GM} \quad \text{GC} \\
 y \text{ --- } c \text{ --- } b+y, \text{ ad } \frac{bc+cy}{y} \\
 \frac{bc+cy}{y} \\
 \text{subtr. } \left\{ \begin{array}{l} \square \text{GC. } \frac{bbcc+2bccy+ccyy}{yy} \\ \square \text{GM. } \frac{bb+2by+yy}{yy} \end{array} \right. \\
 \square \text{MC. } \frac{bbcc+2bccy+ccyy}{yy} - bb - 2by - yy \\
 \text{add. } \square \text{PM. } \frac{vv+2vy+yy}{yy} \\
 \text{fit } \square \text{PC. } \frac{bbcc+2bccy+ccyy}{yy} - bb - 2by + vv + 2vy.
 \end{array}$$

Hoc autem ut sit minimum, posita jam AM $\propto y+e$, quæratu-
rursum, ut ante, quadratum ex PC, quò obtimeatur æquatio inter
id ipsum bis inventum; quâ innotescat quæ sita quantitas v , sup-
ponendo e esse $\propto o$.

$$\begin{array}{r}
 \text{AM} \quad \text{LC} \quad \text{GM} \quad \text{GC} \\
 y+e \text{ --- } c \text{ --- } b+y+e, \text{ ad } \frac{bc+cy+ce}{y+e} \\
 \frac{bc+cy+ce}{y+e} \\
 \text{subtr. } \left\{ \begin{array}{l} \square \text{GC. } \frac{bbcc+2bccy+ccyy+2bcae+2cccy+ccce}{yy+2cy+ce} \\ \square \text{GM. } \frac{bb+2by+yy+2be+2ey+ee}{yy+2cy+ce} \end{array} \right. \\
 \square \text{CM. } \frac{bbcc+2bccy+ccyy+2bcae+2cccy+ccce}{yy+2cy+ce} - bb - 2by - yy - 2be - 2ey - ee. \\
 \text{add. } \square \text{PM. } \frac{vv+2vy+yy+2ve+2ey+ee}{yy+2cy+ce} \\
 \square \text{PC. } \frac{bbcc+2bccy+ccyy+2bcae+2cccy+ccce}{yy+2cy+ce} - bb - 2by - 2be + vv + 2vy + 2ve.
 \end{array}$$

Hinc

Hinc dempto utrobique — $bb - 2by + vv + 2vy$, remanebit
 $bbcc + 2bccy + ccy$

$$\infty \frac{bbcc + 2bccy + ccy + 2bcc + 2ccy + ccc}{yy + 2cy + cc} - 2bc + 2vc, \text{ seu } \\ bbcc + 2bccy + ccy + 2bcc + 2ccy + ccc - 2bby - 4bcy - 2bc^2 + 2ccy + 4ccy + 2c^2v.$$

Hoc est, multiplicato per crucem, erit $bbccyy + 2bccy^2 + ccy^3 + 2bbccy + 4bccy + 2ccy^2 + 2bcc + 2ccy + ccc$
 $\infty bbccyy + 2bccy^2 + ccy^3 + 2bccy + 2ccy^2 + cccy - 2bby^2 - 4bcy^2 - 2bc^2yy + 2c^2vy + 4ccvy^2 + 2c^2vy^2$. Ac
 proinde sublatis utrinque æqualibus, restabit $2bbccy + 2bccy^2 + 2bcc + 2bccy - 2bby^2 - 4bcy^2 - 2bc^2yy + 2c^2vy + 4ccvy^2 + 2c^2vy^2$. Diviso jam ubique per c , reserventur quan-
 titates in v ductæ ad unam partem, fietque, translatis reliquis,
 $2vy^2 + 4cyy^2 + 2ccyy \infty 2bbccy + 2bccy + 2bcc + 2bccy + 2by^2 + 4bey^2 + 2bccy$. Vnde neglectis iis, quæ in e aut cc ductæ
 sunt, obtinebitur $2vy^2 \infty 2bbccy + 2bccy + 2by^2$. Et fit, dividen-
 do utrinque per $2y^2$, $v \infty \frac{bbcc}{y} + \frac{bcc}{y} + b$. ut ante. Vbi sciendum,
 calculum multò abbreviari posse, si in secunda hac operatione mul-
 tiplicationes, quibus ad e aut e^2 ascenditur, continè omittantur.

Atq; hæc quidem via est, quam & Hugenum secutum fuisse con-
 fido, prout tangentes curvarum linearum se aliter quàm Fermatius
 ope hujus ipsius Methodi quæsisisse mihi asseveravit. Quam
 viam ut omnium maximè contrahamus, poterimus, invento, ut
 prius, quadrato ex $P C$, cum subtilissimo ac sæpius laudato nostro
 Huddenio secundam hanc operationem omnino insuper habere,
 atque rejectis quantitibus cc, bb, vv , & ss reliquas per ipsius
 dimensiones multiplicare, invertendo porrò signa + & — quan-
 titatum, per y & yy divisarum. Perinde, ut hîc videre est.

$$\square P C. \frac{bbcc}{yy} + \frac{2bcc}{y} + cc - bb - 2by + vv + 2vy \infty ss$$

$$\text{Mult. per } \begin{array}{cccc} & & 1 & & 1 & & 1 \\ \hline - \frac{2bbcc}{yy} - \frac{2bcc}{y} - 2by + 2vy & \infty & 0 \\ \hline 2vy \infty \frac{2bbcc}{yy} + \frac{2bcc}{y} + 2by \end{array}$$

$$\text{Et fit } v \infty \frac{bbcc}{y^2} + \frac{bcc}{yy} + b. \text{ ut ante. Atque ita de aliis.}$$

Cæc-

Cæterum quod ad alias Methodos attinet, quibus tum Maximi & Minimi determinatio, tum tangentium sive secantium harum inventio, tum etiam infinitorum aliorum difficultiorum Problematum solutio obtineri queunt, poteris eas ab eodem Huddenio expectare; qui adeo multa ac præclara circa hæc invenit, ut neminem putem repertum iri, qui cum eo in his sit æquiparandus: quippe is non tantum Maximi aut Minimi determinationem, cum quaestio non nisi unum tale agnoscit, exhibere valet; sed etiam, quando complura nec non vario modo infinita Maxima aut Minima admittit, viâ omnium simplicissimâ elicere novit.

Ad hæc si superiori modo ipsam tangentem Conchoïdis C T investigare lubeat, ponatur, ut ante, $GA \propto b$, AE vel $LC \propto c$, CM vel $AB \propto x$, MA vel $BC \propto y$, $ET \propto v$, & $ES \propto f$: eritque $ME \propto c - y$, & $MT \propto c - y + v$. Tum fiat, propter similitudinem triangulorum STE & CTM , ut TE ad ES , hoc est, v ad f , ita TM , hoc est, $c - y + v$, ad MC . $\frac{c-f+y+v}{v} \propto x$. Hinc cum & supra inventum sit $x y \propto \sqrt{bbcc + 2bccy - bbyy + ccyy - 2by^3 - y^4}$, id est, dividendo utrinque per y ,

$$x \propto \frac{\sqrt{bbcc + 2bccy - bbyy + ccyy - 2by^3 - y^4}}{y} : \text{erit } \frac{c-f+y+v}{v} \propto \frac{\sqrt{bbcc + 2bccy - bbyy + ccyy - 2by^3 - y^4}}{y}.$$

Vnde quadratis singulis partibus ordinatâque æquatione invenitur

$$\begin{aligned} y^4 &\propto + 2 c f f y^3 + c c v v y y + 2 b c c v v y + b b c c v v \\ &\quad + 2 v f f - b b v v \\ &\quad - 2 b v v - c c f f \\ &\quad - 2 c v f f \\ &\quad - v v f f \\ &\quad \hline &\quad f f + v v. \end{aligned}$$

Hoc est, translatis quantitibus omnibus ad unam partem, habebitur $y^4 - 2 c f f y^3 - c c v v y y - 2 b c c v v y - b b c c v v \propto 0$.

$$\begin{aligned} &- 2 v f f + b b v v \\ &+ 2 b v v + c c f f \\ &\quad + 2 c v f f \\ &\quad + v v f f \\ &\quad \hline &\quad f f + v v \end{aligned}$$

Deinde, ad inveniendas quantitates v & f , posita $y \propto e$, seu $y - e \propto 0$,

$\infty 0$, multiplico $y - e \infty 0$ per $y - e \infty 0$, & fit $yy - 2ey + e \infty 0$.
 æquatio duas habens radices æquales. Quam porrò, ut ad æquẽ-
 multas cum præcedente dimensiones ascendat ac ejusdem cum il-
 la sit formæ, multiplico per $yy - fy - gg$, & provenit

$$y^4 - 2ey^3 + eey^2 - eefy - eegg \infty 0. \text{ Cujus itaque termi-} \\
 -f + 2ef + 2egg \\
 -gg$$

nos separatim comparo cum terminis præcedentis. Vltimus ter-
 minus, qui hîc est quintus, dat $gg \infty \frac{bbccvv}{ccff + ccvv}$, quartus dat

$$f \infty \frac{2bbccvv + 2bccvv}{ccff + ccvv}, \text{ tertius dat} \\
 ff \infty \frac{3bbccvv + 4bccvv + e^3vv + cccvv - bbccvv}{cccc + 2ccvv + ccvv - e^3}$$

& secun-
 dus dat $v v \infty \frac{e^3ffv + ce^3ff}{-e^4ff}$ Quocirca, ut obtineatur v ,

$$\frac{e^4 + be^3 + bbcc + bccc}{e^3v + ce, -e^4}$$

si ipsius ff valor jam inventus multiplicetur per

$$\frac{e^3v + ce, -e^4}{e^4 + be^3 + bbcc + bccc}, \text{ abbreviando prius, ad facilitatem opera-} \\
 \text{tionis, numeratorem prioris \& denominatorem posterioris fra-} \\
 \text{ctionis per } e + b, \text{ ac deinde denominatorem prioris \& numerato-} \\
 \text{rem posterioris fractionis per } eev + cee - e^3, \text{ exurgit } e^4 - be^3 \\
 + ceee + 3bbcc \infty e^4 + e^3v + ce^3 + bccc + bccv + bc^3. \text{ Fiet-} \\
 \text{que, ordinatâ æqualitate, } v \infty \frac{-be^3 + 2bbcc + ceee - be^3 - ce^3}{bcc + e^3}.$$


$$\text{Seu, quia } y \text{ est } \infty e, \text{ erit } v \infty \frac{-be^3 + 2bbcc + ceyy - by^3 - cy^3}{bcc + e^3}.$$

Denique, inventâ quantitate v , facile est invenire quantita-
 tem f . Si enim in superiori æquatione $\frac{cf - fy + f^2}{v}$

$$\infty \frac{\sqrt{bbcc + 2bccy - bbyy + ceyy - 2by^3 - y^4}}{y} \text{ in locum } v \text{ subro-} \\
 \text{getur valor ejus nunc inventus, obtinebitur}$$

$$f \infty \frac{-bcc + bcy + cyy + byy}{y^3 + by^3 + cy^3 + bcy} \sqrt{bbcc + 2bccy - bbyy + ceyy - 2by^3 - y^4}.$$

Quod ad constructionem hujus attinet, quoniam ipsa, quam
 inveni, haud inconcinna mihi est visa, placuit eam hîc paucis sub-
 necere.



Ductâ ex C super G E perpendiculari C M, agatur G C, secans A B in L; & ex L ducatur L K parallela G E, occurrens ipsi C M in K. Deinde ex K demissâ K N perpendiculari ad C G, jungatur N M: critque C T huic parallela tangens quæ sita.

Quibus explicatis facile etiam est hîc ostendere, quoniam punctum Conchoïdis C, quod duas ejus portiones, concavam & convexam, à se invicem distinguit, investigari queat. De quo egit Nobilissimus D. Hugenius ultimo Problematum Illustrium, quæ de Circuli magnitudine inventis adjecit.

Etenim inventâ ad hoc, ut ante, æquatione

$$\begin{array}{r}
 y' - 2cfsf - ccvv - 2bccvy - bbccvv\infty, \\
 - 2vff + bbvv \\
 + 2bvv + ccff \\
 \quad + 2cvff \\
 \quad + vvff \\
 \hline
 vv + ff
 \end{array}$$

quoniam ex puncto T, utcunque in producta G E accepto, nulla recta duci potest, Conchoïdem in aliquo puncto tangens, quæ, seu postquam est producta, hanc ipsam in alio puncto non secat, exceptâ tantum rectâ, quæ per flexus punctum ducitur: requiritur ut dicta æquatio ad puncti hujus determinationem tres admit-

tat

tat radices valores, qui omnes inter se sint æquales. Quod ipsum ut fiat, conféro æquationem superiorem cum æquatione

$y^1 - 3eyy + 3eey - e^1 \infty 0$, in qua y tres habet valores æquales, qui singuli sunt ∞e . Hanc autem, ut ad æquè multas dimensiones alcendat, & ejusdem cum præcedenti sit formæ, multiplico per $y + f$, & prodit æquatio $y^4 - 3ey^1 + 3eeyy - e^1y - e^1f \infty 0$.
 $+ f - 3ef + 3eef$

Cujus termini si cum alterius terminis comparantur, inveniuntur

inde $f \infty \frac{bbccvv}{e^1ff + e^1vv}$, $ff \infty \frac{3bbccvv}{e^1} + \frac{2bcevv}{e^1} - vv$,
 $v \infty \frac{bbec + 2bccc + cccc}{3bcc - 3bee} - b - c$, & $e^1 \infty - 3bee^* + 2bcc$,
 seu, quia y est ∞e , $y^1 \infty - 3byy^* + 2bcc$.

Quoniam autem hæc æquatio Cubica est, neque ad Quadratam reduci potest, superest ut valorem radices y per sectiones Conicas determinemus. At verò cum æquationes omnes inferiores construi etiam queant beneficio linearum curvarum, quæ sunt superiorum generum, non ingratum fore judicavi, si hîc ulteriùs exponerem, quo pacto ope datæ Conchoïdis C E Problema propositum solvi possit, sic ut ad constructionem ejus non nisi regula atque circino utamur, haud secus ac si Problema foret Planum. Quemadmodum id ab eruditissimo ac præstantissimo Viro-Iuvene D. Henrico van Heuraet, Harlemo-Batavo, inventum fuit, mihiq; ab eo communicatum.

Esto, ut ante, $G A \infty b$, $A E$ vel $L C \infty c$, $B C$ vel $A M \infty y$, & $A T \infty z$. Vnde ut supra pro $A P$ invenietur $\frac{by^1 + bccy + bbcc}{y^1}$.

add. $A M.$ y
 $P M. \frac{y^4 + by^1 + bccy + bbcc}{y^1}$
 $M T. z - y$
 $\square P M T. \frac{-y^4 + \frac{z}{b}y^4 + bz y^1 - bccy + \frac{bbccz}{bbccy + bbccz}}{y^1}$
 Est autem $\square C M. \frac{-y^4 - 2by^1 + \frac{bb}{cc}yy + 2bccy + bbcc}{yy}$.

Erit itaque $-y^5 + \frac{z}{b}y^4 + bz y^3 - bccy^2 + \frac{bccc}{bbcc}y + bbccz$

$$\infty -y^4 - 2by^3 + \frac{bb}{cc}yy + 2bccy + bbcc$$

$$\begin{aligned} & -y^5 + \frac{z}{b}y^4 + bz y^3 - bccy^2 + \frac{bccc}{bbcc}y + bbccz \infty -y^4 - 2by^3 + \frac{bb}{cc}yy + 2bccy + bbccy \\ & + \frac{z}{b}y^4 + \frac{bz}{bb}y^3 - 3bccy^2 + \frac{bccc}{2bbcc}y + bbccz \infty 0 \\ & \quad \quad \quad -cc \end{aligned}$$

div. per $y + b$. fit $\frac{z}{b}y^3 - ccyy - 2bccy + bccz \infty 0$. Hæc æquatio duas habet veras radices, quippe quæ ad duas tangentes, ex eodem puncto ad utramque portionem ductas, pertinent; quæ si æquales fuerint, tanget TC utramque portionem in eodem puncto.

$$\begin{aligned} & \frac{y-e}{y-e} \\ & \frac{yy - 2ey + ee \infty 0}{y+g} \\ & \frac{y^2 - 2ey + eey + eeg \infty 0}{+g - 2eg} \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \frac{-cc}{z+b} \infty -2e+g \\ & g \infty 2e - \frac{cc}{z+b} \end{aligned}$$

deleg. $\frac{bccz}{z+b} \infty eeg$

$$\begin{aligned} & \frac{bccz}{z+b} \infty 2e^3 - \frac{cccc}{z+b} \\ & bccz \infty 2ze^3 + 2be^3 - ccee \end{aligned}$$

Mult. per 3. $2ze^3 + 2be^3 - ccee - bccz \infty 0$

subtr. $6ze^3 + 6be^3 - 3ccee - 3bccz \infty 0$

subtr. $6ze^3 + 6be^3 - 4ccee - 4bccz \infty 0$

div. per cc . $\frac{cccc + 4bccz - 3bccz \infty 0}{cc + 4bc - 3bz \infty 0}$

Mult. per $3z + 3b$.

3zee + 3bee + 12bze + 12bbe - 9bzz - 9bbz $\infty 0$

subtr. 3zee + 3bee - 2ccc - 2bcc $\infty 0$

12bze + 12bbe + 2ccc - 9bzz - 9bbz + 2bcc $\infty 0$

12bze + 12bbe + 2ccc - 9bzz + 9bbz - 2bcc

$e \infty \frac{9bzz + 9bbz - 2bcc}{acc + 12bz + 12bb}$


deleg. $\frac{-2bcc}{z+b} \infty cc - 2eg$

$$\begin{aligned} & \frac{-2bcc}{z+b} \infty cc - 4cc + \frac{2ccc}{z+b} \\ & -2bcc \infty -3zee - 3bee + 2ccc \\ & 3zee + 3bee - 2ccc - 2bcc \infty 0 \\ & 6ze^3 + 6be^3 - 4ccee - 4bccz \infty 0 \end{aligned}$$

Mult. per 2e.

per $\frac{9bb}{16bb+2cc}$, & tertium per $\frac{81b^4}{256b^4+64bbcc+4c^4}$. Omnino
ut hic videre est.

$$\begin{aligned} z^3 + bz^2 - \frac{1}{4}ccz - \frac{1}{4}cc &= 0 \\ \frac{9bb}{16bb+2cc} & \quad \frac{81b^4}{256b^4+64bbcc+4c^4} \\ \hline z^3 + \frac{9b^3}{16bb+2cc} z^2 - \frac{27b^4cc}{64b^4+16bbcc+c^4} z - \frac{1}{4}cc &= 0 \\ \frac{27b^4cc}{64b^4+16bbcc+c^4} & \propto \frac{bcc}{x+b} \quad \frac{9b^3}{16bb+2cc} \propto \frac{yy-xx+bb-cc}{2x+2b} \\ \frac{27b^4}{64b^4+16bbcc+c^4} & \propto \frac{1}{x+b} \quad \frac{9b^3x+9b^4}{8bb+cc} \propto yy-xx+bb-cc \\ \frac{27b^3x+27b^4}{64b^4+16bbcc+c^4} & \propto \frac{9b^3x+9b^4}{8bb+cc} \propto yy-xx+bb-cc \\ x & \propto \frac{64b^4+16bbcc+c^4}{27b^3} - b. \quad yy \propto \frac{9b^3x+9b^4}{8bb+cc} + xx+cc-bb \\ & \quad y \propto \sqrt{\frac{9b^3x+9b^4}{8bb+cc} + xx+cc-bb}. \end{aligned}$$



Igitur sumendo in axe lineam AO

$$\propto \frac{64b^4+16bbcc+c^4}{27b^3} - b,$$

eamque vocando x , si ex puncto O intervallo OV


$$\propto \sqrt{\frac{9b^3x+9b^4}{8bb+cc} + xx+cc-bb}$$

arcus Circuli describatur, atque ex sectionis puncto V ducatur ad AO perpendicularis VT: erit AT, quæ se habet

ad AR, ut $16bb+2cc$ ad $9bb$, invenit æquationis radix. Vnde facile est invenire lineam AM. Ostensum enim est $yy+4by-3bz \propto 0$.

Denique cum inventio supponendi duas ejusdem formæ æquationes, ad comparandum separatim omnes terminos unius cum omnibus terminis alterius, non tantum ad inveniendas tangentes aut secantes curvarum linearum, quemadmodum fuit expolitum, adhiberi possit; sed ipsa generalis sit atque infinitis aliis Problematis resolvendis, ut Author asserit, inservire queat: haud inutile fuerit hic ulterius quoque exponere, quo pacto illam ad Maximi aut Minimi determinationem applicari possit deprehendi, proponendo in cum finem sequentia Problemata.

Datam



Datam rectam lineam
A C secare in puncto B,
ut parallelepipedum,
quod fit sub quadrato u-
nius partis A B & altera

parte B C, sit omnium parallelepipedorum, sic facto-
rum, maximum.

Esto A C $\propto a$, & A B $\propto x$: eritque B C $\propto a - x$. Deinde ma-
ximum solidum, cui parallelepipedum quæsitum statui potest æ-
quale, esto b^3 . Quibus sic positis, si quadratum ex A B $\propto x x$ mul-
tiplicetur per B C $\propto a - x$, proveniet $a x x - x^3 \propto b^3$, seu
 $x^3 - a x x + b^3 \propto 0$. Iam factâ $x \propto e$, seu $x - e \propto 0$, multi-
plico $x - e$ per $x - e$, & fit $x x - 2 e x + e e \propto 0$. Quam porro,
ut ejusdem sit formæ cum præcedente, multiplico per $x + e$, &
exurgit $x^3 - 2 e x x + e e x + e e f \propto 0$. Ex quarum mutua inter
 $+ f - 2 e f$

se collatione eliciuntur hæ tres æquationes — $2 e + f \propto -a + e e$
— $2 e f \propto 0$, & $e e f \propto b^3$: quæ resolutæ dant $f \propto \frac{1}{2} e$, seu $x \propto \frac{2}{3} a$,
& $b^3 \propto \frac{4}{27} a^3$. Quod ipsum docet, ad secandam lineam A C, qua-
lis requiritur, eandem in B ita esse dividendam, ut A B ipsius A C
contineat duas tertias partes; & maximum solidum, cui paralle-
lepipedum quæsitum adæquari potest, esse $\frac{4}{27} a^3$.

Dividere p planum in tria plana proportionalia, ita
ut solidum, quod fit ex ductu summæ duorum priorum
in latus secundum vel duorum posteriorum in latus
primum, sit omnium maximum.

Assumptis ad hoc x pro latere primo, & y pro latere secundo,
fient inde proportionalia plana $x x$. ^{1^{um}}

$$x y. \quad 2^{\text{um}}$$


$$y y. \quad 3^{\text{um}}$$

Et manifestum est, $x x y + x y y$, quod fit ex $x x + x y$, summâ
duorum priorum planorum, in latus secundum y , esse æquale ei,
quod fit ex $x y + y y$, summâ duorum posteriorum planorum, in
latus primum x . Superest ut $x x y + x y y$ sit omnium ejusmodi so-
lido-

lidorum maximum. Quoniam autem $xx + xy + yy$ est ∞p
 vel $yy \infty p - xx - xy$
 mult. per x x
 vel etiam $xyy \infty px - x^3 - xxy$:


Hinc si pro xyy dicti solidi $xyy + xxy$ substituatur $px - x^3 - xxy$, habebitur $px - x^3$. Quocirca ut $px - x^3$ fiat maximum solidum, quod esse possit, intelligatur ipsum æquale solido q : eritque $x^3 - px + q \infty 0$. Deinde factâ $x \infty e$ seu $x - e \infty 0$, multiplico $x - e$ per $x - e$, & fit $xx - 2ex + ee \infty 0$. Quam rursus, ut eandem formam habeat cum præcedenti, multiplico per $x + 2e$, & exurgit $x^3 - 3eex + 2e^3 \infty 0$. Ex quibus binis æquationibus, si singuli termini unius cum singulis terminis alterius comparentur, elicio $x \infty \sqrt[3]{\frac{1}{3}p}$, & $q \infty \frac{1}{3}p \sqrt[3]{\frac{1}{3}p}$. Eodem modo invenitur $y \infty \sqrt[3]{\frac{1}{3}p}$. Quod ipsum monstrat, ad dividendum p planum in tria plana proportionalia, maximum solidum, quod ex ductu summæ duorum priorum in latus secundum vel ex ductu duorum posteriorum in latus primum gignitur, esse illud, quod obtinetur dividendo p planum in tria plana æqualia. Et sic de aliis.

Cæterum, cum allatis exemplis satis superque sit ostensum, quâ ratione lineæ rectæ inveniri possint, secantes lineas curvas in Geometriam recipiendas in datis punctis ad angulos rectos: lubet etiam afferre modum ducendi illas in iis curvis, quas pro Geometricis pari jure habere non licet. Qualem Dominus des Cartes excogitavit, atque jam pridem ejus exemplum R. P. Mersennus per literas ostendit in curva, quæ Cycloïdes sive Trochoïdes appellatur, quam Vir Clarissimus Evangelista Toricellius, scribit à Galilæo Galilæi, prædecessore suo, primum fuisse consideratam; cujusque ulteriori speculationi ipsum postea, ut & Virum Celeberrimum D. de Roberval, Mathematicum in Academia Parisiensi Professore Regium, se addidisse novi. Originem autem ducit ex motu puncti, in rota sive circulo assumpti, super rectam aliquam lineam circumvoluti.



Vt si super recta linea AE circumvolvatur rota sive circulus $ABCD$, donec punctum ejus A , in quo dictam lineam tangit, eidem rursus occurrat in E : describet punctum A hoc motu lineam curvam AFE , quæ Trochoïdes sive Cycloïdes appellatur. Idem intellige de quovis alio puncto, extra vel intra rotam sive circumulum assumpto, excepto tantum ejus centro.

Iam ut in genere ostendatur, quâ ratione lineæ rectæ duci possint, quæ hæc curvas secant in datis punctis ad angulos rectos; non abs re fuerit cum Aristotele hîc explicare, quo pacto inæquales circuli, qui circa idem centrum constituti ac conjuncti circumvolvuntur, æquales rectas lineas absolvant.



Sunt ergo duo circuli inæquales, major quidem $BCDE$; minor autem $FGHI$, idem habentes centrum A : sintque diametri majoris BD, EC ; minoris verò $FH \& IG$, sese ad angulos rectos

LI

ctos

ctos secantes in A. ita ut quadrans circuli majoris sit CD; minoris verò GH. Iam igitur ut pateat ratio, quâ hi circuli, simul circumvoluti, æquales lineas absolvant; concipiatur prium majorem BCDE dextrorsum moveri super rectâ DK, & minorem FGH ad motum illius describere lineam rectam ipsi DK parallelam, quæ sit HL. Vnde manifestum, cum punctum C pervenerit ad M, existente arcu DC æquali rectæ DM, semidiametrum quoque AC tunc fore perpendicularem super DK in M; ita ut coïncidat cum MN, hoc est, punctum C cum puncto M, & punctum A cum puncto N. Ac proinde cum punctum G circuli minoris sit in rectâ AC: sequitur ipsum quoque post hujus quadrantis devolutionem cadere in punctum O; ita ut semidiameter AG circuli minoris transferatur in NO. Adcò ut, NO æqualis existente & parallelâ ipsi AH, ipsa quoque HO sit æqualis futura ipsi AN seu DM, & singulæ rectæ DM, HO separatim ab utroque circuli quadrante eodem tempore peragrentur. Idem de integris circulis est intelligendum.

Non secus ostendetur, si moveatur circulus minor FGH super rectam HL, secum deferens circulum majorem BCDE, sibi affixum in centro A, lineas rectas æquales absolvi. Devoluto enim circuli minoris quadrante HG super rectam HL, ab H versus L; ita ut rectam lineam HP sibi æqualem percurrat: ducatur per P recta QPR, secans rectam HL ad angulos rectos in P; sed AN & DK in Q & R. Quo facto, perspicuum est, cum punctum G est in P, punctum quoque A esse in Q, rectamque AG super rectam QP. Atque ideo, cum punctum C circuli majoris existat in linea AG producta, patet, illud post hujus quadrantis devolutionem inventum iri in puncto R; rectamque DR æqualem fore rectæ AQ seu HP, & singulas eodem temporis spatio ab utroque circuli quadrante perfici. Quod & de tota circuli circumferentia concludere licet. E quibus tandem liquet, quâ ratione circulus circumvolvi possit, ut rectam absolvat lineam, quæ circumferentiæ ejus sit vel æqualis, vel major, vel minor.


Sed de supra dictâ linea AFE notandum, eam duobus motibus describi, inter se distinctis; recto nempe, quo circulus ABCD deferretur ab A ad E; & circulari, quo punctum in ejus circumferentia A (quod Trochoïdem describit) rotatur circa centrum, dum movetur per lineam rectam ipsi AE æqualem & parallelam.

Qui-

& ex arcu I A (cujus centrum est punctum D): per quæ centra transeunt omnes rectæ, quæ dictorum arcuum tangentibus ad angulos rectos occurrunt. Quod cum accadat polygono centies millenorum millium, palam est, idem convenire quoque Circulo.

*Verba
Auctoris.*

Cæterum possem hanc tangentem alio modo, & meâ sententiâ, elegantiori, magisque Geometrico demonstrare; verum quoniam prolixior foret, & brevitati hîc mihi consulendum videtur, in præsens ei describendo supersedebo. Notandum solummodo est, cum basis hujus Trochoïdis æqualis est circumferentiæ rotæ, quam super eandem basin ad ejus descriptionem circumvolvi imaginamur, curvam hanc, à fornice circulari non abimilem figuram, referre: hoc est, quodd tangens utriusque ejus extremi puncti ad basin sit perpendicularis. Sed cum minor est, quod tunc utraque extremitas introrsum sit involuta, ita ut complures revolutiones hanc repræsentent figuram



Ad cujus Trochoïdis tangentes inveniendas, atque sciendum ubi se involvere incipiat: imaginandum est, punctum D, à quo describitur, esse extra rotam. Deinde, duæ supponendæ sunt bases; una A E; supra quam Trochoïdes A B C D per punctum D est descripta; & altera B G, super quam rota F G secum deferens

circulum D E sibi affixum circa ejus centrum est circumvoluta, cujusque semicircumferentia dimidiâ basi A E est æqualis. Vbi sciendum, tangentes inveniri per circulum D E & punctum G, ubi rota F G basin B G contingit. Adeò ut ad ducendam lineam rectam, quæ tangat hanc Trochoïdem, verbi gratiâ, in puncto C, opus tantum sit ducere C N parallelam basi A E, occurrentem cir-


circulo DE in puncto N; tum verò jungat N G parallelam CP: quæ ipsi tangenti quæ sita erit perpendicularis. Ita ut perspicuum sit, punctum B, ubi hæc secunda basis B G Trochoïdi occurrit, fore illud, ubi ipsa se introrsum involvere incipiet: quandoquidem linea, quæ illam ibidem tangit, ad basin A E perpendicularis existit.

Denique si basis Trochoïdis major fuerit circumferentiâ circuli, qui per assumptum punctum, quod eam designat, circa rotæ centrum describitur: binæ extremitates extrorsum erunt inflexæ; ita ut complures ejusmodi linearum revolutiones hanc exhibeant figuram.



Cujus Trochoïdis tangentes ut inveniantur, atque sciat, ubi se inflectere incipiat,

imaginandum est, punctum, quod ipsam designat, esse intra rotam: adeoque secundam basin esse B G, supra quam rota F G, cujus circumferentia huic basi est æqualis, circumvolvatur, interea dum punctum D, Trochoïdem designans, super primam basin A E describit circulum DE, circa rotæ centrum. Iam ut inveniat, ubi se ipsam in puncto C, utcumque in Trochoïde assumpto, tangat: ducatur C N parallela basi, occurrens circulo



DE in puncto N. Tum ab N ad G, ubi rota F G basin suam contingit, ductâ rectâ N G, agatur ipsi parallela CP: eritque recta CL, quæ ad eam perpendicularis ducitur, tangens quæ sita. Porro ad inveniendum punctum H, ubi Trochoïdis portio A H

definit esse concava, & HCD convexa, opus tantum est à puncto G rectam ducere GR , quæ tangat circulum DRE in puncto R ; tum ab R rectam RH , parallelam basi, & occurrentem Trochoïdi in puncto H . Quod erit quæsitum.

Vbi notandum, nullam dari lineam rectam, quæ Trochoïdem hanc $AHCD$ tangat in puncto H : quandoquidem illud ipsum duas ejus portiones, quarum una est concava, & altera convexa, distinguit.

Deinde observandum, quod ea, quæ de tangentibus Trochoïdum, per rotam circularem descriptarum, hic allata sunt, etiam omnibus Trochoïdibus competant, quæ circumvolutione aliarum quarumlibet figurarum describuntur.


Denique, quod lineæ hæc sint Mechanicæ, & è numero earum, quæ in hac Geometria repudiantur; adeo ut nemini mirum videri debeat, quod tangentes earum non inveniantur per regulas ibi expostas, cum ad ipsas non referantur.

00 *Quæ quidem ratione hi circuli in punctis 2, 2 sese intersectabunt, per quæ secunda hæc Ovalis erit ducenda.* Notavit hic Clarissimus Hugenius, secundam hanc Ovalem (quod animadversione dignum est) uno casu Circulum perfectum evadere, cum nempe FA ad AG eandem rationem habet, quam $5A$ ad $A6$. Adeoque radios lucis, ad punctum aliquod tendentes, ope superficiei Sphæricæ ad datum aliud punctum omnes accurate cogi posse. Quod se apertius in tractatu de Dioptricis demonstraturum suscepit, in quo multa egregia ac ingeniosè à se inventa, quæ huc spectant, brevi, si volet Deus, est exhibiturus.

P *Et quod ex tali materia constet, ut vim horum radiorum, secundam rationem, quæ inter lineas $A5$ & $A6$ reperitur, diminuat. Quandoquidem ex eo, quod in Dioptrica demonstravimus, liquet, hoc posito, futurum, ut etiam reflexionum anguli non secus ac refractionum, inæquales existant, atque eodem modo mensurari possint.*] Hæc refer ad caput 2^{um} Dioptricæ, ubi demonstratum est, reflexionis angulum angulo incidentiæ esse æqualem: quoniam vis alicujus radii per reflexionem non diminuitur. Sicut per refractionem vis radii, transeundo ex uno corpore pellucido in aliud, augetur aut diminuitur, ac propterea angulos

riam in G secabit. Quibus sic existentibus, cum & hinc P I ipsi I T sit æqualis, erit $r + 2y - 2z \propto \frac{1}{2}r + 2y$. Vnde, dempto utrinque $2y$, & reliquis per 2 divisis, invenitur $z \propto \frac{1}{2}r$. Quod ipsum, cum de quovis radio ipsi axi parallelo similiter intelligendum sit, nos docet, radios Solis, axi parallelos, ubi in superficiem concavam speculi Parabolici inciderunt, omnes ad idem axis punctum I reflecti, distans à vertice quartâ parte lateris recti.

Vnde porro fit manifestum, cum lucente Sole, beneficio hujus speculi, prout ipsi directè est obversum, aliquid in I accendatur, quam ob rationem idem speculum ustorium dictum fuerit, punctumque I Foci nomine appellari consueverit.



Deinde si fuerit vitrum, habens formam Ellipsis D B K, cujus maxima diameter sit D K: ad investigandum quo modo radius A B, qui in aëre existens ipsi D K est parallelus, tendere debeat, postquam intravit ejus superficiem convexam, & in quo vitro refractiones sic fieri intelliguntur, ut, juxta ea, quæ in Dioptrici tradita sunt, illæ omnes mensurari possint per rationem, quæ est inter lineas d & e , facio D H vel I K $\propto a$, H I $\propto z$, & D F $\propto y$, eritque H F $\propto y - a$ vel $a - y$, & F I $\propto a + z - y$ vel $y - a - z$. Quibus positis, si Ellipsis D B K descripta esse intelligatur ope fili H B I, haud secus ac illud Capite 8^{to} Dioptrices ab Authore aut etiam à nobis in Organica Conicarum Sectionum descriptione expositum fuit, erit, factâ B I $\propto x$, B H $\propto 2a + z - x$. Vnde jam facile est invenire quantitatem y , assumptis scilicet quantitibus x & z , ut cognitis. Etenim si à quadrato B H. $4aa + 4az + zz - 4ax - 2zx + xx$ tollatur quadratum H F. $yy - 2ay + aa$, restabit $3aa + 4az + zz - 4ax - 2zx + xx + 2ay - yy$, pro quadrato B F. Similiter, si à quadrato B I. xx auferatur quadratum F I. $aa + 2az + zz - 2ay - 2zy + yy$, relinquetur etiam

$xx -$

$xx - aa - 2az - zz + 2ay + 2zy - yy$, pro quadrato BF.
 Hinc cum habeatur æquatio inter quadratum BF bis inventum,
 invenietur, ordinatâ æqualitate, $y \propto \frac{2aa + 3az + zz - 2ax - zx}{z}$.

Esto jam $DN \propto v$, & $NB \propto f$, critque $FN \propto v - y$. E quibus
 rursus facile est invenire quantitatem y , suppositis quantitibus
 v & f . Si enim à quadrato BN. ff abstulero quadratum FN.
 $vv - 2vy + yy$, remanebit $ff - vv + 2vy - yy$, pro quadrato
 BF. Vnde factâ æquatione inter hanc summam & posteriorem
 duarum præcedentium habebitur $y \propto \frac{ff - vv - xx + aa + 2az + zx}{2a + 2z - 2v}$.

Quibus jam inter se æquatis, & æquatione de xx ordinatâ,
 fiet $xx \propto -4avx + ssz$

$$\begin{array}{rcl}
 -2vz & - & vvz \\
 +4aa & + & 4avv \\
 +6az & + & 6avz \\
 +2zz & + & 2vzz \\
 & - & 4a^3 \\
 & - & 9aaz \\
 & - & 6az^2 \\
 & - & z^3
 \end{array}$$

Porro ut inveniantur quantitates v & f , positâ $x \propto f$, multipli-
 cetur $x - f \propto 0$ per $x - f \propto 0$, & fit $xx - 2fx + ff \propto 0$, seu
 $xx \propto 2fx - ff$, æquatio ejusdem formæ cum præcedente. Vn-
 de, comparando secundum terminum unius cum secundo alte-
 rius, emergit v , hoc est, $DN \propto \frac{2aa + 3az + zz - zx}{2a + z}$. Quæ à


DI seu $a + z$ ablata relinquit $NI \propto \frac{zx}{2a + z}$. Denique cum li-
 nea NQ vel FB & linea NM eandem inter se rationem ha-
 beant, quam lineæ, quæ refractionem vitri DBK mensurant;
 & quidem FB ad NM sit, ut BI ad IN: superest ut d sit ad e ,
 sicut x ad $\frac{zx}{2a + z}$. Et fit, multiplicando extremos, tum medios,

$\frac{d zx}{2a + z} \propto ex$. Vnde, resolutâ æqualitate, invenitur HI seu
 $z \propto \frac{2ae}{d - e}$. Cui si addantur DH & IK, hoc est, $2a$, habebitur

Mm

DK

$DK \propto \frac{2ad}{d-e}$. Et patet DK ad HI esse, ut $2ad$ ad $2ae$, hoc est, ut d ad e . Quod ipsum, cum de quovis radio AB ipsi DK parallelo similiter intelligendum sit, nos docet, ope vitri Elliptici DBK , in quo DK ad HI eandem habet rationem, quam d ad e , hoc est, eandem quam inter se servant lineæ, quæ hujus vitri refractionem metiuntur, radios, qui in aëre existentes diametro DK sunt paralleli, omnes ita detorqueri, ut, postquam superficiem ejus convexam DBK transierunt, colligantur simul in puncto I .



Denique si fuerit vitrum, habens figuram Hyperbolæ DB , cujus axis sit DK : ad investigandum, quo pacto radius AB , qui in vitro existens ipsi DK est parallelus, se inflectere debeat, postquam superficiem ejus convexam DB erit egressus, supponendo ejusdem vitri refractionem esse eam, quæ est inter lineas d & e , facio HD vel $KI \propto a$, $HI \propto z$, & $DF \propto y$: eritque $FH \propto y - a$ vel $a - y$, & $FI \propto z + y - a$. Quibus positis, si Hyperbola DB descripta intelligatur beneficio sili, quemadmodum Capite 8^o Dioptrices ab Authore fuit indicatum, vel etiam à nobis libro 4^{to} Exercitationum nostrarum Mathematicarum, erit, factâ $BI \propto x$, $BH \propto x - z + 2a$. Vnde jam facile est invenire quantitatem y , supponendo quippe quantitates x & z esse cognitæ. Si enim à quadrato BH . $xx - 2zx + zz + 4ax - 4az + 4aa$ subducatur quadratum FH . $yy - 2ay + aa$, restabit $xx - 2zx + zz - yy + 2ay + 3aa + 4ax - 4az$, pro quadrato FB . Similiter, si à quadrato BI . xx auferatur quadratum FI . $zz + 2zy + yy - 2az - 2ay + aa$, relinquetur quoque $xx - zz - 2zy - yy + 2az + 2ay - aa$, pro quadrato FB . Hinc, cum habeatur æquatio inter.

inter quadratum FB dupliciter inventum, invenietur, ordinatâ æqualitate, $y \propto \frac{xx - 2z - 2aa + 3az - 2ax}{x}$. Esto jam DN $\propto v$ & NB $\propto f$, eritque NF $\propto v - y$. Equibus rursus facile est invenire quantitatem y , suppositis quantitativibus v & f . Etenim si à quadrato NB. ss detraxero quadratum NF. $vv - 2vy + yy$, remanebit $ss - vv + 2vy - yy$, pro quadrato FB. Vnde tactâ æquatione inter hanc summam & posteriorem duarum præcedentium, habebitur $y \propto \frac{-ss + vv + 2x - aa + 2az - 2x}{-2a + 2z + 2v}$. Quibus jam inter se æquatis, & æquatione de xx ordinatâ, fiet

$$\begin{array}{r} xx \propto + 2zxx + ssx \\ - 6az - vvz \\ + 4aa - 2vzz \\ + 2vz - 4aav \\ - 4av + 6avz \\ - z^3 \\ - 9aaz \\ + 6aaz \\ + 4a^3 \\ \hline z. \end{array}$$

Porro ut innotescant quantitates v & f , positâ $x \propto f$, multiplico $x - f \propto 0$ per $x - f \propto 0$, & fit $xx - 2fx + ff \propto 0$, seu $xx \propto 2fx - ff$, æquatio similis præcedenti. Vnde, comparando secundum terminum unius cum secundo alterius, invenitur v , hoc est, DN $\propto \frac{2x - 2z + 3az - 2aa}{z - 2a}$. Cui si addatur DI. $z - a$,

habebitur NI $\propto \frac{2x}{z - 2a}$. Denique cum linea NM ad NQ vel FB eam habeat rationem, quam inter se habent lineæ refractionem vitri DB mensurantes; & quidem NM ad NQ vel FB sit, ut NI ad IB: relinquitur, ut d sit ad e , sicut $\frac{2x}{z - 2a}$ ad x . Et fit, multiplicando extremos, tum medios, $dx \propto \frac{exx}{z - 2a}$. Vnde, resolutâ æqualitate, invenitur HI seu $z \propto \frac{2ad}{d - e}$. E qua ablatis HD & KI seu $2ae$, erit reliqua DK $\propto \frac{2ae}{d - e}$. Et manifestum est HI ad DK esse, ut $2ad$ ad $2ae$ vel ut d ad e . Id quod, dum de quolibet

radio AB ipsi DK parallelo perinde est intelligendum, nobis monstrat, beneficio vitri Hyperbolici DB, in quo HI ad DK eam obtinet rationem, quam *d ad e*, quæ est ejusdem vitri mensura refractionis, radios, qui in vitro DB existentes axi DK sunt paralleli, egrediendo superficiem ejus convexam DB ita flexum iri, ut egressi omnes coeant in punctum I.

PP *Cujus figura est A₃T₃, quæ undique est convexa; præterquam versùs A, ubi paululum concava existit, ita ut ipsa pariter atque præcedens cordi haud sit absimilis.]*
Vbi etiam sciendum, ex positione punctorum H & F, quemadmodum Nobilissimus Hugenius notavit, contingere posse, ut versùs A convexa existat.



A R G V M E N T V M

T E R T I I L I B R I.

Postquam primo libro exposita sunt ea, quæ viam aper-
runt ad Autoris Methodum, quâ in resolvendis & con-
struendis Geometria Problematis utitur, ibidemque si-
mul ostensa est ratio construendi Problemata Plana, hoc
est, quæ reduci possunt ad æquationes Quadratas, quæque
reëtarum linearum atque circuli circumferentiarum ope solvi possunt;
accedit deinceps ad Solidorum & Linearum construtiones, hoc est, quæ
ad æquationes Cubicas altiorumve graduum ascendunt, & ad quorum
construtiones, sectionibus Conicis, aliisque curvis lineis magis compo-
sitis uti necessarium est. Vbi observandum est, quod, cum peccatum sit
non leve apud Geometras, Problema Planum construere per Conica aut
Linearia, hoc est, ipsum per improprium solvere genus, ita quoque sit
cavendum ne in construtionem ejus adhibeamus lineam aliquam cur-
vam, quæ magis sit composita, quam ipsius natura admittit.

Quocirca, postquam secundo libro ostensum est, quo pacto curvæ
lineæ, medianibus æquationibus, quæ exhibent relationem, quam
ipsarum puncta habent ad puncta lineæ rectæ, distingui possint in certa
genera, atque exinde cognosci, quam illarum magis sint compositæ;
superest ut explicemus, quomodo sciri possit, utrum Problema aliquod
sit vel Plenum, vel Solidum, vel denique Lineare. Arguitur au-
tem Problema Plenum esse, cum æquatio, ad quam perducitur, post-
quam ad simplicissimos terminos est reducta, atque amplius reduci ne-
quit, Plana existit, hoc est, ut incognita quantitas ad quadratum ascen-
dat, duarumve habeat dimensiones, illaque per rectas lineas & circumlorum
circumferentias inveniri possit, quemadmodum primo libro fuit osten-
sum. At verò Solidum esse, quando æquatio, quæ ex eo deducitur, post-
quam ad simplicissimos terminos reducta est, talis existit, ut incognita
quantitas ad Cubum aut Quadrato-quadratum, hoc est, ad 3 aut 4 di-
mensiones ascendat, ipsaque non nisi Conicam aliquam sectionem in
construtionem adhibendo inveniri queat. Ac Lineare denique, ubi
æquatio illa, postquam non amplius reducibilis est, plus quam Solida exi-
stet, & incognita quantitas ad 5 aut 6 dimensiones assurgit, vel etiam ad
7 aut 8; vel ad 9 aut 10 dimensiones, atque ita porro in infinitum; ipsa-
que non nisi per curvam secundi, aut tertii, aut superioris denique gene-
ris, inveniri potest.

Ex quibus perspicuum est, quòd, etiamsi linea curva omnes, quomodo in aliquo ordinato describi possunt, in Geometriam sint recipienda, non ideo tamen indifferenter primà, quae forte occurrat, ad constructionem cuiusque Problematis uti liceat; sed eligendam esse semper simplicissimam, per quam possibile sit illud ipsum resolvere. Atque pro simplicissimis non habendae esse illas, quae facillimè omnium describi possunt, sive quae Problematis constructionem aut demonstrationem faciliorem reddunt; sed praesertim illas, quae simplicissimi sunt generis, & ad quasitum lucem determinandam inservire queunt. Ita ut, si peccatum sit in Geometria (quemadmodum supra diximus) Problema aliquod propositum construere per genus Linearum curvarum, magis compositum, quam natura ejus permittit; contra quoque pro vitio habendum sit, si quis inutiliter desudet ad illud ipsum, per genus aliquod linearum simplicius, quam natura ejus admittit, construendum.

Quapropter ut utrumque vitium evitari, ac unumquodque Problema ex proprio suo linearum genere solvi possit, postquam tam Problematis quam ipsius curva cognitionem ab equationum cognitione dependere est ostensum; hinc ad explicandam equationum naturam progreditur, docens, unamquamque tot admittere posse diversas radices sive differentes valores quantitatis incognita, quot ipsa habet dimensiones; eorumque interdum quasdam esse, quae falsae existunt vel nihilo sunt minores; interdum etiam, quae plane imaginariae; sicut etiam quâ ratione ipsae aequationes producantur ex suis radicibus in se invicem ductis, ita ut per illas rursus sint divisibiles. Quas divisiones subinde utiles ostendit ad explorandum utrum certa quaedam quantitates sint aequationis radices nec ne, tum etiam ad ipsas indagandas, ac denique ad aequationem ad p. inciores dimensiones reducendam. Deinde, postquam ostendit quot verae & quot falsae radices in unaquaque aequatione haberi possint, sicut etiam quo pacto falsae reddantur verae, & verae falsae, docet, quo pacto qualibet aequatio transmutari possit in aliam, ita ut radices ejus sint certâ quâdam quantitate majores vel minores, quam radices prioris; & quidem quoties id sit, ut quaedam ex illis sint verae, quaedam vero falsae, quòd tum augendo veras, falsae tantundem diminuantur, & contra. Quibus explicatis, tradit, quâ ratione, ad abbreviandam terminorum multitudinem, secundus terminus in qualibet aequatione ope praedictae transmutationis tolli possit; ita ut in Quadratis aequationibus affectiones sub latere, in Cubicis sub quadrato, in Quadrato-quadratis sub cubo, &c. evanescant. Post hæc, quando quaedam ex radicibus verae sunt, quaedam vero falsae, (id quod ex signorum serie manifestum sit) declarat, facile esse ejusdem transmutationis beneficio efficere, ut radi-

radices omnes evadant vera. Porro, quemadmodum equationes Cubicae atque Quadrato-quadrata omnes per eandem curvam lineam solvi possunt, utpote per aliquam trium Consectionum; & rursus Surdesolidae atque Quadrato-cubicae omnes per aliam curvam, qua uno gradu magis est composita quam sectiones Conicae, atque sic ulterius; sic ut binae priores juxta eandem regulam construi queant, sicut etiam binae posteriores per aliam regulam: Attamen cum in his altioribus equationibus ob multitudinem terminorum & variationem signorum + & — plurima inde (ut diximus) nascantur formulae, regulaeque illa valde foret difficilis ac longa: docet quo pacto equationes illas attollere liceat, hoc est, Surdesolidas reducere ad Quadrato-cubicas, atque simul efficere, ut, si quae terminorum loca in illis desint, ipsa repleta existant, ut tandem, si quaedam ex radicibus falsa, quaedam autem vera sint, ipsae equationes transmutari possint in alias, ubi radices omnes sint verae, ipsaeque secundum eandem constructionis regulam inveniri possint. Praeterea, quoniam equationes frequenter fractionibus & surdis numeris involuta occurrunt, aut ipsae etiam prolixos numeros continent; quo fit, ut aut minus expediat resolvantur feliciterque explicentur, aut non nisi operosorem in resolvendo industriam requirant: docet deinceps, quo pacto ad evitandas fractiones illas atque surdos numeros, sicut etiam ad transmutandos vastos illos numeros in faciliores, radices earum multiplicari aut dividi possint per quantitatem aliquam cognitam sive numerum. Id quod infervire insuper potest ad inveniendas radices proximas veris, alioquin irrationales; quemadmodum etiam ad reddendum quantitatem cognitam alicujus termini in equatione aequalem cuidam alteri datae. Ceterum ne quid desit, quod ad intelligendas radices alicujus equationis requiratur, ostendit ipsas interdum sive veras sive falsas solummodo imaginarias esse. Itaque, licet semper in qualibet equatione tot talesque, quales supra diximus, imaginari liceat, nonnunquam tamen nullam reperimus quantitatem, quae aliquibus ex ipsis respondeat.

Postquam igitur ea, quae ad equationum recognitionem atque emendationem pertinent, exposita sunt, & quidem ex equationum cognitione (ut supra admonuimus) dependeat quoque Problematum cognitio, ac prout aequatio est vel Quadrata, vel Cubica aut Quadrato-quadrata, vel Surdesolidae aut Quadrato-cubica, vel plurimum denique dimensionum, Problema, quod ad ipsam reducitur, dicatur vel Planum, vel Solidum, &c; illudque exinde construi queat vel per rectas lineas & Circulos, vel per Sectiones Conicas, vel per lineam curvam uno vel pluribus gradibus magis compositam: Hinc, proutquam ad equationum resolutionem accedit, ac Problema propositum ex proprio suo

Linearum genere solvit, tradit, quo pacto post transmutationes requisitas, quando Problema est Planum & æquatio ad Cubum aut Quadrato-quadratum adjcendis, ipsa dividi atque reduci possit ad Quadratum, ita ut deinde regule accircini beneficio, sicut primo libro monstratum fuit, resolvi queat; ac denique quid in genere observandum sit circa reliquas superiores equationes. Ita ut post institutas illas divisiones, quando æquatio ad tres quatuorve dimensiones assurgit ipsaque amplius dividi nequit, asserere liceat, Problema, quod ad æquationem illam perductum fuit, Solidum existere, nec inde minus visum reputandum esse, illud per rectas lineas & circulares expedire velle, quam adhibere Conicas sectiones in constructionem eorum, qua per regulam & circinum solvi possunt.

Quibus explicatis, accingit se deinceps ad Solidorum Problematum constructionem, postquam reducta sunt ad æquationem trium aut quatuor dimensionum, & in æquatione secundus terminus est sublatiss. Eadem ita preparata, docet, unicâ regulâ ope Parabola facile ac expedire posse construi. In quo sanè eximium atque summi ejus ingenii artificium elucet, à nullo (quod sciam) ante vel excogitatum vel ostensum. Cæterum ut hujus regule facilitas ac usus in Solidorum Problematum constructionibus eniteat, ipsam deinde, in solvendis nobilissimis binis illis, ac celebratis, nec non antiquitus usque adeo agitatiss. Problematis; altero scilicet de duabus mediis proportionalibus inter duas datas inveniendis; altero autem de dividendo angulo in tres æquales partes, adhibet. Quæ brevius expeditiusque, quam ab aliquo hætenus ostensum est, solius Circuli & Parabola ope, scientificè atque Geometricâ ratione resolvit. Vbi tandem declarat (quod animæ ad versionem dignum) in Problematis Solidis omnibus, postquam ad æquationem trium quatuorve dimensionum reducta sunt, non secus hanc regulam ad explicandas earum radices requiri, quam quatenus ipsa adhibenda est ad inveniendas duas medias proportionales inter duas datas lineas; aut ad secandum datum angulum in tres æquales partes. Quandoquidem natura illarum non sinit, ut terminis simplicioribus, quam per certa quadam Cuborum latera, quorum contentum cognoscitur, aut per sub-tensas quorundam arcuum, quorum triplum datum est, exprimantur; neque etiam per constructionem aliquam, quæ simul generalior & simplicior sit, determinentur.

Finitâ verò Solidorum Problematum constructione, aggreditur demum Surdæ solidorum constructionem, hoc est, eorum quæ ad æquationem 5 aut 6 dimensionum reducuntur, & ad quarum constructionem curva linea adhibenda est, quæ uno gradu magis est composita quam sectiones Conicæ.

Quam

Quam ut breviter ac unius regula beneficio resolvere doceat, observari vult ea, quæ supra monuimus, nimirum ut æquationes quinque dimensionum attollantur ad sex dimensiones, ipsæque demum, si opus est, transmutentur in alias, quarum radices omnes sint veræ. Qualem autem & quantum in hisce Problematis construendis Geometram se prodiderit Auctor, sanè si id ipsum ex superioribus perspicere cuipiam non contigerit, illud demum vel ex hac sola artificiosissima atque planè stupenda eorum constructione Geometrica, antea ne cogitata quidem, nedum inventa, latere ipsum non potest. E quibus tandem colligere licet, quòd, postquam omnia Geometrie Problemata ad unum quasi Problema revocata fuerint, quod est, ut quaratur tantummodo longitudo quarundam linearum rectorum, quæ alicujus æquationis sint radices, reductis-que ad eandem constructionem, quæ ejusdem generis existunt, tradita simul sit via eadem resolvendi. Adèò ut nullum Problema tam difficile vel arduum, modò æquationem 5 aut 6 dimensionum non excedat, reperiri queat, quòd hujus Geometrie Methodo solvi seu construi non possit.

COMMENTARIJ

I N

LIBRVM TERTIVM.



VERùm sæpè accidit, quòd quædam harum radicum sint falsæ, seu minores quàm nihil: ut, si supponatur x designare quoque defectum alicujus quantitatis, puta 5.] Hoc est, quòd x æquetur — 5, vel $x + 5$ sit æquale 0. Quod non ineptè explicatur per eum, qui plus debet quàm est solvendo; vel, cùm id, quod reliquatur, designamus per —. Quòd referenda est jucunda atque ingeniosa quæstio, à laudatissimæ memoriæ, Mauritio, Principe Auriaco, atque Confederati Belgii governatore, olim excogitata, quam Amplissimus & Prudentissimus Vir D. Henricus Stevinus, Simonis filius,

Na

Do-

Dominus in Alphen, paternarum virtutum hæres unicus, ex pluribus monumentis, ad vitam communem utilissimis, & publicâ luce dignissimis, quæ inter adversaria parentis possidet, pro sua liberalitate mihi communicavit.

A & B, societatem incuntes, lucrati sunt 12 aureos; quorum A expendit aureos 5; B autem debet aureos 2, hoc est, habet — 2 aureos. Quæritur quantum utrique ex summa debeatur? Respondetur, solvendos esse a B ipsi A, 8 aureos, quamvis lucrum huc esse sit manifestum.

Aliud exemplum de damno.

Personæ duæ A & B jacturam faciunt 12 aureorum, hoc est, habent — 12 aur. Cum igitur A contribuit 5 aur., & B — 2 aur., manifestum sit, ipsi A ex natura quæstionis deberi — 20 aureos, & ipsi B + 8 aur., hoc est, B habebit 8 aureos; etiam si jacturam factam esse constet.

Quamvis autem non sit usitatum, ut qui aliquid habet in bonis societatem ineat cum eo, qui minus habet quàm nihil; tamen casus occurrere possunt, in quibus hoc contingit. Exempli gratiâ: Duo mercatores Amstelodami habitantes habent quisque institorem suum Venetiis, & quia institoribus istis non satis fidunt, sciuntque inter ipsos esse inimicitias, mandant illis per literas, ut sibi invicem rationem reddant omnis pecuniæ, ad dominos suos pertinentis, quam penes se habebunt eo tempore, quo literas istas accipient; atque si unus fortè aliquid debeat, ut hoc ex alterius pecunia solvatur, & cum residuo ita mercaturam faciant, ut unus nihil emat vel vendat, nisi cum alterius consensu. Ipsi autem mercatores qui certò non sciunt, quid Venetiis eo tempore sint habituri, quo literæ istæ eò pervenient, talem inter se societatem ineunt, ut quisque lucrum aut damnum pro ratione pecuniæ, quam tunc habuerit, sit accepturus. Quibus positis, si contingat unum habere 3000 aureos, alium verò debere 2000 aureos, his 2000 ex alterius pecunia persolutis, tria tantum aureorum millia pro mercibus emendis remanebunt; ex quibus si lucrum fiat duodecim millium aureorum, quod est quadruplum pecuniæ: sequitur ex vi societatis illum qui habuit 5 millia debere 20 millia lucrari, & alium

& alium 8 millia amittere. Contra verò si damnum sit 12 millium, qui habuit 5 millia debet amittere 20 millia, quadruplum nempe suæ pecuniæ; alius autem 8 millia lucrari debet, propterea quod à priori sumpserit 2 millia, quæ si emendis mercibus impensa fuissent, damnum 8 millium ei attulissent.

Porro radices hæ falsæ non inconvenienter in Geometria explicantur retrogrediendo, hoc est, ut, quæ designantur per —, retrocedant, sicut illæ, quæ denotantur per ÷, progrediuntur. Cujus rei exemplum post videbitur.

Inservit autem earum cognitio ad inveniendas veras radices, quippe, falsis cognitis, æquationes facili divisionis ope ad pauciores dimensiones reducuntur, ex iisque veræ eruntur. Cujus rei exemplum in sequentibus habebitur.

Accedit & hoc, quod, postquam tam falsæ quàm veræ radices alicujus æquationis fuerint inventæ, earum beneficio ad plenam totius quæstionis cognitionem atque solutionem perducamur, & casus nonnullos detegamus, de quibus nobis antea nihil certi constabat. Cujus rei exemplum sequentia itidem suppeditabunt.

Vnde liquidò constat, quòd Æquationis summa, quæ plures radices continet, dividi semper possit per binomium, quod compositum est ex quantitate incognita, minus valore alicujus ex veris radicibus, quæcunque illa tandem sit, aut plus valore alicujus ex falsis.] Hoc enim ex Æquationis, quæ plures radices admittit, constitutione manifestum est: cum æquatio quævis producat ex suis radicibus, in se invicem ductis. Quemadmodum ab Authore fuit explicatum. Vnde fit, ut rursus per illas dividi possit, cum id, quod multiplicatione componitur, rursus divisione resolvatur.

Sic si ponatur $x \propto a$, hoc est, $x - a \propto 0$, & rursus $x \propto b$, hoc est, $x - b \propto 0$, & denique $x \propto c$, hoc est, $x - c \propto 0$, atque multiplicemus $x - a \propto 0$ per $x - b \propto 0$, & rursus productum per $x - c \propto 0$: exurget Æquatio $x^3 - axx + abx - abc \propto 0$.

$$-b \quad +bc$$

$$-c \quad +ac$$

Quæ dividi potest per $x - a \propto 0$, per $x - b \propto 0$, & per $x - c \propto 0$; sed non per x plus vel minus ullâ aliâ quantitate. Si autem eadem æquatio rursus multiplicetur per $x + d \propto 0$, (supponendo x desi-

gnare quoque defectum alicujus quantitatis, utpote d , hoc est, xx quari $-d$) producat Æquatio

$x^4 - ax^3 + abxx - abcx - abcd \infty 0$. Quæ dividi potest

$$\begin{array}{r} -b \quad +bc \quad +abd \\ -c \quad +ac \quad +bcd \\ +d \quad -ad \quad +acd \\ \quad -bd \\ \quad \quad -cd \end{array}$$

per $x - a \infty 0$, per $x - b \infty 0$, per $x - c \infty 0$, & per $x + d \infty 0$, & non per x plus vel minus ullâ aliâ quantitate.

C *Cujus divisionis ope dimensiones ejus in tantum diminuantur.*] Sic dividendo æquationem præcedentem, quatuor dimensiones habentem, per $x + d \infty 0$, orietur Æquatio

$x^3 - ax^2 + abx - abc \infty 0$. In quâ incognita quantitas tres

$$\begin{array}{r} -b \quad +bc \\ -c \quad +ac \end{array}$$

duntaxat dimensiones habet. Quâ rursus divisâ per $x - c \infty 0$, prodibit $xx - bx + ab \infty 0$, æquatio duarum dimensionum. Quæ denuo, per $x - b \infty 0$ divisâ exhibet $x - a \infty 0$, æquationem simplicem.

Vnde perspicere licet, quâ ratione, in qualibet Æquatione , plures radices habente, quantitas cognita secundi termini, æqualis sit summæ omnium radicum; & quantitas cognita tertii termini, æqualis summæ productorum ex singulis binis; & quantitas cognita quarti termini, æqualis summæ productorum ex singulis ternis, atque ita porro; at verò quantitas cognita ultimi termini sive ipse ultimus terminus, æqualis producto ex omnibus.

Sic cum in æquatione $x^4 - 9xx + 26x - 24 \infty 0$ tres sint radices 2, 3, & 4, quæ designantur per a, b , & c : erit earum summa 9, quæ denotatur per $-a - b - c$, æqualis -9 , quantitati cognitæ secundi termini $-9xx$. Summa autem productorum ex singulis binis 26, quæ denotatur per $+ab + bc + ac$, æqualis $+26$, quantitati cognitæ tertii termini $+26x$. Et productum ex ipsis tribus, 24, quod denotatur per $-abc$, æqualis -24 , quantitati cognitæ ultimi termini, sive ipsi ultimo termino.

Eodem modo, si fuerit Æquatio talis: $x^4 - 4x^3 - 19xx + 106x - 120 \infty 0$, cujus radices sunt 2, 3, 4, & -5 , atque designantur per $+a, +b, +c$, & $-d$: disponatur ipsa, ut termini,

ni, in quibus incognita quantitas x pares dimensiones habet, unam constituent æquationis partem, & reliqui alteram, hoc modo: $x^4 - 19xx - 120 \propto 4x^3 - 106x$. Eodem videlicet quo hæc: $x^4 + abxx - abcd \propto + ax^3 + abcx$. Præstat enim

$+bc$	$+b$	$-abd$
$+ac$	$+c$	$-bcd$
$-ad$	$-d$	$-acd$
$-bd$		
$-cd$		

illam hîc ita considerare, ut ea, quæ proponuntur, melius explicentur: quoniam hoc pacto radices, earumque producta simul addita omnino cum quantitativis cognitis terminorum æquationis, eorumque signis conveniunt. Et manifestum est, summam harum radicum efficere $+4$, & æqualem esse $+4$, quantitati cognite secundi termini $4x^3$. Deinde summam productorum ex singulis binis efficere -19 , & æqualem esse -19 , quantitati cognite tertii termini $19xx$. Postea summam productorum ex singulis ternis efficere -106 , & æqualem esse -106 , quantitati cognite quarti termini $106x$. Denique productum ex ipsis omnibus in se invicem ductis efficere -120 , & æqualem esse -120 , quantitati cognite ultimi termini, sive ipsi ultimo termino 120 . Quæ porro, quo pacto intelligenda sint de Æquationibus, in quibus non omnes termini extant, docebit appendix de Cubicarum Æquationum resolutione, quam hisce Commentariis subjunximus, ubi ista fusiùs pertractantur.

Ex quibus etiam cognoscitur, quot veræ & quot falsæ radices in unaquaque Æquatione haberi possint. Nimirum, tot in ea veras haberi posse, quot variationes reperiuntur signorum $+$ & $-$; & tot falsas, quot vicibus ibidem deprehenduntur duo signa $+$, vel duo signa $-$, quæ se invicem sequuntur.]

Notandum, hæc concernere æquationes, quæ producuntur ex suis radicibus, in se invicem ductis, quemadmodum pag. 69 & 70 est ostensum, quod & de cæteris regulis, ubi signorum $+$ & $-$ fit mentio, est observandum. Ut satis declarant priora verba: *Ex quibus etiam cognoscitur*. quæ horum verborum cum prioribus coherentiam demonstrant: cum aliàs fieri posset, ut in qualibet Æquatione non tot radices haberentur, quot incognita quantitas habet

quaquam consonare: concludo æquationem propositam explicabilem tantum esse de unica radice vera, & reliquas duas non nisi imaginarias existere; neque ipsam æquationem magis ex multiplicatione trium radicum productam esse, quàm superiorem $x^3 - 6xx + 13x - 10 = 0$.

Eodem modo, si habeatur $x^3 - px - q = 0$, seu $x^3 - px - q = 0$; + $px + q = 0$: invenio è priori suppositione tres falsas radices; è posteriori verò duas veras & unam falsam. Quibus inter se collatis, ut consensus earum appareat, invenio, æquationem neminem propositam unam tantum admittere radicem, nempe falsam; duasque reliquas esse imaginarias: ac proinde æquationem non posse procreari multiplicatione trium radicum.

Similiter, si fuerit $x^3 - px + q = 0$, seu $x^3 - px + q = 0$; quoniam è priori suppositione invenio duas falsas & unam veram radicem; & è posteriori duas itidem falsas & unam veram: cognosco, æquationem propositam, multiplicatione trium radicum, quarum duæ sunt falsæ & una vera, produci posse.

Non secus, si habeatur $x^3 - px - q = 0$, seu $x^3 - px - q = 0$; + $q = 0$; video in priori suppositione reperiri duas veras radices, cum una falsa, atque in posteriori similiter duas veras, & unam falsam: adeo ut concedendum sit, ipsam procreari posse ex multiplicatione trium radicum, quarum duæ sunt veræ, & tertia falsa. Idem de aliis sentiendum. Vbi notandum, radices veras & falsas alicujus æquationis semper esse reâles, seu existentes, hoc est, quantitatem aliquam aut defectum quantitatis designantes, quarum valor Arithmetice vel Geometricè exprimi potest; imaginarias verò non item. Ut in æquatione $xx - 4x + 5 = 0$. Quamvis enim in ea duas nobis imaginari possimus radices; tamen nulla iis respondet quantitas; nec, quocunque tandem modo vel augeantur, vel diminuuntur, aliæ quàm imaginariæ fieri possunt. Quod sanè nemini mirum videbitur, modò ex iis, quæ pag. 165 explicuimus, intellexerit, æquationem propositam esse impossibilem; neque ullam veram nec falsam radicem admittere, adeoque nec quantitatem aliquam, quæ ipsis respondeat, inveniri posse. Nisi velis; radices ejus esse $x = 2 + \sqrt{-1}$, & $x = 2 - \sqrt{-1}$, quarum certè valor

valor nullo modo comprehendi potest. Non magis quàm si illarum quantitatem Geometricè invenire velimus. Quandoquidem in figura p. 7, describendo ex centro N, intervallo lineæ NL ∞ 2, (utpote æqualis semissi ipsius 4, quæ titatis cognitæ secundi termini) circulum LQR, faciendoque rectam LM ∞ $\sqrt{5}$ (utpote æqualem radici quadratæ ultimi termini 5); circulus descriptus LQR neutiquam secare aut tangere potest rectam MR, quæ ipsi LM ducitur perpendicularis, ad duas in ea radices designandas.

Idem de altioribus æquationibus est intelligendum pag. 85, 86, & 87, cùm Circulus centro E descriptus Parabolam FAG secare aut tangere nequit; ut & pag. 99, cùm Circulus CNQ curvam ACN neutiquam vel tangit vel secat.

- E. *Nimirum mutando signa omnia + & —, quæ in 2^a, 4^a, 6^a, aliisve locis reperiuntur, qui per numeros pares designantur; reliquis 1^a, 3^a, 5^a, similiumque locorum, qui per impares numeros designantur, non mutatis.]* Quæ locum quoque habent in æquationibus incompletis, ubi quidam ex imparibus locis desunt, qui cyphrâ sunt supplendi. Ut si fuerit $x^3 \infty^* - 8x - 24$ seu $x^3 8 0 x x + 8x + 24 \infty 0$, mutando signa + & — secundi & quarti loci in contraria, fit æquatio $x^3 8 0 x x + 8x - 24 \infty 0$, seu $x^3 \infty^* - 8x + 24$, cujus radix est $x \infty 2$, unde radix prioris fit $x \infty - 2$.

Eodem modo si sit $x^3 \infty^* 1201x + 14400$, seu $x^3 8 0 x x - 1201x - 14400 \infty 0$, mutatis signis 2^a & 4^a loci, fiet æquatio $x^3 8 0 x x - 1201x + 14400 \infty 0$, seu $x^3 \infty^* 1201x - 14400$, cujus radices sunt $x \infty 25$, & $x \infty \sqrt{732 \frac{1}{2}} - 12 \frac{1}{2}$, nec non $x \infty - \sqrt{732 \frac{1}{2}} - 12 \frac{1}{2}$. Vnde radices prioris erunt $x \infty - 25$, & $x \infty 12 \frac{1}{2} - \sqrt{732 \frac{1}{2}}$, nec non $x \infty 12 \frac{1}{2} + \sqrt{732 \frac{1}{2}}$. Et sic de aliis.

- F. *Vnde si scribamus summam præcedentem, substituendo ubique y pro x, inveniatur*

$$\begin{aligned} y^4 &\div 12 y^3 + 54 y^2 - 108 y + 81 \\ &+ 4 y^3 - 36 y^2 + 108 y - 108 \\ &\quad - 19 y^2 + 114 y - 171 \\ &\quad - 106 y + 318 \\ &\quad - 120 \end{aligned}$$

$y^4 - 8 y^3 - 1 y^2 + 8 y \infty^* \infty 0$, vel $y^4 - 8 y^3 - 1 y^2 + 8 y \infty 0$. Vbi vera radix, quæ erat 5, jam est 8, propter ternarium

narium ipsi additum.] Notandum hic est, quòd, dum, augendo ternario veram radicem æquationis propositæ $x^4 + 4x^3 - 19xx - 106x - 120 \propto 0$, in æquationem incidimus, tres tantum dimensiones habentem, cujus ideo non nisi tres sunt radices, numerus 3, quo vera radix æquationis propositæ est aucta, sit æqualis alicui ex falsis radicibus, ut liquet ex iis, quæ ab Autore p. 72 paulò post explicantur. Ita, quoniam, diminuendo ternario veras radices æquationis $x^4 - 4x^3 - 19xx + 106x - 120 \propto 0$, incidimus in æquationem $y^4 + 8y^3 - 1yy - 8y^* \propto 0$, vel $y^4 + 8yy - 1y - 8 \propto 0$, innotescit, unam ex veris radicibus esse 3. Et sic de aliis.

Nimirum, diminuendo veras radices, quantitate cognitâ secundi termini divisâ per numerum dimensionum primi, si unus ex hisce duobus terminis notatus fuerit signo + & alter signo —.] Vel etiam hoc modo: *Nimirum, diminuendo quantitatem cognitâ secundi termini divisâ per numerum dimensionum primi, unaquâque verarum radicum, si unus ex hisce duobus terminis notatus fuerit signo + & alter signo —.* Ut ad tollendum secundum terminum æquationis $x^4 - 2ax^3 + 2a^2cx - 2a^3x + a^4 \propto 0$, divido $2a$ per 4 , & provenit $\frac{1}{2}a$: unde faciendo $\frac{1}{2}a - x \propto z$, hoc est, $\frac{1}{2}a - z \propto x$, scribendum est

$$\begin{array}{rcl}
 + \frac{1}{16}a^4 - \frac{1}{2}a^3z + \frac{3}{2}a^2az - 2az^3 + z^4 & \text{pro} & x^4 \\
 \& - \frac{1}{2}a^4 + \frac{1}{2}a^3z - 3a^2az + 2az^3 & \text{pro} - 2ax^3 \\
 \& + \frac{1}{2}a^4 - 2a^3z + 2a^2az & \text{pro} + 2a^2cx \\
 \& - \frac{1}{2}a^4 + a^3z - ccz & \text{pro} - ccx \\
 \& - a^4 + 2a^3z & \text{pro} - 2a^3x \\
 \text{tum} + a^4 & & , \& \text{exsurget}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 + \frac{1}{16}a^4 + a^3z + \frac{3}{2}a^2az & * & + z^4 \propto 0, \text{ æquatio,} \\
 - \frac{1}{2}a^4 + a^3z - ccz & &
 \end{array}$$

secundo carens termino, & ab illa Autoris differens tantum in quarto termino, qui hic per + denotatur, & illic per —. Vnde fit, ut per ea, quæ pag. 70 sunt ostensa, æquationes hæc in eo tantum inter se differant, quòd falsæ illius æquales sint veris hujus, & contra, atque ita radicum mutua sit reciprocatio. Quod in aliis quoque evenire reperietur.

Vbi porro operæ pretium est considerare, quòd, tollendo secundum terminum Equationis $x^4 + 2ax^3 + \frac{1}{2}a^2xx - 2acx - aacc \infty 0$, (quæ quidem invenitur, cum pro linea CE in quæstione pagin. 83 ponitur x) in eandem incidamus Equationem, quam invenimus tollendo secundum terminum præcedentis: $x^4 - 2ax^3 + \frac{1}{2}a^2xx - 2a^3x + a^4 \infty 0$, quæ ab illa omnino est diversa, resultans ex investigatione lineæ DF.

Deinde animadversione dignum est, quòd hâc sublatione secundi termini Equationes pagin. 6 & 7 in faciliores sic transmutentur, ut earum radices statim se prodant, nec aliâ regulâ ad eas inveniendas opus esse videatur. Etenim, tollendo secundum terminum æquationis $zz \infty az + bb$ seu $zz - az - bb \infty 0$, si dividatur a per 2, fit $\frac{1}{2}a$, ac ponatur $z - \frac{1}{2}a \infty x$, sive $z \infty x + \frac{1}{2}a$,

$$\begin{array}{rcl} \text{atque pro } zz \text{ reponatur } & xx + ax + \frac{1}{4}aa, \\ \text{nec non pro } -az & & -ax - \frac{1}{2}aa, \\ \text{\& addatur} & & -bb. \end{array}$$

resultabit æquatio hæc $xx^* - \frac{1}{4}aa - bb \infty 0$, vel $xx \infty \frac{1}{4}aa + bb$ cujus radix est $x \infty \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, vel $x \infty -\sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. Vnde sequitur radicem prioris æquationis $zz \infty az + bb$ fore $z \infty \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, vel $z \infty \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. Quæ radices, cum vera tum falsa etiam inveniuntur tollendo secundum terminum, hoc pacto: ponatur

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}a - z \infty x, \text{ seu } z \infty \frac{1}{2}a - x, \\ \frac{1}{2}a - x \\ -\frac{1}{2}ax + xx \\ \hline \frac{1}{4}aa - \frac{1}{2}ax \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{\& scribatur } & \frac{1}{4}aa - ax + xx \text{ pro } zz, \\ \text{atque } & -\frac{1}{2}aa + ax & \text{pro } -az, \\ \text{tum } & -bb \end{array}$$

Et emerget Aequatio $-\frac{1}{4}aa - bb^* + xx \infty 0$, vel $xx \infty \frac{1}{4}aa + bb$. eadem quippe, quæ invenitur, ponendo $z \infty \frac{1}{2}a + x$ (quod similiter in reliquis sequentibus quadratis Equationibus locum habet), & fit, ut supra, $x \infty \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, vel $x \infty -\sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$; ac proinde $z \infty \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, vel $z \infty \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$.

Eodem

Eodem modo, quia auferendo secundum terminum Aequationis $yy \infty -ay + bb$, seu $yy + ay - bb \infty 0$, ponitur $y + \frac{1}{2}a \infty z$, five $y \infty z - \frac{1}{2}a$,

atque pro yy scribitur $zz - az + \frac{1}{4}aa$,

& pro $-ay$ $+az - \frac{1}{2}aa$,

atque deinde $-bb$:

prodibit Aequatio $zz^* - \frac{1}{4}aa - bb \infty 0$, vel $zz \infty \frac{1}{4}aa + bb$,
cujus radix est $z \infty \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, vel $z \infty -\sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$: hinc
radix prioris erit $y \infty \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb} - \frac{1}{2}a$, vel $y \infty -\sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$
 $- \frac{1}{2}a$. Quae quidem falsa & vera radix invenitur quoque tollendo
secundum terminum Aequationis hac ratione: videlicet, supponendo y designare etiam defectum alicujus quantitatis, quae
major sit quam $\frac{1}{2}a$, Exempli causa, $y \infty -\frac{1}{2}a - z$,

& substituendo $\frac{1}{4}aa + az + zz$ loco yy ,
& $-\frac{1}{4}aa - az$ loco $+ay$,
tum $-bb$:

unde fit Aequatio $-\frac{1}{4}aa - bb^* + zz \infty 0$, vel $zz \infty \frac{1}{4}aa + bb$,
cujus radix est $z \infty \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, vel $z \infty -\sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$,
atque adeo $y \infty -\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, vel $y \infty -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$. ut ante. Quem modum, tollendi secundum terminum,
tanquam diversum ab eo, qui ab Authore pag. 73 est ostensus,
notare potes, cum primus & secundus terminus eodem signo
+ vel - sunt adfecti,

Similiter, cum ad tollendum secundum terminum Aequationis
 $zz \infty az - bb$, vel $zz - az + bb \infty 0$, ponendum sit

$z - \frac{1}{2}a \infty x$, vel $z \infty x + \frac{1}{2}a$,

& scribendum $xx + ax + \frac{1}{4}aa$ pro zz ,

& $-ax - \frac{1}{2}aa$ pro $-az$,

& addendum $+bb$:

proveniet Aequatio $xx^* - \frac{1}{4}aa + bb \infty 0$, vel $xx \infty \frac{1}{4}aa - bb$,
cujus radix est $x \infty \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$, vel $x \infty -\sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$. Et fit
radix prioris $z \infty \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$, vel $z \infty \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa - bb}$.
Quae radix utraque vera est, & alio item modo inveniri potest, si
nimirum ponatur $\frac{1}{2}a - z \infty x$ five $z \infty \frac{1}{2}a - x$, & substituatur

$$\begin{array}{l} \frac{1}{2}aa - ax + xx \text{ in locum } zz, \\ \& -\frac{1}{2}aa + ax \text{ in locum } -az, \\ \& addatur + bb: \end{array}$$

exsurget æquatio $-\frac{1}{2}aa + bb^* + xx \infty 0$, vel $xx \infty \frac{1}{2}aa - bb$,
cujus radix est $x \infty \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$, vel $x \infty -\sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$. Et fit
prioris radix $x \infty \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$, vel $x \infty \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$.
ut supra.

Denique, quoniam tollendo secundum terminum Æqua-
tionis $zz \infty -az - bb$, vel $zz + az + bb \infty 0$, ponendum est
 $z + \frac{1}{2}a \infty x$ sive $z \infty x - \frac{1}{2}a$, & subrogandum

$$\begin{array}{l} xx - ax + \frac{1}{2}aa \text{ in locum } zz, \\ \& + ax - \frac{1}{2}aa \text{ in locum } +az, \\ \text{atque addendum} \quad + bb: \end{array}$$

productetur æquatio $xx^* - \frac{1}{2}aa + bb \infty 0$, vel $xx \infty \frac{1}{2}aa - bb$,
cujus radix est $x \infty \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$, vel $x \infty -\sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$. Vnde
radix prioris fit $z \infty \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb} - \frac{1}{2}a$, vel $z \infty -\sqrt{\frac{1}{2}aa - bb} - \frac{1}{2}a$.
Quæ utraque hoc casu est falsa, & hæc etiam viâ inveniri potest,
nimirum supponendo z designare quoque defectum alicujus
quantitatis, quæ major sit quàm $\frac{1}{2}a$, utpote ponendo $z \infty -\frac{1}{2}a - y$,
& substituendo

$$\begin{array}{l} +\frac{1}{2}aa + ay \quad + yy \text{ loco } zz, \\ \& -\frac{1}{2}aa - ay \quad \text{loco } +az, \\ \text{tum addendo} \quad + bb, \end{array}$$

unde provenit æquatio $-\frac{1}{2}aa + bb^* + yy \infty 0$, vel $yy \infty$
 $\frac{1}{2}aa - bb$, cujus radix est $y \infty \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$, vel $y \infty -\sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$;
atque adeò $z \infty -\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$, vel $z \infty -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$.
ut ante.

Eâdem ratione. tolletur secundus terminus reliquarum Æqua-
tionum quadratarum pag. 6 & 7, quæ similiter hæc operatione
eò reducuntur, ut ad ipsarum radices inveniendas hæc regula suffi-
cere videatur. - e

*Intellige
Æqua-
tiones, in
quibus
z aqua-
tur duo-*

Verùm enim verò animadvertendum est, quòd, sicut Æquatio
quælibet Quadrata composita sublatione secundi termini ad a-
liam reducitur, in qua duo tantum sunt termini, sic nulla Cubica
esse possit, pluribus terminis constans, (ex quibus 13 casus confici
pos-

ci possunt) quæ hæc ratione non reducatur semper ad aliquam *bus aut*
trium sequentium formularum: *tribus*

$$z^3 \infty^* - pz + q$$

$$z^3 \infty^* + pz + q$$

$$z^3 \infty^* + pz - q.$$

terminis,
per +,
aut per
+ & -,
simul
junctis.

Idem de Quadrato-quadratis Æquationibus, quæ ex pluribus terminis sunt compositæ, quarumque 42 diverſi modi extare poſſunt, eſt intelligendum. Cum enim per regulam pag. 79 expoſitam ad Cubicas reduci queant, quarum radices duas habent diſſenſiones & termini omnes ſunt completi, ſic nulla itidem earum eſſe poteſt, quæ hæc ſublatione non reducatur ad aliquam trium prædictarum formularum.

Sic poſtquam Æquatio Quadrato-quadrata $1 \frac{1}{2} x + 8 c - 26 \frac{1}{2} - 68 x - 84 \infty 0$ per dictam regulam reducta eſt ad Cubicam $x^6 - 100 x^4 + 2900 xx - 10000 \infty 0$, in qua omnes termini ſunt completi, tollitur ſecundus terminus, hoc modo: Diviſis 100 per 3, fit $33 \frac{1}{3}$. Vnde ponendo $xx - 33 \frac{1}{3} \infty yy$, ſive $xx \infty yy + 33 \frac{1}{3}$, ſcribendum eſt

$$\begin{aligned} & . y^6 + 100 y^4 + 3333 \frac{1}{3} yy + 37037 \frac{1}{3} \text{ pro } x^6, \\ & \& - 100 y^4 - 6666 \frac{1}{3} yy - 11111 \frac{1}{3} \text{ pro } - 100 x^4, \\ & \& + 2900 yy + 96666 \frac{1}{3} \text{ pro } 2900 xx, \\ & \text{tum} \quad \quad \quad - 10000: \end{aligned}$$

fietque æquatio $y^6 - 433 \frac{1}{3} yy + 12592 \frac{1}{3} \infty 0$, vel $y^6 \infty^* + 433 \frac{1}{3} yy - 12592 \frac{1}{3}$, tertiæ formulæ. Vbi notandum, diſſenſionum numerum primi termini x^6 tantum pro 3 haberi, cum non ſit x^4 , x^3 , & x in tota ſumma. Id quod ſimiliter in ſublatione ſecundi termini æquationum Quadratarum, quarum radices duas diſſenſiones habent, eſt notandum. Quod ſi verò ponatur $33 \frac{1}{3} - xx \infty yy$, hoc eſt, $xx \infty 33 \frac{1}{3} - yy$, prodibit Æquatio $y^6 \infty^* + 433 \frac{1}{3} yy + 12592 \frac{1}{3}$, ſecundæ formulæ, à præcedenti tantum differens termino quarto, qui ibi ſigno + adſcitur, hæc verò ſigno -. Vnde fit, quod hujus æquationis falſæ radices æquales ſint veris illius, & contra.

Ad augendum valorem verarum radicum, & ad faciendum, ut *H*
radices omnes veræ evadant, ſciendum eſt, nos uti poſſe exemplo ab Authore propoſito pag. 74: nimirum, $x^6 + n x^4 - 6 n n x^4 + 36 n^3 x^3 - 216 n^4 xx + 1296 n^5 x - 7776 n^6 \infty 0$, tanquam regulâ ſeu canone, ad quantitatem, quâ veræ radices augendæ ſunt,

sunt, inveniendam, sicut annotavit Vir Nobilissimus D. Gothofridus ab Haestrecht, Mathematicum cultor eximius, hujusque scientiæ peritissimus. Si enim, exempli causâ, proposita sit Æquatio $x^6 + ax^5 + bx^4 - cx^3 - dxx + ex + f = 0$, oportet, neglectis omnibus terminis, in quibus signa + & - diversa sunt ab his, quæ in canone reperiuntur, nempe $b, c, \& f$, considerare tantum omnes reliquos, ut $a, d, \& e$. Vtpote $+ax^5$, quia in canone habetur $+nx^5$; & $-dxx$, quia in canone $-216n^4xx$; nec non $+ex$, quia in canone $+1296n^5x$. Qui quidem seorsim considerandi sunt, & quærenda quantitas n , quæ non sit minor quàm a , quia in canone habetur n , ubi in data Æquatione est e ; & cujus quadrato-quadratum non sit minus quàm $\frac{1}{216}d$, quia in canone habetur $216n^4$, ubi in data Æquatione est d ; nec non cujus sursolidum non sit minus quàm $\frac{1}{1296}e$, quia in canone habetur $1296n^5$, ubi in data Æquatione est e . Quantitate n sic inventâ, manifestè ex ipsa operatione demonstratur, si ponatur $y = 6n \propto x$, inventum iri Æquationem, in quâ nulla radix falsa esse potest, ut in exemplo Authoris. Quod Authori tam faciliè visum fuit, ut id explicare neglexerit.

I Ad multiplicationem radicum alicujus æquationis addatur sequens exemplum. Proponatur æquatio $y^6 \propto * + 433 \frac{1}{3}y + 12592 \frac{1}{3}$, cujus loco alia inveniendâ sit, cujus termini per numeros integros exprimantur. Supposito igitur $z \propto \frac{1}{3}y$, scribatur æquatio, hoc modo:

Et multiplicetur per nu- $y^6 \propto 80y^4 - 433 \frac{1}{3}y - 12592 \frac{1}{3} \propto 0$.
meros proportionales I. $\frac{1}{75} \cdot \frac{1}{258} \cdot \frac{1}{1000} \cdot$

fietque Æquatio $z^6 \propto 80z^4 - 392z - 340 \propto 0$, vel $z^6 \propto * + 392z + 340$, cujus radix z ad præcedentis radicem y est, ut 3 ad 10.

Quæ radicum multiplicatio inservire etiam potest inveniendis radicibus proximè veris, cum ipsæ sunt irrationales. Ut, ad inveniendam veram radicem æquationis $y^3 \propto 200y + 400$ (quæ irrationalis est) quàm proximè, ita ut differentia millesimâ parte unitatis minor sit: supposito $z \propto 1000y$,

scribo $y^3 \propto 80y - 200 \quad y - 400 \propto 0$,
& multiplico per I. 1000. 1000000. 1000000000.

& exsurget æquatio $z^3 \propto 80z - 200000000z - 400000000000 \propto 0$, vel $z^3 \propto * - 200000000z \propto 400000000000$, cujus radix z præcedentis radicis y est millecupla. Quocirca eliciendo radicem

cx

ex hac æquatione, methodo à Viëta tradita in tractatu de Numerosa Potestatum resolutione, invenietur & major quàm 15052, & minor quàm 15053. Quibus divisus per 1000 (quia præcedentis radicem multiplicavimus per 1000), fiet y major quàm $15\frac{12}{1000}$, & minor quàm $15\frac{13}{1000}$, adeò ut differentia inter hanc utramque inventam & veram millesimâ parte unitatis minor sit. Quod erat inveniendum. Porro quoniam æquatio proposita $y^3 \infty 200y + 400$ duas adhuc admittit falsas radices, quæ similiter sunt irrationales, quia ipsa per $y +$ vel $-$ nullo numero ultimum terminum dividende dividi potest, possunt ex eâdem ratione inveniri, mutato tantùm signo $+$ in $-$. Quarum equidem major excedet $13\frac{41}{1000}$, & minor deficiet à $2\frac{43}{1000}$, componentes simul veram inventam $15\frac{721}{1000}$. Cæterum, sicut æquationes ope multiplicationis à fractionibus liberantur, atque ad faciliores reducuntur, ita quoque interdum licet ipsas beneficio divisionis, quando tam prolixos numeros continent, ut earum resolutio non nisi operosiores industriam requirat, in faciliores transmutare. Vt si fuerit æquatio $x^3 \infty * + 203125x + 23437500$, & ejus loco alia desideretur, quæ minoribus numeris exprimat, dividenda est ipsa per numeros proportionales 1. 125. 15625. 1953125,

hoc pacto: $x^3 \infty 80xx - 203125x - 23437500 \infty 0$,

$$\begin{array}{r} 1. \quad 125. \quad 15625. \quad 1953125. \end{array}$$

& prodibit æquatio $y^3 \infty 80yy - 13y - 12 \infty 0$, vel $y^3 \infty * 13y + 12$, cujus radices sunt $+4$, -3 , & -1 , quibus per 125 multiplicatis (quoniam prioris radices per 125 divisimus) exsurgent radices prioris $+500$, -375 , & -125 .

Vbi porro notandum, quòd, postquam æquatio quælibet à fractionibus aut surdis numeris est liberata, atque in faciliorem transmutata, fieri non possit, ut ulla ex hujus radicibus, sive falsis, sive veris, sit numerus aliquis fractus. Quemadmodum facillè ex 7^{mo} Elementorum libro demonstrari potest. Adeò ut, si illa deinde sicut pag. 77 est ostensum dividi nequeat, concedendum sit, nullam ex radicibus sive falsis sive veris numero explicari posse, sed omnes esse irrationales.

Quibus ita constitutis, ut pateat quo pacto hæc radices surdis numeris sint exprimendæ, visum fuit ea, quæ ab ingeniosissimo Muddenio nostro circa hæc excogitata sunt, in medium adducere.

Hinc ut investigetur, quo pacto, exempli causâ, radices æquationis

tionis $zz - az - bb = 0$, quæ per $z + \text{vel} - b = 0$ dividi nequit, per surdas quantitates exprimi possint: suppono primum z esse æqualis simplici alicui quantitati surdæ, utputa, \sqrt{x} , & fit $z - \sqrt{x} = 0$. Quam, ut ad æquationem quadratam ejusdem formæ perducam, in qua secundus terminus est rationalis, multiplicare debeo per $z + \sqrt{x} = 0$. Sed quoniam sic non producitur æquatio, in qua etiam tertius terminus rationalis est, concludo radices æquationis propositæ hoc modo non posse denotari sive exprimi. Idem fit supponendo $z = \sqrt{x}$.

Quocirca statuendo nunc $z = y + \sqrt{x}$ seu $z - y = \sqrt{x} = 0$, oportet ipsam, ut ad æquationem quadratam ascendat, in qua rursus secundus terminus sit rationalis, multiplicare per $z - y + \sqrt{x} = 0$, & fit $zz - 2yz + yy = 0$, æquatio ejusdem formæ cum al-

lata, & in qua item tertius terminus rationalis est. Hinc comparando secundum terminum unius cum secundo alterius invenio $-2y = -a$, hoc est, $y = \frac{1}{2}a$. Tertius autem terminus cum tertio comparatus dat $yy - x = -bb$. In qua si in locum y subrogetur $\frac{1}{2}a$, habebit $\frac{1}{4}aa + bb = x$. Ac proinde cum pro quæsitis radicibus supposuerimus $z = y + \sqrt{x}$, & $z = y - \sqrt{x}$, erunt ipsæ: $z = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, & $z = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$.

Eodem modo si investigare velimus, quo pacto radices æquationis indivisibilis $yy + ay - bb = 0$ per quantitates surdas exprimi queant, statuatur (neglectâ suppositione ipsius $y = 8\sqrt{x}$) $y = z + \sqrt{x}$ seu $y - z = \sqrt{x} = 0$, eaque, ut ad æquationem quadratam assurgat, in qua rursus secundus terminus sit rationalis, multiplicetur per $y + z + \sqrt{x} = 0$, & fit $yy + 2zy + zz = 0$.

æquatio ejusdem formæ cum allata, & in qua etiam tertius terminus est rationalis. Vnde comparando secundum terminum hujus cum secundo illius invenitur $z = \frac{1}{2}a$. Tertius autem terminus cum tertio comparatus dat $x = \frac{1}{4}aa + bb$. Atque adeò, cum pro quæsitis radicibus supposuerimus $y = z + \sqrt{x}$, & $y = z - \sqrt{x}$, erunt ipsæ: $y = \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$, & $y = \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$.

Similiter, investigando num radices æquationis $zz - az + bb = 0$, quam per $z + \text{vel} - b = 0$ dividere non licet, per surdas quan-

quantitates exprimi queant, invenitur $\sqrt[3]{\frac{1}{2}aa - bb}$, & per $\frac{1}{2}a - \sqrt[3]{\frac{1}{2}aa - bb}$. Eodem modo procedatur in altioribus æquationibus.

E quibus perspicuum fit, hac ratione inveniri quoque simplicissimos surdos numeros, quibus radices hæc exprimere licet, atque ideo hinc etiam constare, quæ circa hæc à D^{no} des Cartes pag. 95 referuntur, nimirum: quod natura harum radicum non permittat, ut simplicioribus terminis exprimantur.

Vbi tandem etiam est advertendum, quod, quanto partes è quibus hæ radices componuntur pauciores numero existunt, tanto etiam quæsitum facilius obtineri possit, ac proinde in altioribus æquationibus conducere secundum terminum tollere, ita ut deinde, si res bene inspicatur, perpauca casus superfuturi sint.

Supponendum est $y \propto x \sqrt[3]{\frac{aa}{bb}}$, *deinde verò scribendum* **K**

$y^3 - 3aay + \frac{1}{b^3} \sqrt[3]{3} \propto 0$.] Etenim posita $y \propto x \sqrt[3]{\frac{aa}{bb}}$
 five $y \propto \frac{ax}{b} \sqrt[3]{3}$; erit $x \propto \frac{by}{a \sqrt[3]{3}}$, & $x \propto \frac{bby}{3aa}$, & $x^3 \propto \frac{b^3 y^3}{3a^3 \sqrt[3]{3}}$.

Quæ si in æquatione substituantur, habebit $\frac{b^3 y^3}{3a^3 \sqrt[3]{3}} - 3a \frac{by}{a \sqrt[3]{3}} + \frac{1}{b^3} \sqrt[3]{3} \propto 0$; hoc est, communi multiplicatore $3a^3 \sqrt[3]{3}$, fiet $b^3 y^3 - 3aab^3 y + 3a^3 \sqrt[3]{3} \propto 0$: ac proinde communi divisore b^3 , erit $y^3 - 3aay - \frac{1}{b^3} \sqrt[3]{3} \propto 0$. Quod erat demonstrandum.

Etenim aut quantitas cognita hujus binomii erit radix quæsitæ; aut Æquatio; per ipsam divisa, ad duas dimensiones erit reducta; ita ut deinde radix ejus, per ea, quæ primo libro sunt ostensa, inveniri queat. **L**

Sic æquatio superior pag. 76: $x^3 - 6xx + 13x - 10 \propto 0$ divisa per binomium $x - 2 \propto 0$ dat æquationem impossibilem $xx - 4x + 5 \propto 0$, & fit radix quæsitæ 2. Sic æquatio $x^3 \propto 1201x + 14400$ seu $x^3 \propto 1201x - 14400 \propto 0$ divisa per x Vide hic post in $+ 25 \propto 0$ dat æquationem $xx - 25x - 57600 \propto 0$ seu $xx \propto 25x + 576$, quæ juxta præcepta pag. 6 & 7 resoluta ostendit radicem quæsitam esse $12 \frac{1}{2} + \sqrt[3]{732 \frac{1}{2}}$. Appendice de Cubicorum

Huc etiam refer reductionem Æquationum Quadratarum, æquationum resolutione.
 cum Problema est Simplex.

Pp

Vt

*Reductio
Equatio-
num Qua-
dratarum,
cùm Pro-
blema est
Simplex.*

Vt si, verbi gratiâ, habeatur æquatio $xx \infty ax + ab$ seu $xx -$
 $+ bb$

$- ax - ab \infty 0$, poterit ea, inventis ipsius $ab + bb$ ultimi ter-
 $- bb$.

mini divisoribus $1, b, a + b$, & $ab + bb$, dividi per binomium
 $x + b \infty 0$, oriturque $x - a - b \infty 0$. Id quod ostendit, radicem
quæsitam esse $\infty a + b$, & Problema, quod ad hanc æquationem
reducitur, esse Simplex, hoc est, construi posse ducendo tantum
rectas lineas.

Eodem modo, si fuerit $xx \infty \frac{-ax + aa}{a + 1}$ seu $xx + \frac{ax}{a + 1} - \frac{aa}{a + 1} \infty 0$,
quoniam, ad tollendas fractiones, multiplicatâ primûm.

$$xx + \frac{ax}{a + 1} - \frac{aa}{a + 1} \infty 0$$

per quantitates proportionales $1, a + 1, aa + 2a + 1$,

fit æquatio $yy + aay - a^3 - aa \infty 0$,

atque hâc, ut ante, divisâ per binomium $y + aa + a \infty 0$, oritur
 $y - a \infty 0$: liquet, Problema, quod huc pertinet, non præter sim-
plex existere, & y esse ∞a , adeoque $x \infty \frac{a}{a + 1}$.

Haud secus Problema simplex erit, si obtineatur æquatio
 $xx \infty \frac{axx - aac}{a - c}$ seu $xx - \frac{axx}{a - c} + \frac{aac}{a - c} \infty 0$. Multiplicata enim
eâ per proportionales $1, a - c$, & $aa - 2ac + cc$, fit $yy - aay$
 $+ a^3c - aac \infty 0$. Quæ dividi potest per binomium $y - ac \infty 0$,
oriturque $y - aa + ac \infty 0$. Vnde y invenitur ∞ac , aut etiam
 $y \infty aa - ac$: ac proinde $x \infty \frac{ac}{a - c}$, aut etiam $x \infty a$. Quorum
duorum valorum ipsius x non nisi unus tantum quæsito Problema-
tis respondet, licet uterque æquationi propositæ satisfaciât. Quod
ipsum ex Problemate non admodum difficile semper est dignoscere.

Cæterum Problema aliquod non præter simplex existere, vel
hinc quoque inferre licet, cùm, operando juxta regulas pag. 6
& 7, quantitas, quæ per $\sqrt{\frac{1}{2}aa + bb}$ aut per $\sqrt{\frac{1}{2}aa - bb}$ expri-
mitur, omnino per extractionem radices inveniri potest; ita ut
ipsa sit rationalis, quemadmodum in allatis exemplis contingit.
Vbi porro observare licet, quod, in primo & secundo casu earun-
dem æquationum, postquam ultimus terminus per bb fuerit de-
signatus, aut is inventionem mediæ proportionalis (sicut pag. 2
docetur) ad hanc formam fuerit reductus, nil ad ulteriorem ipsa-
rum

rum constructionem faciendum relinquatur, quod non per solarum rectarum linearum ductum absolvatur. Vide Exercitationum nostrarum Mathematicarum librum 2, in quo de Simplicium Problematum constructione ex professo agitur.

Vbi demum observatu dignum, in genere æquationes omnes numericas trium dictarum formularum omnino per solas rectas lineas construi posse, in quibus a & bb non nisi numeros designant sive integros sive fractos; aut etiam eas, in quibus hæ quantitates non per diversas literas denotatz reperiuntur, etiam si ipsis integri aut fracti numeri præfigantur.

Vbi notandum, me ipsius y^6 dimensiones tantum pro tribus dimensionibus habere, cum non reperiatur y^5 , nec y^3 , nec y in tota summa.] Potest enim pro æquatione

$$y^6 + \frac{a^2}{2cc} y^4 + \frac{a^4}{c^2} yy - \frac{2a^2cc}{aa^2c^2} \infty 0 \text{ substitui æquatio hæc:}$$

$$z^6 + \frac{a^2}{2cc} z^4 + \frac{a^4}{c^2} z - \frac{2a^2cc}{aa^2c^2} \infty 0. \text{ nimirum, supponendo } z \infty yy,$$

atque subrogando z in locum y^4 , & z^3 in locum y^6 ; ita ut, postquam innotuerit valor radicis z , opus tantum sit, ex hoc invento valore extrahere radicem quadratam, ad habendum valorem radicis y .

Nec aliter operandum, si habeatur $x^4 \infty -axx + bb$. Possumus enim ipsius x^4 dimensiones solummodo pro duabus dimensionibus habere, & scribere $yy \infty -ay + bb$, supponendo $y \infty xx$, & $yy \infty x^4$, eritque radix ejus $y \infty -\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}$: adeoque radix $x \infty \sqrt{-\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + bb}}$. P⁶ vide pag.

Quin & si fuerit $z^6 \infty * 39zz + 340$, supponendo $x \infty zz$ potest pro ea reponi $x^3 \infty * 39x + 340$, atque adeo ipsius z^6 dimensiones tantum pro tribus dimensionibus haberi.

Eodem modo, si fuerit $x^8 \infty * + 10x^4 + 16xx - 9$, atque z supponatur ∞xx : poterit ejus loco scribi $z^4 \infty * + 10zz + 16z - 9$, ita ut ipsius x^8 dimensiones tantum pro 4^{or} dimensionibus habeantur. Et sic de aliis.

At verò si nullum inveniatur binomium, quod ita totam Equationis propositæ summam dividere possit, certum est, Problema, quod ab ea dependet, esse solidum.]

Sic quoniam æquatio $x^3 \infty 300x + 1200$, seu $x^3 80xx - 300x - 1200 \infty 0$, dividi nequit per x plus vel minus aliquo numero, ultimum terminum 1200 absque fractione dividente, quin aliquid post divisionem superfit, certum est, Problema, quod ad illam reducitur, esse Solidum. Quo autem pacto inveniuntur numeri omnes, datum numerum absque fractione dividendes, manifestum fiet, ubi ex Stitelio exposuero rationem, inveniendi omnes cujusque numeri partes aliquotas, quod unum idemque est.

Etenim, si numerus par fuerit, dividendus est per 2, & divisor reservandus; tum rursus, si quotiens est par, dividatur similiter per 2, & divisor reservetur; illudque tam diu continuetur, donec perveniatur ad numerum imparem. Quod si verò numerus est impar, vel divisione jam facta ad numerum imparem sit perventum, dividi debet per 3, si fieri potest, idque tam diu continuandum, donec proveniat quotiens, qui per 3 amplius dividi non possit. Tum eadem divisio tentanda per 5, 7, 11, 13, 17, 19, aliumve numerum primum, sive nullam partem aliquotam præter unitatem habentem. Suffecerit autem id tentasse, donec ad dati numeri radicem quadratam, sive veram, sive veræ proximam, perventum fuerit: cum ultiores divisiones supervacaneæ sint habendæ. Iam verò quomodo ex reservatis numeris partes aliquotæ, seu divisores omnes dati cujusque numeri, inveniuntur, sequentia exempla manifestabunt. Etenim ad inveniendos divisores omnes numeri 462, divido 462 per 2, & fiunt 231. Hinc 2 reservo, & 231 divido per 3, fiuntque 77, & 3 reservo. Postea divisus 77 per 7, fiunt 11, & 7 reservo. Denique divido 11 per 11, & fit 1, & 11 reservo. Vnde numeri reservati erunt 2, 3, 7, & 11. E quibus divisores omnes seu partes aliquotæ sic inveniuntur.

$$\begin{array}{r}
 1 \\
 2 \cdot 3 \\
 \hline
 6 \\
 \hline
 7 \cdot 14 \cdot 21 \cdot 42. \\
 \hline
 11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 66 \cdot 77 \cdot 154 \cdot 231 \cdot 462.
 \end{array}$$

Primò ducito 2 in 3, & producentur 6. Deinde 7 in 1, 2, 3, & 6, & fiunt 7, 14, 21, 42. Denique 11 in 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, & 42, fiuntque 11, 22, 33, 66, 77, 154, 231, 462. Et erunt divisores omnes 1. 2. 3. 6. 7. 14. 21. 42. 11. 22. 33. 66. 77. 154. 231. & 462.

& 462. Vbi notandum, ex ductu ultimi numeri reservati 11 in ultimum productum inventum 42 produci datum numerum 462; adeò ut, ad inveniendum dati alicujus numeri partes omnes aliquotas, opus non sit hosce duos numeros in se invicem ducere, si tantum de illis quaestio fuerit, & non de divisoribus. Eodem modo, numerus 2310 divisores habebit sequentes.

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ \hline 2310 & 1155 & 770 & 510 & 462 & 385 & 210 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 2 \cdot 3 \\ \hline 6 \end{array}$$

$$5 \cdot 10 \cdot 15 \cdot 30.$$

$$7 \cdot 14 \cdot 21 \cdot 42 \cdot 35 \cdot 70 \cdot 105 \cdot 210$$

$$11 \cdot 22 \cdot 33 \cdot 66 \cdot 55 \cdot 110 \cdot 165 \cdot 330 \cdot 77 \cdot 154 \cdot 231 \cdot 462 \cdot 385 \cdot$$

$$770 \cdot 1155 \cdot 2310.$$

Similiter divisores numeri 1200 erunt

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline 1200 & 600 & 400 & 300 & 240 & 200 & 160 & 120 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline 2 \cdot 2 \\ \hline 4 \\ \hline 2 \cdot 8 \\ \hline 2 \cdot 16 \end{array}$$


$$3 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 24 \cdot 48.$$

$$5 \cdot 10 \cdot 20 \cdot 40 \cdot 80 \cdot 15 \cdot 30 \cdot 60 \cdot 120 \cdot 240.$$

$$5 \cdot 25 \cdot 50 \cdot 100 \cdot 200 \cdot 400 \cdot 75 \cdot 150 \cdot 300 \cdot 600 \cdot 1200.$$

Verum enimverò cum allata ratio inveniendi Binomium, per quod Aequationis propositæ summa dividenda est, ad investigandum, utrum Problema, quod ad æquationem illam est perductum, sit Solidum, an verò Planum, & si Planum sit, ipsa ad ejusdem æquationis radices inveniendas valde videatur proluxa; præsertim cum ultimus terminus plures admittit divisores: sciendum est, quosdam ex iis seligi posse, è quibus si componatur binomium, per quod æquationis divisio non succedat, certi esse possumus Problema ab ea dependens Solidum existere.

Sic cum in superiori æquatione $x^3 \propto^* 300x + 1200$, vel $x^3 \propto 0xx - 300x - 1200 \propto 0$, triginta sint numeri, ultimum terminum 1200 absque fractione dividentes, atque hinc divisio vel sexagies esset tentanda, antequam certò constaret, Problema esse Solidum; sciendum est non opus esse nisi tres vel quatuor ex iis considerare, ut 4, 15, & 20, atque reliquos insuper habere. Quemadmodum ex sequentibus fiet manifestum.



Etenim si numerus 300 vocetur p , & numerus 1200 vocetur q , & juxta id, quod docetur pag. 93, circulus describatur FGN , cujus radius FH sit 10, utpote $\propto \sqrt{\frac{1}{3}p}$, & in eo recta inscribatur $FG \propto 12$, quippe $\propto \frac{1}{3}q$, ac deinde singuli arcus FMG , FNG , & GLK in tres æquales partes dividantur per rectas FM , FN , & FL : de-

signabunt duæ rectæ FM & FN quantitatem utriusque falsæ radicis, & FL quantitatem veræ. Adcò ut, ad eligendos divisores, qui ad æquationem dividendam utiles censeri possunt, opus tantum sit considerare eos, qui inventis lineis FM , FN , & FL quàm proximè accedunt, nullâ reliquorum habitâ ratione: adeoque divisionem tentandam tantum esse per $x + 4000$, vel per $x + 15000$, vel per $x - 20 \propto 0$. Ac proinde cum tentatâ divisione aliquid superfit: sequitur, Problema, quod ad æquationem propositam perducitur, esse Solidum, nec ullam radicem sive veram sive falsam; quæ numero exprimi queat, admittere; sed omnes esse irracionales, earumque valorem esse exprimendam per quantitatem linearum dictarum FM , FN , & FL .


Eodem modo si habeatur $x^3 \propto^* + 300x - 1200$, vel $x^3 \propto 0xx - 300x + 1200 \propto 0$: descripto rursus circulo FGN , cujus radius FH sit 10 seu $\sqrt{\frac{1}{3}p}$, in quo inscriptâ rectâ $FG \propto 12$ seu $\frac{1}{3}q$, si secantur singuli arcus FMG , FNG , & GLK in tres æquales partes, designabunt FM , FN utramque veram radicem, & FL falsam. Adcò ut, cum divisio æquationis $x^3 \propto 0xx - 300x + 1200$

+ 1200 ∞ 0 tentata per $x-4 \infty$ 0, per $x-15 \infty$ 0, & per $x+20 \infty$ 0 non succedat, concedendum sit illam admittere nullam radicem, nec veram nec falsam, quæ numero exprimi queat; sed omnes esse irracionales: adeoque earum valorem non aliter quàm per quantitatem linearum FM, FN, & FL esse exprimendum, & Problema, unde allata æquatio deducta fuit, Solidum esse.

Sed licet hæc aliter adhuc & quidem generalius efficere.

Vt si habeatur Æquatio primæ formulæ $x^3 \infty^* - 8x + 24$, cujus investigandæ sint radices. Quoniam igitur ultimus terminus 24 octo admittit divisores, qui sunt 1. 2. 3. 4. 6. 8. 12. 24: hinc octies fortè divisio tentanda esset antequam radicem propositæ Æquationis sic invenire possemus. Verùm sufficit semel vel bis id experiri, cum certi quidam ex inventis hisce divisoribus feligi possint, per quos si divisio non succedat, certi reddamur radicem esse irracionalem.

Cogitetur Æquatio allata hujus esse formæ $x^3 \infty^* - x, 4x + *, 6$, eadem nempe quæ $x^3 \infty^* - apx + aq$; in qua a pro unitate assumpta valet 2, p 4, & q 6. Quâ Æquatione juxta regulam pag. 85, 86, 87, & 88 resolutâ, invenitur radicem quæli-



tam designari per lineam FL. Postea exploretur quisnam ex inventis divisoribus huic lineæ proximè accedat, ut seligantur per quos divisio sit tentanda, neglectis reliquis. Postquam autem compertum fuerit nullum ex ipsis propius huic lineæ congruere quàm

quàm diviſorem 2, & quidem Æquationem propoſitam $x^3 80$
 $xx + 8x - 2400$ dividi poſſe per $x - 200$, & prodire Æqua-
tionem impoſſibilem $xx + 2x + 1200$, quæ per $x +$ vel — ali-
quo numero, ultimum terminum dividente, ulteriùs dividi ne-
quit: ſequitur radicem quæſitam fore 2, neque ullam aliam exte-
re, cum reliquæ duæ in hac formula ſemper ſint imaginariæ.

Nec aliter fit, ſi fuerit $x^3 100 - 8x - 24$, quæ eſt Æquatio u-
nam habens radicem falſam, nempe 2, & duas imaginarias: cum
producatùr ex multiplicatione Æquationis impoſſibilis $xx - 2x$
 $+ 1200$ per $x + 200$. Vbi obſervandum, quòd, licet D. des
Cartes ejuſmodi Æquationis formulam inter Cubicas non repo-
ſuerit, ſed tantùm eas, in quibus bini poſteriores termini per +
aut per + & — juncti ſunt, ipſa tamen nihilominus eodem modo,
quo præcedens, reſolvi, atque radix ejus exprimi poſſit. quod &
de æquatione quadrata $z^2 100 - az - bb 100$ ſupra monuimus.
Hinc ſi fuerit $x^3 100 - 3x - 10$, ſeu $x^3 80xx + 3x + 1000$,
quæ per $x +$ aliquo numero ultimum terminum dividente dividi
nequit: ſequitur radicem ejus eſſe irrationalem, eamque juxta
primam Cardani regulam, pagin. 93 deſcriptam, ſic exprimi
 $x 100 - \sqrt{C. \sqrt{26 + 5} + \sqrt{C. \sqrt{26 - 5}}}$. nempe mutatis tan-
tùm ſignis + & — utriuſque partis. Idem intellige de Æquatio-
nibus $x^3 100 - 8$, aut $x^3 100 - 10$, quarum radices ſunt $x 100 - 2$,
& $x 100 - \sqrt{C. 10}$.

Eodem modo operandum erit in Æquatione primi caſus ſecun-
dæ formulæ, puta $x^3 100 + 8x + 24$, ubi $\frac{1}{2}99$ eſt majus quàm
 $\frac{1}{2}p$. Quoniam enim dividi nequit per $x - 400$, qui diviſor ad
quantitatem radicis proximè accedit, non opus eſt ut ulteriùs pro-
grediamur, ſiquidem binæ reliquæ radices hujus caſus ſemper
ſunt imaginariæ. Quare radix quæſita erit irrationalis, quæ juxta
ſecundam Cardani regulam, pag. 93 exhibitam, ſic exprimitur:
 $x 100 \sqrt{C. 12} + \sqrt{125 \frac{1}{27}} + \sqrt{C. 12} - \sqrt{125 \frac{1}{27}}$. Adeò ut di-
catur compoſita ex duabus lineis, quarum una eſt prima dua-
rum mediarum proportionalium inter unitatem & lineam 12
 $+ \sqrt{125 \frac{1}{27}}$, & altera prima duarum mediarum proportiona-
lium inter unitatem & lineam $12 - \sqrt{125 \frac{1}{27}}$. E quibus perſpi-
cua ſunt illa, quæ habentur pag. 92 & 95. Notandum verò, me
potuiſſe quidem accipere a pro 1, ita ut p futura fuiſſet 8, & q 24:
quo-

quoniam hic liberum est assumere pro unitate, qualem libuerit, quantitatem; verum quia praxis aliquo modo accommodatio-
visa est, si pro a ponatur 2, non 1, malui illam hypothesein huic
posthabere.

Vbi porro advertendum, radicibus \mathcal{A} equationum ita implicatis
existentibus, simplicius censendum esse, earundem habitudinem
ex sola \mathcal{A} equationum constitutione innuere, quam ipsas prædicto
modo exprimere. Vt in hac ultima $x^3 \infty + 8x + 24$, dicendo x
talem esse, ut in se Cubicè ducta tantundem faciat ac si per 8 mul-
tiplicetur, ac deinde ei quod fit addatur 24. Quippe sic ejus ha-
bitudinem longè simplicius concipere valeamus, quam si eandem
hoc modo exprimeremus: $x \infty \sqrt{C. 12} + \sqrt{125 \frac{1}{17}}$

+ $\sqrt{C. 12} - \sqrt{125 \frac{1}{17}}$. Id quod similiter de \mathcal{A} equatione $x^3 \infty$
— $3x + 10$ potest intelligi, cujus radix juxta primam Cardani
regulam sic exprimitur $x \infty \sqrt{C. \sqrt{26+5}} - \sqrt{C. \sqrt{26-5}}$:
cum illius habitudinem, quam ex \mathcal{A} equationis constitutione in-
ducit, multò facilius concipiamus, prout eandem in se Cubicè du-
ctam idem producere intelligimus, quod 10 minus ipsius triplo.
Et sic de aliis.

Porro si habeatur $x^4 \infty * + 10xx + 40x + 16$; supposita a
 $\infty 2$, erit $a^4 \infty 4$, & $a^3 \infty 8$, fietque \mathcal{A} equatio $x^4 \infty * + x, 5xx$
+ $x, 10x + 8, 2$, ejusdem formæ cum $x^4 \infty * + pxx + a^4qx$
+ a^3r , in qua p idem valet quod 5, q idem quod 10, & r idem
quod 2. Deinde inventis numeris ultimum terminum 16 divi-
dentibus, utpote 1, 2, 4, 8, & 16, \mathcal{A} equationem resolvo juxta
regulam ab Authore pag. 85, 86, 87, & 88 ostensam, eritque ve-
ra radix FL, & falsa GK. Denique, examinando ordine divi-
sores inventos, explorando quinam ex ipsis ab inventis radici-
bus FL & GK quàm minimùm discedant; invenio divisionem
solummodo tentandam esse per $x - 4 \infty 0$, aut per $x + 1 \infty 0$.
Ac proinde cum neutra harum divisionum succedat, concludo,
 \mathcal{A} equationem propositam, unam admittere veram radicem, & u-
nam falsam, quarum utraque est irrationalis; ac reliquas duas esse
imaginarías.

Vide figu-
ram pagi-
nae versá.

Haud secus si fuerit \mathcal{A} equatio $x^4 \infty * - 60xx + 7400x + 36000$,
cujus ultimus terminus dividi potest per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10,
12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 45, 48, 50, 60, 72,

nem solius inventæ rectæ K G accuratè exhibetur, propter hujus cum reliquis asymmetriam, numero tantum quadantenus expressius ad hæc relatione innotescit. Eodem modo investigari queunt radices æquationum, plures paucioresve dimensiones habentium.

Cæterum cum radicum inventio res magni sit momenti, atque eorum, circa quæ Algebra versatur, præcipua: alium modum seligendi divisores, qui ad æquationem dividendam utiles judicari possunt, subjungam, quem communicavit Iacobus à Wæssenaer, Ultrajectinus, Geometra peritissimus, atque in hac Cartesiana Methodo versatissimus.

Inveniantur radices æquationis $x^7 - 1xx - 30x + 7200$, cujus ultimus terminus dividi potest per 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Vnde æquatio proposita dividenda est per $x \text{ } \& \text{ } 1$, vel per $x \text{ } \& \text{ } 2$, &c. Verum cum complures hic sint divisores, & tantum tres hic esse possint, per quos divisio fieri queat: constat, divisionem pluries esse tentandam, antequam fortè incideremus in aliquem, qui quæsito satisfacere posset. Quapropter ut seligantur illi, quorum præ cæteris est ratio habenda: augendæ sunt radices veræ certâ quâdam quantitate, hoc est, transmutanda est æquatio in aliam, cujus veræ radices sint dato numero majores. Commodissimum autem fuerit ad id assumere 1 vel 10: quia cum multiplicatio alicujus numeri instituitur per 1, vel 10, numerus ille sic non mutatur, sed ipsi tantum in fine cyphra adjungitur. Vnde ponendo $y = x + 1$, sive $x = y - 1$, exsurget æquatio $y^7 - 4y^7 - 25y + 10000$, cujus veræ radices unitate majores sunt veris prioris & falsæ contra unitate minores falsis. Quia verò in hac æquatione, numeri ultimum terminum 100 dividentes, sunt 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100: ideo dividenda foret per $y \text{ } \& \text{ } 1$, vel per $y \text{ } \& \text{ } 2$, vel per $y \text{ } \& \text{ } 4$, &c. quod cum non minorem quàm in superiori requirat laborem, oportet similiter ex iis quosdam seligere. Atque aded cum cognoscatur, ad inveniendas veras radices, divisores hujus unitate debere esse majores divisoribus prioris æquationis, facile constat, si ex inventis, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 aliqui idonei sunt ad posteriorem æquationem dividendam, aliquos etiam inter eosdem unitate diminutos, nempe inter 0, 1, 3, 4, 9, 19, 24, 49, 99, ad priorem æquationem dividendam utiles futuros. Qui ut inveniantur, conferendi sunt iidem divisores

1, 3, 4, 9, 19, 24, 49, 99 cum supra inventis 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72, sumendique quisibi invicem respondent, cæteris neglectis. Ac proinde cum hic quinque sint qui concordant, nempe 1, 3, 4, 9, & 24, oportet, ad inveniendas veras radices, divisionem tentare per $x-1$, per $x-3$, per $x-4$, per $x-9$, & per $x-24$; aut, ad obtinendas falsas, quæ quidem hæc auctione tantum sunt diminutæ, per $x+2$, per $x+3$, & per $x+6$. Quòd si verò id nimis longum videatur, quandoquidem æquatio quælibet tot tantum radices ad summum habere potest, quot incognita quantitas habet dimensiones, ita ut hic non ultra tres inveniantur; poterimus veras radices prioris æquationis unitate diminuere, supponendo videlicet $z \propto x-1$, sive $x \propto z+1$, & prodibit æquatio $z^3 + 2zz - 29z + 42 \propto 0$. Cujus ultimus terminus dividi potest per 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, qui unitate aucti efficiunt divisores 2, 3, 4, 7, 8, 15, 22, 43. Iam verò cum ex prioribus quinque 1, 3, 4, 9, 24 bini tantum sint, utpote 3 & 4, qui cum binis horum consentiunt, eò devenit, ut ad inveniendas veras radices opus tantum sit divisionem tentare per $x-3$, vel per $x-4$; aut, ad obtinendas falsas, quæ hæc diminutione verarum unitate sunt auctæ, per $x+2$, & per $x+6$. Hinc, cum $x^3 - 1xx - 30x + 72 \propto 0$ dividi possit per $x-3 \propto 0$, atque oriatur $xx + 2xx - 24 \propto 0$, cujus radices sunt $+4$, & -6 ; vel etiam $x^3 - 1xx - 30x + 72 \propto 0$ dividi possit per $x-4 \propto 0$, & proveniat $xx + 3x - 18 \propto 0$, cujus radices sunt $+3$ & -6 ; vel denique $x^3 - 1xx - 30x + 72 \propto 0$ dividi possit per $x+6 \propto 0$, & resuletur $xx - 7x + 12 \propto 0$, cujus radices sunt $+4$, & $+3$; sequitur, radices propositæ æquationis esse $+3$, $+4$, & -6 . Vbi notandum, in hujusmodi praxi seligendi divisores, non opus esse totius operationis, quæ ad inveniendas posteriores hæc æquationes requiritur, rationem habere; sed tantum quatenus ad ultimum terminum inveniendum inservire possit. Ad quem obtinendum, quando prioris radices unitate augentur vel diminuuntur, numeri in æquatione dati solummodo addendi sunt vel subtrahendi, prout signa $+$ & $-$ indicant. At verò cum per denarium aliumve numerum augentur vel diminuuntur, tum prius cyphræ ipsis in fine apponendæ sunt, vel ipsi per datos numeros sunt multiplicandi, antequam addantur vel à se invicem subtrahantur. quod usus edocebit.

Vbi tandem notandum, ad feligendos divisores divisionesque superfluas evitandas, spectari etiam posse ea, quæ Vir Clarissimus D. de Beaune de limitibus Aequationis, intra quos ejus radices cadunt, tradidit. Qualia ista in 2^{do} tractatu continentur, qui unâ cum primo de natura & constitutione Aequationum huic editioni nunc accessit.

Vnde cognoscitur, valorem ipsius z esse $\frac{1}{2}\sqrt{aa+cc}$ 0

$+ \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$, vel $\frac{1}{2}\sqrt{aa+cc}$.

$-\sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$.] utpote qui elicitur ex priori æquatione $zz - z\sqrt{aa+cc} + \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc} = 0$. Quæ quidem primi vel tertii casus esse potest æquationum Quadratarum pag. 6 & 7. Primi videlicet, si $\frac{1}{2}aa$ est minus quàm cc , quo casu $\frac{1}{2}\sqrt{aa+cc} + \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$ designabit verum valorem radiceis z , & $\frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}$

$-\sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$, falsum valorem, juxta ea quæ pag. 162 annotavimus. At tertii, si $\frac{1}{2}aa$ majus fuerit quàm cc , quo casu utraque radix est vera. Vbi porro notandum, æquationem posteriorem $zz + z\sqrt{aa+cc} + \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc} = 0$, postquam $\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc$ non fuerit minus quàm $\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}$, sive, quod idem est, cc non minus quàm $8aa$, duas admittere falsas radices, quemadmodum p. 165 monuimus, quæ sunt

$-\frac{1}{2}\sqrt{aa+cc} + \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$, &
 $-\frac{1}{2}\sqrt{aa+cc} - \sqrt{-\frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$. Ita ut quatuor sint radices binarum præcedentium æquationum sive æquationis

$$z^4 + \frac{1}{2}aa z^2 - \frac{a^3}{cc} z + \frac{1}{12}a^4 = 0,$$

nempe $z = \frac{1}{2}\sqrt{aa+cc} + \sqrt{\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$,
 $z = \frac{1}{2}\sqrt{aa+cc} - \sqrt{\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$,
 $z = -\frac{1}{2}\sqrt{aa+cc} + \sqrt{\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$,
 $z = -\frac{1}{2}\sqrt{aa+cc} - \sqrt{\frac{1}{2}cc - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$.

Et quandoquidem supra feceramus $z + \frac{1}{2}a = x$, in-
 Qq 3 notescit.

notescit, quantitatem x , ad quam cognoscendam omnes
hasce operationes instituimus, esse

$$\begin{aligned}
 & +\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}cc} - \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}} \\
 \text{vel } & \frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}cc} + \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}} \\
 \text{vel } & \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}cc} + \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}} \\
 \text{vel denique } & \frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}cc} - \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}.
 \end{aligned}$$


Ut liquet ex iis, quæ proximè annotata sunt.

Q Vbi per præcedentes regulas cognoscitur, radicem ejus,
quæ est longitudo lineæ DF , esse $\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}cc}$

$-\sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$ Vbi patet, quòd ex
quatuor radicibus supra expositis, æquationis $x^4 - 2ax^2 + \frac{2aa}{c}xx$
 $- 2a^3x + a^4 \infty 0$, quarum binæ priores semper veræ sunt,
seu plus quàm 0, D. des Cartes eam tantùm sibi delegerit, quæ
ad quantitatem lineæ DF , pro qua inveniendâ x posuerat desi-
gnandam inservire possit, & reliquam veram $\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}cc}$
 $+ \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$ neglexerit, eò quòd lineam
ipsâ DC majorem exhibeat.

Vide figu-
ram p. 83.

Potest autem hic eleganter ostendi usus, quem radices tam fal-
sæ quàm veræ alicujus æquationis in Geometria habent, ac quo
pacto earum ope ad plenam alicujus Problematis cognitionem
perducamur; sic ut nullus casus exstat, quem non detegamus, at-
que ejusdem determinationem non inveniamus. Sciendum enim
est, quòd, quemadmodum veræ radices in Arithmetica (ut supra
indicavimus) quantitatem aliquam designant, majorem quàm ni-
hil, & falsæ defectum alicujus quantitatis, seu quòd nihilo sunt
minores, sic in Geometria veræ radices eas communiter lineas
designent, sensu illo, quales inveniendæ proponuntur, at verò
falsæ, sensu contrario. Ad eò ut si veræ accipiantur in data recta
indefinita, à dato puncto versùs aliquod in ea punctum designa-
tum, progrediendo, falsæ in ipsa ab eodem puncto sumi debeant
versùs contrarium punctum, regrediendo.




Vt, quoniam in exposito Problemate, ad inveniendam quantitatem lineæ $DF \propto x$; siue ad cognoscendum quanta sumi debeat longitudo à puncto D versùs C , ut fiant quæ quæruntur, inventa est æquatio

$x^4 - 2ax^3 - \frac{2aa}{cc}xx - 2a^3x + a^4 \propto 0$, quæ duas admittit veras radices, utpote

$$\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc} - \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}},$$

$\& \frac{1}{2}a$



& $\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc} + \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$
 hinc à puncto D versùs C sumendæ sunt duæ lineæ, quarum una
 est æqualis

$\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc} - \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$,
 designans lineam D F, & altera æqualis

$\frac{1}{2}a + \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc} + \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa + \frac{1}{2}a\sqrt{aa+cc}}$,
 designans lineam D H: deinde à puncto B ad inventa puncta
 F & H

F & H ducendæ rectæ BF, BH, quarum hæc fecer latus A C in I, & illa idem latus productum in E: Eritque quælibet interceptarum FE, IH æqualis datæ c. Porro, quoniam dicta æquatio duas quoque admittit falsas radices, quæ sunt

$\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc} - \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$,
& $\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc} + \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$:
ideo à puncto D, versùs alteram partem, sumendæ sunt duæ lineæ, quarum una est æqualis

$\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc} - \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$,
designans lineam D K, & altera æqualis

$\frac{1}{2}a - \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc} + \sqrt{\frac{1}{4}cc - \frac{1}{2}aa - \frac{1}{2}a\sqrt{aa + cc}}$,
designans lineam D M. Quibus sic inventis, si ab inventis punctis K & M per punctum B ducantur lineæ occurrentes ipsi A C productæ versùs A: erit similiter unaquæque interceptarum KL, MN ipsæ æqualis.

Vnde apparet, quòd, etiamsi de sola D F inveniendâ quæstio fuerit, nec quicquam de interceptis IH, KL, & MN cogitaverimus, ipsæ tamen ultro post æquationis resolutionem sese offerant. Ita ut constet, per harum radicum cognitionem nos deduci in notitiam uniuscujusque casus, quem Problema propositum potest admittere; nec non, quo pacto quilibet ex ipsis est construendus ac determinandus.

Vt, quoniam, ad explicandas radices æquationis

$xx + x\sqrt{aa + cc} + \frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}a\sqrt{aa + cc} = 0$, requiritur, ut $\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}cc$ non sit minus quàm $\frac{1}{4}aa + \frac{1}{4}a\sqrt{aa + cc}$, sive cc non minus quàm $8aa$ (sicut dictum est pag. 309): Sic quoque ad ducendas interceptas KL, MN opus est, ut cc non sit minus quàm $8aa$. Quemadmodum facillè demonstrari potest, ducendo tantum rectam O P ipsi B C perpendicularem: siquidem recta O P rectarum omnium, quæ per punctum B duci possunt, minima existit. Cujus quadratum cum duplum sit quadrati ex P C, & hoc duplum quadrati ex B C, & hoc rursus quadrati ex B D duplum: erit quadratum ipsius O P quadrati ex B D octuplum. Hæc igitur ad ducendas interceptas KL, MN Problemati præfigenda est determinatio.

Porro, quod ad reliquas interceptas attinet, ut FE & IH, æ-

R r sem-

semper sic duci possunt, ut datis rectis sint æquales, nec est Pro-
blema eo casu determinationi obnoxium.

In numeris, esto $BD \propto a \propto 7$, $EF \propto c \propto 24$, fietque æquatio
quæ sita $x^4 - 14x^3 - 478xx - 686x + 2401 \propto 0$. Quæ
cum dividi nequeat per $x +$ vel — aliquo numero, ultimum ter-
minum dividente, tollo secundum ejus terminum, & fit æquatio
 $z^4 * - 551 \frac{1}{2} z^2 - 4375 z - 6305 \frac{11}{16} \propto 0$. Quæ ad tres di-
mensiones reducta dabit æquationem $y^6 - 1103y^4 + 329375yy$
 $- 19140625 \propto 0$. Hæc autem cum dividi possit per $yy - 625$
 $\propto 0$, arguitur y esse 25, quâ mediante dividetur æquatio $z^4 *$
 $- 551 \frac{1}{2} z^2 - 4375 z - 6305 \frac{11}{16} \propto 0$ in duas æquationes,
 $zz - 25z - 50 \frac{1}{4} \propto 0$, & $zz + 25z + 124 \frac{1}{4} \propto 0$: fient-
que radices prioris $z \propto 12 \frac{1}{2} + \sqrt{207}$, & $z \propto 12 \frac{1}{2} - \sqrt{207}$;
at posterioris $z \propto -12 \frac{1}{2} + \sqrt{32}$, & $z \propto -12 \frac{1}{2} - \sqrt{32}$.
Verùm quoniam, ad tollendum secundum terminum primæ æ-
quationis, supposita fuit $x \propto z + \frac{1}{2}a$: hinc radices ejus erunt
 $x \propto 16 + \sqrt{207}$, & $x \propto 16 - \sqrt{207}$, ut & $x \propto -9 + \sqrt{32}$,
nec non $x \propto -9 - \sqrt{32}$. Et liquet DF fore $16 - \sqrt{207}$,
 DH $16 + \sqrt{207}$, DK $9 - \sqrt{32}$, ac denique DM $9 + \sqrt{32}$.

Eodem modo, si BD fuerit 3, & FE 4, inveniatur æquatio
 $x^4 - 6x^3 + 2xx - 54x + 81 \propto 0$, quæ similiter per $x +$ vel —
aliquo numero ultimum terminum 81 dividente dividi nequit:
unde sublato secundo ejus termino, fiet æquatio $z^4 * - 11 \frac{1}{2} z^2$
 $- 75z - 10 \frac{11}{16} \propto 0$, quæ ad tres dimensiones reducta, dabit
æquationem $y^6 - 23y^4 + 175yy - 5625 \propto 0$. Hæc, cum
per $yy - 25 \propto 0$ dividi possit, sequitur y fore 5. Vnde divisâ
æquatione præcedente in duas æquationes $zz - 5z - \frac{1}{2} \propto 0$,
& $zz + 5z + 14 \frac{1}{4} \propto 0$, inveniemus $z \propto \sqrt{7} + 2 \frac{1}{2}$, vel
 $z \propto \sqrt{7} - 2 \frac{1}{2}$. Quæ binæ tantùm radices ex utraque æquatione
erui possunt, cum posterior æquatio $zz + 5z + 14 \frac{1}{4} \propto 0$ sit
impossibilis, per ea, quæ p. 165 exposuimus, adeoque nullas ad-
mittat radices nec veras nec falsas, sed tantùm imaginarias. Qui-
bus radicibus si addatur $1 \frac{1}{2}$ (quoniam ad tollendum secundum
terminum primæ æquationis posuimus $x \propto z + 1 \frac{1}{2}$), habebitur
 $x \propto \sqrt{7} + 4$, vel $x \propto \sqrt{7} - 1$. Id quod monstrat lineam DF
sumendam esse æqualem $\sqrt{7} - 1$, & lineam $DH \propto \sqrt{7} + 4$. Ex
quibus constat, quòd, postquam æquatio inventa $x^4 - 6x^3$
 $+ 2xx - 54x - 81 \propto 0$ nullam agnoscat radicem falsam,
(quau-

(quandoquidem radices æquationis $z z + 5 z + 14 \frac{1}{2} \infty 0$, tantummodo sunt imaginariæ, & æquatio impossibilis) ideo similiter nulla linea, cujus longitudo sit 4, per punctum B duci, atque à rectis CA, CD intercipi possit.

Cæterum, ne quid ad penitiorem intellectum harum regularum, quibus hic in reducendis ac dividendis æquationibus uli sumus, deficiat, visum fuit sequentia adjicere.

Hinc si, exempli causâ, æquatio reducenda sit $x^4 - p x x - q x + r \infty 0$, investigare oportet ex quibus binis æquationibus produci queat æquatio, quæ reducendæ similis existit. Quocirca cum, supponendo $x x + y x + z \infty 0$ ac $x x - y x + v \infty 0$, ex mutua harum duarum multiplicatione producat

$$x^4 + z x x - z y x + v z \infty 0, \text{ æquatio ejusdem formæ cum pro-} \\ - y y + v y \\ + v$$

posita, elicio inde tres æquationes diversas: nimirum, $z - y y + v \infty - p$, $- z y + v y \infty - q$, & $v z \infty r$. E quibus deinde, si ad invenientiam quantitatem y , in locum z & v subrogentur earum valores $\frac{1}{2} y y - \frac{1}{2} p + \frac{q}{2 y}$ & $\frac{1}{2} y y - \frac{1}{2} p - \frac{q}{2 y}$, emerget æquatio


$$y^6 - 2 p y^4 + \frac{p p}{4} y y - q q \infty 0. \text{ Inventâ autem quantitate } y, \text{ loco} \\ \text{duarum præcedentium æquationum } x x + y x + z \infty 0 \text{ ac } x x - \\ y x + v \infty 0 \text{ scribo hæc duas } x x + y x + \frac{1}{2} y y - \frac{1}{2} p + \frac{q}{2 y} \infty 0 \text{ ac}$$

$x x - y x + \frac{1}{2} y y - \frac{1}{2} p - \frac{q}{2 y} \infty 0$. Et patet quæsitum. Idem pariter de cæteris æquationibus, quarum signa ab allatæ signis sunt diversa, est intelligendum, è quibus omnibus postea inter se collatis dictarum regularum veritas penitus elucescit. Vbi etiam liquet, si valor ipsius $y y$ per divisionem superioris æquationis Cubicæ inveniri possit, Problema, quod ad æquationem propositam $x^4 - p x x - q x + r \infty 0$ perducitur, fore omnino Planum; sin minus, illud ipsum tunc esse Solidum.

Denique ex his quoque emanat, quo pacto regula generalis reducendi omnes æquationes altiores, pag. 84 ab Authore adducta, intelligi nec non ad praxin revocari debeat.

Cum aliàs; si pro ea supponeretur D G, multò difficilius ad Equationem, sed quæ simplicissima foret, per-

veniremus. Quod quidem hic refero, ut vobis indicem, quod, cum Problema propositum non est Solidum, si quaerendo illud unâ viâ ad Equationem deveniatur valde compositam, tum communiter aliâ viâ ad simpliciore[m] Equationem perveniri possit.] Modus autem, quo ad Equationem dictam pervenerim, talis est.




Iungatur EG, ductâque EH parallelâ ipsi CD vel AB, ponatur BD vel DC $\propto a$, FE $\propto c$, BF $\propto y$, & DG $\propto x$. Hinc cum EH æqualis sit ipsi CD vel DB, & triangulum EHG simile triangulo BDF: erit & EG æqualis BF, hoc est, $\propto y$. Eodem modo similia sunt triangula BGE & BEH: unde erit, ut BG, seu $a + x$, ad GE, seu y ; ita BE, seu $y + c$, ad EH, seu a . Ac proinde ductis tum mediis tum extremis in se invicem, fiet æquatio inter $yy + cy$ & $aa + ax$, vel inter yy & $-cy + aa$. Non secus, triangula BFD & BEH sunt similia: quare, si fiat ut BF, seu y , ad BD, seu a ; ita BE seu $y + c$ ad BH; erit BH $\propto \frac{ay + ac}{y}$. Subductâ autem BH ex BG seu $a + x$, relinquetur HG $\propto \frac{xy - ac}{y}$. Porro cum BH, HE, & HG tres sint proportionales: hinc si multiplicetur BH per HG, hoc est, $\frac{ay + ac}{y}$ per $\frac{xy - ac}{y}$, erit productum $\frac{axy + acxy - acy - aac}{yy}$ æquale ei, quod fit ex HE in se, hoc est, aa ; & per consequens $xyy - ayy \propto \frac{+a^2}{-cx}y + aac$, unde $yy \propto -cy + \frac{aac}{x - a}$. Ceterum cum

eum illa, quæ eidem sunt æqualia, inter se. quoque sint æqualia,
 erit $-cy + \frac{aa}{ax} \propto -cy + \frac{acc}{x-a}$. Ac proinde ablatis utrinque æ-
 qualibus, reliquumque multiplicando per $x-a$, habebitur $axx - a^3 \propto acc$, ideoque $xx \propto aa + cc$. Quod erat ostenden-
 dum.

Sed lubet hîc aliud exemplum non inelegans afferre, quod mihi à Doctissimo, ac in omni studiorum genere versatissimo
 D. Marco Meibomio, est suppeditatum, cujus operâ Aristoxenus,
 Alypius, aliique Veteres Musici pristino nitore sunt restituti.

Datis trianguli rectanguli ABC, mihiore latere AB,
 & differentiâ segmentorum basis EC, invenire differen-
 tiam laterum FC.



Ponatur $AB \propto a$,

$EC \propto b$,

$FC \propto x$:

eritque $GC \propto 2a + x$.

$$\begin{array}{r}
 EC \quad FC \quad GC \quad / \quad AC \\
 b \quad x \quad 2a + x \quad / \quad \frac{2ax + xx}{b}
 \end{array}$$

Rr 3.

$2ax$

$$\begin{array}{r}
 2ax + xx \\
 2ax + xx \\
 \hline
 + 2ax^3 + x^4 \\
 4aaxx + 2ax^3 \\
 \hline
 4aaxx + 4ax^3 + x^4 \\
 \hline
 \infty 2aa + 2ax + xx \\
 \hline
 4aaxx + 4ax^3 + x^4 \infty 2aabb + 2abbx + bbxx \\
 \hline
 x^4 + 4ax^3 + \frac{4a^2}{bb}xx - 2abbx - 2aabb \infty 0.
 \end{array}$$

Quoniam verò hæc æquatio dividi nequit per x § a, vel per x § b, vel per x § 2 a, vel per x § 2 b, hinc tollendus est secundus terminus, ut reducatur ad aliam tres tantum dimensiones habentem: quod fiet ponendo $z = a \infty x$

$$\begin{array}{r}
 z^4 - 4az^3 + 6aaz^2 - 4a^3z + a^4 \infty x^4 \\
 + 4az^3 - 12aaz^2 + 12a^3z - 4a^4 \infty + 4ax^3 \\
 + 4aaz^2 - 8a^3z + 4a^4 \infty + 4aaxx \\
 - bbzz + 2abbz - aabb \infty - bbxx \\
 - 2abbz + 2aabb \infty - 2abbx \\
 - 2aabb \infty - 2aabb. \\
 \hline
 z^4 * - \frac{2aa}{bb}zz * + \frac{a^4}{aabb} \infty 0. \text{ Quia autem}
 \end{array}$$

hic post sublationem secundi termini contingit æquationem esse Quadratam, cum in ea desit z^3 & z : non opus est ulterius progredi, cum radix ejus per ea, quæ primo libro sunt ostensa inveniri possit. Erit enim

$$\begin{array}{l}
 zz \infty aa + \frac{1}{2}bb + b\sqrt{2aa + \frac{1}{2}bb}, \\
 \& z \infty \sqrt{aa + \frac{1}{2}bb} + b\sqrt{2aa + \frac{1}{2}bb}, \text{ ac proinde} \\
 x \infty -a + \sqrt{aa + \frac{1}{2}bb} + b\sqrt{2aa + \frac{1}{2}bb}.
 \end{array}$$

Vbi notandum, si pro majori latere B C ponatur x , æquationem quæ sitam fore quadratam: utpote,

$$x^4 * - \frac{2aa}{bb}xx * + \frac{a^4}{aabb} \infty 0, \text{ sive } x^4 \infty + \frac{2aa}{bb}xx - a^4, \text{ cu-}$$

jus radix est $xx \infty aa + \frac{1}{2}bb + b\sqrt{2aa + \frac{1}{2}bb}$, hoc est,

$$x \infty \sqrt{aa + \frac{1}{2}bb} + b\sqrt{2aa + \frac{1}{2}bb}. \text{ Cujus sanè cum præce-}$$

dente convenientia ex ipso schemate est perspicua. Quòd si ve-
rò pro A E, duplo minori segmento, ponatur x , fiet Æquatio

$$xx \infty -bx + 2aa, \text{ cujus radix est } x \infty -\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{1}{4}bb + 2aa}.$$

Quæ

Quæ loco alterius exempli haberi queunt, quorum nos admonet Author pag. 84.

Non dissimilis erit quæstio, si datis $A B \propto a$, & $D C \propto b$, quæ-
ratur $F C \propto x$. Fiet enim æquatio

$x^4 + 4ax^3 - \frac{6aa}{bb}xx + \frac{4a^3}{2abb}x - \frac{a^4}{2aabb} \propto 0$. In qua si tollatur
secundus terminus, ponendo scilicet $z - a \propto x$, prodibit æqua-
tio $z^4 - \frac{6bb}{2}zz - \frac{aa}{2}bb \propto 0$, sive $z^4 \propto \frac{6bb}{2}zz + \frac{aa}{2}bb$, cujus
radix est $z \propto \sqrt{\frac{6bb}{2} + b\sqrt{\frac{bb}{2} + aa}}$, hoc est,

$z \propto \sqrt{\frac{6bb}{2} + b\sqrt{\frac{bb}{2} + aa}}$, adeoque $x \propto -a +$
 $\sqrt{\frac{6bb}{2} + b\sqrt{\frac{bb}{2} + aa}}$. Sed si quærratur $B C \propto x$, erit æquatio
 $xx \propto \frac{6bb}{2} + b\sqrt{\frac{bb}{2} + aa}$, cujus radix est $x \propto \sqrt{\frac{6bb}{2} + b\sqrt{\frac{bb}{2} + aa}}$.
Cujus cum præcedente consensus ex figura perspicitur. Denique
si quærratur $A D$, habebitur æquatio $xx \propto -bx + aa$, cujus ra-
dix est $x \propto -\frac{1}{2}b + \sqrt{\frac{bb}{4} + aa}$. Quod similiter superioris mo-
niti non inelegans est exemplum.

His adde sequentem quæstionem, quam olim ab Arithmetico
subtilissimo, D. Nicolao Huberti à Persyn, Harlemensi, fautore
meo honorando, solvendam accepi.

Invenire quatuor numeros, unitate se invicem exce-
dentes, qui inter se multiplicati faciant 100.

Ponatur primus x , secundus $x + 1$, tertius $x + 2$, & quartus
 $x + 3$. Fietque æquatio $x^4 + 6x^3 + 11xx + 6x \propto 100$, vel
 $x^4 + 6x^3 + 11xx + 6x - 100 \propto 0$. cujus ultimus terminus
dividi potest per 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, & 100. Divisio verò
tentata per $x \ 8 \ 1$, vel per $x \ 8 \ 2$, vel per $x \ 8 \ 4$ &c. non succedit.
Hinc sublato secundo termino, prodibit æquatio $z^4 - 2\frac{1}{2}zz -$
 $99\frac{7}{16} \propto 0$, vel $z^4 \propto 2\frac{1}{2}zz + 99\frac{7}{16}$, cujus radix est $z \propto$
 $\sqrt{101 + 1\frac{1}{2}}$, hoc est, $z \propto \sqrt{\sqrt{101 + 1\frac{1}{2}}}$. Ac proinde, cum ibi
tollendo secundum terminum posuerimus $x \propto z - 1\frac{1}{2}$, fiet
 $x \propto \sqrt{\sqrt{101 + 1\frac{1}{2}}} - 1\frac{1}{2}$. Eruntque quæstorum numerorum, pri-
mus $\sqrt{\sqrt{101 + 1\frac{1}{2}}} - 1\frac{1}{2}$, secundus $\sqrt{\sqrt{101 + 1\frac{1}{2}}} - \frac{1}{2}$, ter-
tius $\sqrt{\sqrt{101 + 1\frac{1}{2}}} + \frac{1}{2}$, & quartus $\sqrt{\sqrt{101 + 1\frac{1}{2}}} + 1\frac{1}{2}$. Quod
facile probari potest.

Vbi notandum, si cum hujus quæstionis Authore pro primo
numero ponamus $x - 1\frac{1}{2}$, pro secundo $x - \frac{1}{2}$, pro tertio $x + \frac{1}{2}$,
pro

pro quarto $x + 1 \frac{1}{2}$, quæstionem facilius solvi posse. Invenitur enim æquatio $x^4 \propto 2 \frac{1}{2} x x + 99 \frac{7}{16}$, omnino ut præcedens, denominata à radice z : unde quæriti numeri fiunt ut supra. Verum difficile satis foret in hæc hypotheses incidere, non secus quàm in superiorem Pappi constructionem, sicut Author innuit pag. 83.

Restat jam exemplum aliquod exhibendum, ubi æquationem ad Quadratam reducere non licet, & Problema Solidum existit. Quale est illud, quod ante annos aliquot sibi ad investigandum proposuit Nobilissimus atque Amplissimus Vir D. Ioannes de Wit, Consiliarius & Pensionarius sive primarius Hollandiæ West-Frisiæque minister, Mathematicum peritissimus. à quo insignem tractatum, brevi, si volet Deus, expectare poteris, in quo Planorum atque Solidorum Locorum per artem Analyticam inventionem aliter quàm Cartesius exponit.

Datis in superiori triangulo rectangulo ABC , segmento basis $DC \propto a$, & differentiâ laterum $CF \propto b$; invenire AB , latus minus.

Esto $AB \propto x$, fietque æquatio $x^4 + 4bx^3 + 6bbxx + 4b^4x + b^4 - 2aabb \propto 0$. Quæ cum dividi nequeat per x & b , tollo secundum ejus terminum, statuendo $z - b \propto x$, unde emergit æquatio $z^4 - 2aaz + 2aabbz - aabb \propto 0$, quippe quæ invenitur, quærendo latus majus BC . Hanc porro reduco ad aliam, tres tantum dimensiones habentem, juxta regulam pag. 79, fietque æquatio $yy^6 - 4aay^4 + 4a^4y^2 - 4a^4bb \propto 0$. Quæ cum dividi nequeat per binomium aliquod, constans ex quantitate incognitâ yy & quantitate cognitâ, ultimum terminum $4a^4bb$ dividente, indicio est, Problema propositum esse Solidum, adeoque non nisi per Conicas sectiones solvi posse. Neque minus vitium est, solutionem ejus post hæc tentare per lineas rectas & circulos, quàm adhibere Conicas sectiones ad constructionem eorum, quæ per lineas rectas & Circulos construi possunt, ut monet D. des Cartes pag. 79.

In numeris, esto $DC \propto 5$, $CF \propto 2$, $AB \propto 1 \frac{1}{2}$, eritque æquatio $1 \frac{1}{2} z^4 + 8z - 26 \frac{1}{2} - 68 \frac{1}{2} - 84 \propto 0$. Quæ cum dividi non possit per $1 \frac{1}{2}$ plus vel minus aliquo numero, ultimum terminum 84 dividente, aufero secundum terminum $8 \frac{1}{2}$, & fit, $1 \frac{1}{2} z^4 - 50z + 100N - 100 \propto 0$. Hæc autem ad tres di-

men-

mensiones reducta producit $x^6 - 100x^4 + 2900xx - 10000$
 $\infty 0$. quæ cum similiter dividi non possit per $xx +$ vel — aliquo
 numero, ultimum terminum dividente: sequitur Problema in da-
 tis numeris esse Solidum, lineamque AB per planorum Geome-
 triam sive per regulas primo libro expostas non posse inveniri.

Non dissimilis erit quæstio, si, datis $A D \infty a$, $F C \infty b$, quæra-
 tur $B C \infty x$. Invenitur enim æquatio

$$x^4 - 4bx^3 + 6bbx^2 - 4b^2x + b^3 \infty 0. \text{ Vnde ponendo}$$

$x \infty z + b$, emerget æquatio $z^4 - 2aaz - 2aabz - aabb \infty 0$.
 eadem nempe, quæ provenit, quærendo $A B \infty z$.

Porro, si exemplorum copiam desideres, potes rursus ex iisdem
 datis quærere $E C \infty x$, & habebis

$$x^4 + 4ax^3 - 2aaax - 8abbx - 8aabb \infty 0. \text{ Cujus secundum}$$

terminum si tollas, ponendo $z - a \infty x$, obtinebis $z^4 - 2aa$

$$- 4abbz + a^4 - 2aabb \infty 0, \text{ eandem, quam si quæras } D C \infty z.$$

Vbi si denique quæras $B D$, invenies hanc æquationem:

$$x^8 - 2a^4 - 2aabbx^4 - 4a^4bbxx + a^4 \infty 0. \text{ Sed hæc forsân ni-}$$

mia videbuntur.

E quibus colligere licet: quòd, Problemate aliquo Solido exi-
 stente, si per viam aliquam perveniatur ad Æquationem valde
 compositam, communiter etiam per aliam viam ad simpliciorum
 deveniri possit, veruntamen pauciores quàm tres dimensiones
 non habentem.

Iam verò postquam compertum est, Problema propo-
tum esse Solidum; sive Æquatio, per quam illud quæri-
tur, ad Quadrato-quadratum ascendat; sive ipsa non
altius quàm ad Cubum assurgat: potest semper radix ejus
inveniri per aliquam trium Conicarum sectionum, quæ-
cunque illa tandem sit, &c.] Ex his notandum est, quoties in
 proposita quæstione data est aliqua Conica sectio, & Æquatio ad
 3 vel 4 tantum dimensiones ascendit, tunc eam semper ope illius
 datæ Conicæ sectionis per solam regulam & circinum solvi posse.
 Adcò ut pro Plano Problemate haberi quodammodo possit,
 etiamsi reverà sit Solidum, ut etiam ab Authore hîc appellatur.

Hujus rei elegans exemplum suggerere potest Problema Apollonii de Parabola, lib. 5 Conicorum, de quo meminit Pappus Alexandrinus in scholio Prop^{is} 30 libri 4^{ti} Collectionum Mathematicarum. In cujus solutionem eos, qui id per Conica vel Linearia, hoc est, per improprium genus solvere quæfiverunt, dum illud pro Plano Problemate habet, merito reprehendit. Quoniam autem vir doctissimus ac de Mathematicis studiis perinde meritis Alexander Andersonus in exercitatione sua 5^a dictum Problema non levibus indiciis sequentis argumenti fuisse innuit, seque ibidem scribit Analyticâ suâ duce tandem reperisse absque solida inclinatione (ut Pappus loquitur) non posse definiri: visum fuit id ipsum hic loci, in hoc rationum æquilibrium autoribus istis sic dissentientibus, cuivis inquirendum proponere.

P R O B L E M A.

Parabolâ datâ, è puncto, intra vel extra eam dato, rectam lineam ducere, quæ Parabolæ ad rectos angulos occurrat.

Et enim si in hujus Problematis solutione investiganda, rectam, quæ ad axem è puncto in Parabola, ad quod quæsitâ recta duci debet, perpendicularis demittitur, pro incognita quantitate accipiamus: incidemus in æquationem Cubicam, quæ nullo modo erit reducibilis, & tamen secundum regulam generalem p. 85 ope ejusdem datæ Parabolæ quàm facillimè contrui poterit, utendo tantum rectis lineis & circulo. Cujus porro demonstrationem universalem, quam sibi vulgari modo Geometrarum, continuæ contemplationi figuræ obnoxiam, acutissimus pariter atque eruditissimus noster Chr. Hugenius concinnavit, cum ipsa jam pridem nobis aliisque ab eo communicata fuerit, nec illa etiam hujus loci existat, eandem hic prætereundam duximus.

T Atque ita *Æquatio reducenda ad hanc formam: $z^3 \propto^* a p z. a a q,$ si incognita quantitas tres tantum dimensiones habeat; aut ad hanc: $z^3 \propto^* a p z z. a a q z. a^3 r.$ si quatuor obtineat dimensiones; seu, fumendo a pro unitate, ad hanc: $z^3 \propto^* p z. q;$ aut ad hanc: $z^4 \propto^* p z z. q z. r.$] Vbi apparet, hujus Geo-*

Geometrix Methodum requirere, ut, literæ, quæ in priori æquatione pro unitate est accepta, quadratum reperiatur in ultimo termino; in posteriori verò æquatione, ut literæ, quæ pro unitate in termino æ est accepta, quadratum reperiatur in termino æ, ac ejus cubus in termino ultimo. Etenim si habeatur æquatio $z^1 \propto *bbz.c^1$, ac illius loco alia desideretur, cujus penultimus terminus habeat æ, ac ultimus aa: Fiat ut aa ad b, sic ba ad quartam, quæ vocetur p: eritque $ap \propto bb$; Rursus, fiat ut aa ad c, sic c ad quartam, quæ sit q; sive etiam (quod eodèd redit) ut aa ad c, sic c ad tertiam, quæ vocetur d; ac denuo ut aa ad d, sic c ad q: eritque $aaq \propto c^1$. Vnde pro $z^1 \propto *.bbz.c^1$ scribi poterit $z^1 \propto *apz.aaq$, sive, sumendo a pro unitate: $z^1 \propto *.pz.q$.

Nec aliter fit si habeatur $z^4 \propto *.bbzz.c^1z.d^4$. Substituto enim ap in locum bb, & aaq in locum c^1 (ut ante), faciendum est, ut aa ad d, sic d ad quartam, quæ vocetur e, eritque $ae \propto dd$, ideoque $aaee \propto d^4$. Vbi rursus, si fiat, ut aa ad e, ita e ad tertiam, quæ vocetur r, erit $ar \propto ee$, ac proinde $a^1r \propto d^4$. Ita ut pro æquatione propositâ $z^4 \propto *.bbzz.c^1z.d^4$ reponi possit $z^4 \propto *apzz.aaqz.a^1r$, sive, sumendo a pro unitate: $z^4 \propto *.pzz.qz.r$. Quod erat ostendendum. Eadem est ratio æquationis pag. 97.

Et quibus liquidò constat, quanti sit momenti in Geometria concipere unitatem, cum, præter ejus utilitatem, primo libro ostensam, non solum ejus beneficio æquationes 3 & 4, ut & 5 & 6 dimensionum ita præparentur, ut hæ juxta unam & illæ juxta aliam regulam resolvi queant; sed ipsæ etiam hoc pacto designatæ ad numeros referri, atque ad ipsarum radices explicandas inservire possint, adeoque, quænam inter Arithmeticam & Geometriam relatio ac convenientia existat, edoceant.

Deinde supponendo Parabolam F A G jam descriptam esse, & axem ejus esse ACDKL, latusque rectum a seu i.] Vbi liquet, quòd, postquam in æquatione resolvenda quantitatem a seu unitatem, ut proximè est explicatum, subrogavimus, eamque juxta regulam pro latere recto Parabolæ F A G assumpsimus, quo pacto Problemata omnia Solida unius ejusdemque Parabolæ ope solvi possint. Cum enim reduci semper queant ad æquationem trium aut quatuor dimensionum, superiorum formula-

mularum, & una eademque quantitas a in earundem æquationum terminis subrogari semper possit, evidens est, ipsam unius ejusdemque Parabolæ ope construi posse. Idem intelligendum quoque est de æquationibus numericis trium quatuorve dimensionum, quarum nulla ex radicibus est rationalis, quarumque valor similiter per sectionem Conicam est determinandus. Ut supra fuit ostensum.

*Vide figuram
p. 86 vel
89.*

Cæterum ut hæc regula cuivis perspecta reddatur, concipiatur Parabola esse descripta FAG , cujus latus rectum sit ∞a , seu 1 , & in axe ejus $ADKL$ assumptâ $AD \infty b$, fingatur ex D eidem perpendicularis esse erecta $DE \infty c$, centroque E intervallo $EH \infty d$ descriptus circulus FHG , qui Parabolam ab utraque parte axis secet in G & F : oporteatque investigare æquationem, cujus radix sit perpendicularis GK aut $FL \infty z$.

Ad quam inveniendam, dividatur z , quadratum ex GK , per latus rectum seu a , & sit $AK \infty \frac{z^2}{a}$. E qua subductâ $AD \infty b$, relinquetur DK seu $EM \infty \frac{z^2}{a} - b$. Deinde, quoniam additis ED , hoc est, MK , & KG , tota MG est $\infty c + z$; & quadrata ex EM & MG simul addita faciant $\frac{z^4}{aa} - \frac{2bz^2}{a} + bb + cc + 2cz + z^2$, quadratum ex EG erit $\frac{z^4}{aa} - \frac{2bz^2}{a} + bb + cc + 2cz + z^2 \infty dd$, hoc est, ordinatâ æqualitate, habebitur æquatio $z^4 \infty * + 2abz^2 - 2aacz + aadd$. Eadem quippe, quæ in-

$$\begin{array}{r} -aa \\ -aabb \\ -aacc \end{array}$$

venitur, ponendo $FL \infty -z$. Hinc si, exempli causâ, æquatio. proposita construenda fuerit $z^4 \infty * + apz^2 - aqz + a^3r$: erit, factâ separatim comparatione inter singulos terminos unius & singulos alterius, $b \infty \frac{a+p}{2}$, $c \infty \frac{1}{2}q$, &

$d \infty \sqrt{\frac{1}{4}aa + \frac{1}{2}ap + \frac{1}{4}pp + \frac{1}{4}qq + ar}$. Quod illud ipsum est, quod Authoris regula faciendum præcipit. Eodem modo reliquorum casuum constructio inveniri potest. Idem intellige de constructione æquationis pag^æ 97, aliarumque hîc sequentium.

VV *Adeo ut hæc regula omnium, quas aliquis exoptare queat, generalissima sit & perfectissima.*] Quoniam autem, quo

Porro assumptâ $DF \propto \frac{r}{2\sqrt{f}}$, jungatur AF ; & super AF descripto semicirculo ADF , collocetur in eo $AG \propto \sqrt{q}$, centroque F circulus describatur, transiens per inventum punctum G . Qui quidem Circulus Hyperbolam secabit vel tanget in tot punctis, quot æquatio diversas radices admittet, à quibus si ad lineam AC demittantur perpendiculares HI , hi , & hj : erunt ipsæ radices quæsitæ.

Vbi notandum, si AG major inveniretur, quàm ut semicirculo super AF descripto inscribi posset; aut etiam Circulus GHb adeò parvus esset, ut Hyperbolam HEb in nullo prorsus puncto secaret vel tangeret, nullam itidem tunc fore radicem in æquatione, quæ non esset imaginaria.

Demonstratio.


Etenim lineâ IH existente $\propto z$, cum id, quod sub AD , DE vel sub AI , IH continetur, sit $\propto \sqrt{f}$: erit AI seu $DK \propto \frac{\sqrt{f}}{z}$. Vnde cum DF & DK à se invicem subductæ relinquant KF , & DF sit $\propto \frac{r}{2\sqrt{f}}$: erit $KF \propto \frac{r}{2\sqrt{f}} - \frac{\sqrt{f}}{z}$ seu $\frac{\sqrt{f}}{z} - \frac{r}{2\sqrt{f}}$, adeoque $\square KF$ semper $\propto \frac{f}{z^2} - \frac{r}{z} + \frac{rr}{4f}$. Est autem $KH \propto z - \frac{1}{2}p$ seu $\frac{1}{2}p - z$, ac proinde $\square KH$ semper $\propto zz - pz + \frac{1}{4}pp$. Hinc summa utriusque simul, hoc est, $\square FH$ erit $\propto \frac{f}{z^2} - \frac{r}{z} + \frac{rr}{4f} + zz - pz + \frac{1}{4}pp$. Hoc verò cum æquetur $\square AF - \square AG$, hoc est, $\propto \frac{1}{4}pp + \frac{rr}{4f} - q$: fiet, ordinatâ æqualitate, $z^4 - pz^3 + qzz - rz + f \propto 0$. Quæ est æquatio proposita. Vnde liquet IH esse $\propto z$.

CON-

CONSTRUCTIO AEquATIONIS

$$z^3 - pzz + qz - r = 0.$$

Ductis, ut ante, AB, AC, & in AB assumptâ AD $\propto \sqrt{q}$, agatur ex D ipsi AC parallela DF. Deinde in hac acceptis DE $\propto \frac{r}{q}$, & EF $\propto p$, describatur per E circa Asymptotos AB, AC Hyperbola E h H. Porro



sectâ DF bifariam in G, centro G & intervallo GE describatur circulus EHL, qui quidem Hyperbolam in tot punctis præter E secabit vel tanget, quot æquatio diversas radices admitter, è quibus si ad lineam AB demittantur perpendiculares HI, hi, erunt ipsæ radices quæsitæ.

Demonstratio.



Quoniam, HI existente $\propto z$, AI, per supra dicta, est $\propto \frac{r}{q^2} \sqrt{q}$, & eadem ab AD subducta relinquit ID vel HK $\propto \sqrt{q} - \frac{r}{q^2} \sqrt{q}$. erit \square ex HK $\propto q - \frac{2r}{q} + \frac{r^2}{q^2}$. Deinde, quoniam DE $\propto \frac{r}{q}$ ablatâ ex DK seu IH $\propto z$, relinquitur EK $\propto z - \frac{r}{q}$; at verò DK $\propto z$ subtrahâ ex DL seu EF $\propto p$, relinquitur KL $\propto p - z$: erit \square EKL $\propto pz - \frac{pr}{q} - zz + \frac{rz}{q}$. Hinc cum \square ex HK æquetur \square EKL, erit $q - \frac{2r}{q} + \frac{r^2}{q^2} \propto pz - \frac{pr}{q} - zz + \frac{rz}{q}$. Et fit, ordinatâ æqualitate, $z^3 - \frac{r}{q} z^2 + qz - 2rz + \frac{pr}{q} = 0$.

$$-p + \frac{pr}{q}$$


Quæ

Quæ æquatio dividi potest per $z - \frac{r}{q} \infty 0$, & fit $z^3 - pzz + qz - r \infty 0$, æquatio proposita. Vnde liquet HI esse ∞z .

His subjunge sequentem regulam, à me inventam, quæ ope Circuli & Parabolæ Æquationes Cubicæ, in quibus 2^{da} terminus non est sublatus, contrui possunt, prout ipsæ ad hanc formam $z^3 \infty pzz. aqz. aar$, aut ad hanc $z^3 \infty pzz^*.aar$; sive etiam (sumendo a pro unitate) ad hanc $z^3 \infty pzz.qz.r$, aut ad hanc $z^3 \infty pzz^*.r$, sunt reductæ. Ea autem talis est.



De-



Descriptâ Parabolâ NAM, cujus axis sit ABE, & latus rectum $\propto a$ seu x , erigo ex vertice A, ad dextram Parabolæ, super axe, perpendicularem AC $\propto p$; & ex C ductâ CD ipsi AB parallelâ, donec Parabolæ occurrat in D, duco ex D ipsi AC parallelam DB, occurrentem axi in B. Dehinc in linea AB, continuatâ versûs B, sumendo BE $\propto x$, oportet facere EF $\propto q$, eamque ulterius in illa versûs hanc eandem partem sumere, si habeatur $+q$ in æquatione; sed versûs alteram partem, si habeatur $-q$. Porro sectâ AF bifariam, aut AE, si q sit nulla; in G, si habeatur $-p$, & q & r diversis signis sint adfectæ; aut etiam si habeatur $+p$, & q & r iisdem signis denotatæ fuerint, erigenda est ex G perpendi-

T t

pendicularis $GK \propto r \sqrt{\frac{pq}{2}}$, aut $\propto \frac{1}{2}r$, si q nulla sit, eaque ad dextram collocanda, si p & r diversa signa habeant, aut ad sinistram, si eadem. Vel contra, si habeatur $-p$, & q & r iisdem signis adficiantur; aut etiam si habeatur $+p$, & q & r diversis signis designentur, oportet facere $GK \propto r \sqrt{\frac{pq}{2}}$, aut $\propto \frac{1}{2}r$, si q nulla sit, eamque, ut ante, ad dextram sinistramve collocare, si r sit major quàm pq ; vel contra, si r minor sit quàm pq . Quo peracto, si ex K circulus describatur, transiens per punctum D , secabit is vel tanget Parabolam in tot punctis præter D , quot æquatio diversas radices admitter; è quibus si ad axem demittantur perpendiculares, obtinebuntur omnes æquationis radices, tam falsæ, quàm veræ. Quarum quidem veræ, ut ML , ad dextram cadent, & falsæ, ut NO , ad sinistram, si habeatur $-p$ in æquatione. Sed contra, si habeatur ibi $+p$, veræ cadent ad sinistram, & falsæ ad dextram:

Signum =
significat
differentiam
nam, quæ
est inter r
& pq .

Cujus quidem demonstrationem, cum eodem modo fieri possit, quo illa Authoris paginæ 89, brevitatis studio hic omitto.

Vbi demum advertendum, regulam hanc habere etiam locum in Æquationibus Cubicis, quarum 2^{us} terminus est sublatus, si tantum in iis p intelligamus esse $\infty 0$, & veras radices ex eadem parte Parabolæ esse sumendas, quæ erecta est perpendicularis GK , & falsas ex altera, cum habetur $+r$ in æquatione; aut contra, si in ea habetur $-r$.

Cæterum cum & alias regulas huc afferre possem, quibus hæc æquationes sicut & superiores Quadrato-quadratæ construuntur: tamen, ne in iis hic recensendis nimis longus sim (quandoquidem infinitas invenire licet), suffecerit jam allatas, tanquam faciliores exposuisse, cæterasque etiam aliis quærendas reliquisse.


X *Falsa autem FL æqualis est duabus hisce QN & NV simul sumptis, quemadmodum ex calculo facile est videre.]*
Veritatem proprietatis Parabolæ, quam hic obiter adnotat Autor,

tor, & ad quam investigandam me ante annos aliquot Parisiis instigavit Doctissimus, ac Mathematicum peritiâ, non minùs quàm omnigenâ virtute, ornatissimus vir D. Claudius Mylon, I. C, sicut à me tum inventa fuit, sequenti Theoremate exponam.

T H E O R E M A.

Si Circulus Parabolam in pluribus punctis secuerit, à quibus ad axem ex utraque parte perpendiculares demittantur: erit ea, quæ ab una parte axis reperitur, æqualis illis, quæ sunt ab altera parte. Quòd si verò ab utraque parte in duobus punctis illam secet: erunt similiter duæ ab una parte æquales duabus ab altera parte.

Sit Parabola $HABE$, cujus axis AI , vertex A , Circulus autem ipsam secans HBE . Qui quidem primò transeat per verticem, secetque Parabolam ab una parte in puncto H , & ab altera in punctis B & E . Demissis autem ex punctis H , B , & E in axem



perpendicularibus HI , BC , & ED : ostendendum est, HI æqualem esse ipsis BC & ED simul sumptis.

Est lat. rectum Parabolæ $\propto 4, CB \propto c, DE \propto d, HI \propto x, AG \propto x, \& FG \propto y$. Hinc cum, per 11 propositionem 1 libri

GD seu FO $\propto x - \frac{d^d}{a}$. Cujus quadrato $xx - \frac{2ddx}{a} + \frac{d^4}{a^2}$ si addatur quadratum ex E O $dd + 2dy + yy$, erit summa $xx - \frac{2ddx}{a} + \frac{d^4}{a^2} + dd + 2dy + yy$ quadratum ex FE. Quod similiter adæquetur quadrato ex FA $xx + yy$, atque æquatio ritè ordinetur, ut inveniatur rursus $x \propto \frac{d^3 + 2aay + aad}{2ad}$.

Quia verò, quæ uni æquantur, illa quoque æqualia sunt inter se, erit $\frac{c^3 + 2aay + aac}{2ac} \propto \frac{d^3 + 2aay + aad}{2ad}$. In qua æquatione, si multiplicemus per crucem, atque post æqualium ex æqualibus subductionem, ita transferamus quantitates, ut utraque æqualitatis pars dividi possit per $d - c$, orietur $edd + ccd \propto 2aay$.

Similiter, si ex AI $\propto \frac{zz}{a}$ auferatur AG $\propto x$, relinquetur GI seu FK $\propto \frac{zz}{a} - x$. cuius quadrato $\frac{z^4}{a^2} - \frac{2zzx}{a} + xx$ si addatur quadratum ex HK $zz - 2yz + yy$, erit aggregatum $\frac{z^4}{a^2} - \frac{2zzx}{a} + xx + zz - 2yz + yy$ quadratum ex HF. Quod item ob rationem supradictam quadrato ex FA seu $xx + yy$ erit æquale. Quibus adæquatis, si æquatio ritè ordinetur, constabit tertio $x \propto \frac{z^3 - 2aay + aaz}{2az}$.

Quoniam autem primò inventa fuit $x \propto \frac{c^3 + 2aay + aac}{2ac}$, erunt itidem $\frac{z^3 - 2aay + aaz}{2az}$ & $\frac{c^3 + 2aay + aac}{2ac}$ inter se æqualia. Quocirca, si multiplicatio fiat per crucem, atque, post æqualium ex æqualibus ablationem, quantitates transferantur, ut utraque æqualitatis pars dividi possit per $z + c$: orietur $czz - ccz \propto 2aay$.

Cum verò & supra inventum fuerit $2aay \propto edd + ccd$, erunt itidem $czz - ccz$ & $edd + ccd$ inter se æquales. Quam æquationem si porro per c dividamus, atque quantitates unius partis transferamus in aliam sub contrario signo, fiet $zz - cz - \frac{dd}{cd} \propto 0$.

Postquam igitur evolvimus atque enodavimus propositionis data, donec tandem pervenerimus ad æquationem $zz - cz - \frac{dd}{cd} \propto 0$, restat ut illa quæsito respondeat, atque ejus beneficio propositi

Parabolam ab una parte in puncto H, & ab altera in tribus punctis E, B, & M: Dico similiter H I æqualem esse ipsis E D, B C, & M N simul sumptis.

Positis enim iisdem quæ prius, esto præterea M N $\propto b$. Vnde, simili ratione, quâ ante, A N erit $\frac{b^2}{a}$. Sublatâ autem A N ex A G $\propto x$, relinquitur N G seu P F $\propto x - \frac{b^2}{a}$. Cujus quadratum $xx - \frac{2bbx}{a} + \frac{b^4}{a^2}$ si addatur quadrato rectæ M P $\propto bb + 2by + yy$, erit summa $xx - \frac{2bbx}{a} + \frac{b^4}{a^2} + bb + 2by + yy$ quadratum rectæ F M.

Quoniam autem in Circulo, ob æqualitatem radiorum, rectæ lineæ F B & F M sunt æquales, erunt quoque eorundem quadrata $xx - \frac{2ccx}{a} + \frac{c^4}{a^2} + yy + 2cy + cc$, & $xx - \frac{2bbx}{a} + \frac{b^4}{a^2} + bb + 2by + yy$ æqualia. Vnde, si demantur utrinque æquales quantitates & reliquæ multiplicentur per aa , atque quantitates in x ductæ ad unam æquationis partem transferantur, reliquæ verò ad alteram, fiet $c^4 - b^4 + 2aacy - 2aaby + aacc - aabb \propto 2accx - 2abbx$. Dividatur jam utraque pars per $c - b$, & orietur $c^3 + bcc + bbc + b^3 + 2aay + aac + aab \propto 2acx + 2abx$. Rursus dividatur utrinque per $2ac + 2ab$, & orietur $x \propto \frac{c^3 + bcc + bbc + b^3 + 2aay + aac + aab}{2ac + 2ab}$.

Eodem modo, cum rectæ F E & F M sint æquales, erunt etiam eorum quadrata, nempe, $xx - \frac{2ddx}{a} + \frac{d^4}{a^2} + dd + 2dy + yy$ & $xx - \frac{2bbx}{a} + \frac{b^4}{a^2} + bb + 2by + yy$ æqualia. Quare demptis utrobique æqualibus, reliquisque ductis in aa , transeant porro quantitates in x ductæ ad unam partem, & reliquæ ad alteram, fiet $d^4 - b^4 + 2aady - 2aaby + aadd - aabb \propto 2addx - 2abbx$. Dividatur utraque pars per $d - b$, orieturque $d^3 + bdd + bbd + b^3 + 2aay + aad + aab \propto 2adx + 2abx$. Rursus dividatur utrinque per $2ad + 2ab$, & habebitur $x \propto \frac{d^3 + bdd + bbd + b^3 + 2aay + aad + aab}{2ad + 2ab}$.

Iam verò, quoniam, quæ uni æqualia sunt, illa quoque inter se sunt.

sunt æqualia, erit $\frac{d^1 + bdd + bbd + b^1 + 2aay + aad + aab}{2ad + 2ab}$
 $\propto \frac{c^1 + bcc + bbc + b^1 + 2aay + aac + aab}{2ac + 2ab}$.

Brevitatis verò causâ pro $b^1 + 2aay + aab$ scribatur $+e^1$ ductâque utrâque æqualitatis parte in $2a$, seu (quod idem est) diviso utriusque denominatore per $2a$, instituatur porro multiplicatio per crucem, ut fractiones evanescant, fietque $cd^1 + bd^1 + bcd + bdd + bbd + b^1d + aacd + aabd + ce^1 + be^1 \propto c^1d + c^1b + bcc + bbc + bbd + b^1c + aacd + aabc + de^1 + be^1$. Et, deletis utrinque æqualibus, restituitur valor quantitatis assumptæ e^1 , habebiturque $cd^1 + bd^1 + bcd + bdd + b^1d + aabd + b^1c + 2aay + aabc \propto c^1d + c^1b + bcc + bbc + b^1c + aabc + b^1d + aay + aabd$. Rursus demptis utrobique æqualibus, transferantur quantitates in y ductæ ad unam partem, reliquæ verò ad alteram, & divisio tandem instituatur per $d - c$, orieturque $cdd + ccd + bdd + 2bcd + bbd + bbc + bcc \propto 2aay$.

Similiter, cum rectæ HF & FM sint æquales, erunt pariter earum quadrata $\frac{z^4}{aa} - \frac{2zx}{a} + xx + zz - 2zy + yy$, & $xx - \frac{2bx}{a} + \frac{b^1}{aa} + bb + 2by + yy$ æqualia. Vnde sublatis utrinque æqualibus, reliquisque per aa multiplicatis, si transferantur porro quantitates, ita ut, quæ in x ductæ sunt, unam faciant æquationis partem, reliquæ verò alteram, fiet $z^4 - b^1 - 2aaz - 2aaby + aaz - aabb \propto 2azx - 2abbx$. Dividatur jam utraque pars per $z + b$, orieturque $z^3 - bzx + bbz - b^1 - 2aay + aaz - aab \propto 2azx - 2abx$. Et rursus utrinque per $2az - 2ab$, fietque

$$x \propto \frac{z^3 - bzx + bbz - b^1 - 2aay + aaz - aab}{2az - 2ab}.$$

Quoniam verò superius inventa fuit quantitas x æqualis

$$\frac{c^1 + bcc + bbc + b^1 + 2aay + aac + aab}{2ac + 2ab}, \text{ hinc}$$

$$\frac{z^3 - bzx + bbz - b^1 - 2aay + aaz - aab}{2az - 2ab} \&$$

$$\frac{c^1 + bcc + bbc + b^1 + 2aay + aac + aab}{2ac + 2ab} \text{ erunt quoque inter se}$$

æqualia.

Bre-

Brevitatis autem causâ rursus pro $+b^3 + 2aay + aab$ scribatur $+e^3$, & $-e^3$ pro $-b^3 - 2aay - aab$. Deinde, multiplicatâ utrâque æqualitatis parte per $2a$, seu (quod idem est), divisio utriusque denominatore per $2a$, fiat multiplicatio per crucem, ut fractiones evanescant, fietque $cz^3 + bz^3 - bcz - bbz + bbz + b^3z + aacz + aabz - ce^3 - be^3 \propto c^3z - bc^3 + bccz - bbcc + bbcz - b^3c + aacz - aabc + ze^3 - be^3$. Postea auferantur utrinque æquales quantitates, & restituantur valor quantitatis assumptæ e^3 , & sit $cz^3 + bz^3 - bcz - bbz + b^3z + aabz - b^3c - 2aacy - aabc \propto c^3z - bc^3 + bccz - bbcc - b^3c - aabc + b^3z + 2aayz + aabz$. Denique deletis rursus utrobique æqualibus, & revocatis quantitibus in y ductis ad unam partem æquationis, reliquis verò ad alteram, instituaturs divisio per $z + c$, & orietur $2aay \propto cz - ccz + bz - 2bz + bcc - bbz + bbc$.

Verùm cum & supra inventum fuerit $ddd + ccd + bdd + 2bcd + bbd + bbb \propto 2aay$, & quæ eidem sunt æqualia, ea quoque inter se sint æqualia, erit $cz - ccz + bz - 2bz + bcc - bbz + bbb \propto ddd + ccd + bdd + 2bcd + bbd + bbb$. Deleantur jam utrinque æqualia, & quantitates in z ductæ unam partem æquationis constituent, reliquæ verò alteram, fietque $cz \propto + ccz + cdd$. Deinde dividatur utrobique

$$\begin{array}{r} +b \\ +2bc + ccd \\ +bb + bdd \\ +2bcd \\ +bbd \end{array}$$

per $c + b$, ut oriatur $z \propto +bz + dd$, five translatis omnibus

$$\begin{array}{r} +c + bd \\ +cd \end{array}$$

ad unam partem: $z - bz - dd \propto 0$.

$$\begin{array}{r} -c - bd \\ -cd \end{array}$$

Postquam igitur percurrimus data propositionis, eaque sic enodavimus, ut difficultas omnis sit translata ad æquationem


$$z - \frac{b}{c}z - \frac{bd}{cd} \propto 0, \text{ superest ut ostendamus eam quæ sit pro}$$

positionis satisfacere, quantum quidem ex suppositis datis deduci

Vu

duci potest. Hunc in finem tentanda erit divisio æquationis per $z - b - c - d \infty 0$, ut constet num verum sit, quod intenditur. Quare cum tentatâ divisione reperitur divisionem fieri posse, atque oriri $z + d \infty 0$, sequitur quoque quæsitum propositionis esse verum, hoc est, z æquari $b + c + d$, sive HI æqualem esse ipsis MN , BC , & ED simul sumptis. Quod erat demonstrandum.

Vnde liquet, si circulus non transiens per verticem Parabolæ eam tangat in M vel B , hoc est, rectas NM , CB sibi invicem æquales faciat, tunc HI æqualem fore ipsi DE , unâ cum dupla ipsius NM vel CB . Si enim in hac ultima æquatione prescribatur b ,



fiet æquatio $z z - 2 b z - d d \infty 0$, quæ dividi poterit per $-2 b d$
 $z - d - 2 b \infty 0$, & orietur $z + d \infty 0$. Id quod arguit z valere $d + 2 b$,

$d + 2b$, hoc est, HI æqualem esse compositæ ex DE & dupla NM seu CB.

Præterea hinc constat, (quod sanè animadversione dignum) si recta tangens Parabolam in aliquo puncto extra verticem ipsa ibidem quoque tangatur à Circulo non per verticem transeunte, quique Parabolam in eodem puncto secet, hoc est, ut rectæ NM, CB, & DE omnes tres sint inter se æquales: quòd tunc quidem HI ipsius NM, CB, vel DE tripla sit futura. Quippe considerando NM vel CB bis sumendam esse, propter hujus rectæ contractum in M vel B, ac deinde adhuc semel, propter Circuli & Parabolæ in eodem puncto intersectionem. Vele tiam in æquatione inventa $zz - bz - dd \infty 0$ pro c & d scribendo b , ac deinde

$$-c \quad -bd$$

$$-cd$$

$zz - 2bz - 3bb \infty 0$ dividendo per $z - 3b \infty 0$. oritur namque $z + b \infty 0$. Id quod arguit z valere $3b$, hoc est, HI triplæ ipsius NM, CB, vel DE esse æqualem.

Denique secet Circulus HBE Parabolam extra verticem A, ab utraque parte axis in duobus punctis; hinc quidem in H & M; istinc verò in B & E. Dico itidem HI, MN simul sumptas ipsis B C, E D simul sumptis esse æquales.

Positis enim iisdem quæ prius, invenietur similiter, sicut ante ostendimus, quadratum ex FM esse $xx - \frac{2bbx}{a} + \frac{b^2}{aa} + bb -$

$2by + yy$. Et quoniam per definitionem Circuli rectæ lineæ FB & FM sunt æquales, erunt quoque earum quadrata æqualia:

$$xx - \frac{2ccx}{a} + \frac{c^2}{aa} + yy + 2cy + cc \& xx - \frac{2bbx}{a} + \frac{b^2}{aa} + bb$$

$- 2by + yy$. Vnde deletis utrinque æqualibus, & reliquis per aa multiplicatis, si transferantur porrò quantitates in x ductæ, ut unam partem æquationis efficiant, reliquæ verò alteram, fiet

$$c^4 - b^4 + 2aac y + 2aaby + 4acc - aabb \infty 2accx - 2abbx.$$

Divisâ autem utrâque parte per $c + b$, orietur $c^3 - bcc + bbc - b^3 + 2aay + aac - aab \infty 2acx - 2abx$. Vbi


$$\text{rursus si utrinque dividatur per } 2ac - 2ab, \text{ orietur}$$

$$x \infty \frac{c^3 - bcc + bbc - b^3 + 2aay + aac - aab}{2ac - 2ab}.$$

Eodem modo, cum rectæ FE & FM sint æquales, erunt etiam earum quadrata $xx - \frac{2ddx}{a} + \frac{d^2}{aa} + dd + 2dy + yy \&$

$$Vu \ 2$$

$$xx -$$



$xx - \frac{2bbx}{a} + \frac{b^2}{a^2} + bb - 2by + yy$ æqualia. Quare si deman-
 tur utrobique æquales, & reliquæ ducantur in aa , nec non quan-
 titates in x ductæ disponantur ad unam, reliquæ verò ad alteram
 æquationis partem constituendam, fiet $d^2 - b^2 + 2aay +$
 $2aaby + aadd - aabb \propto 2addx - 2abbx$. Dividatur jam
 utraque pars per $d+b$, & proveniet $d^2 - bdd + bbd - b^2 +$
 $2aay + aad - aab \propto 2adx - 2abx$, & rursus utrinque per
 $2ad - 2ab$, orieturque $x \propto \frac{d^2 - bdd + bbd - b^2 + 2aay + aad - aab}{2ad - 2ab}$.

Quia verò quæ uni æquantur, illa quoque æqualia sunt inter
 se, erit $\frac{d^2 - bdd + bbd - b^2 + 2aay + aad - aab}{2ad - 2ab}$.

$\propto \frac{c^2 - bcc + bbc - b^2 + 2aay + aac - aab}{2ac - 2ab}$. Brevitatis autem

causâ pro $-b^2 + 2aay - aab$ scribatur, propter earundem
 quantitatum amphiboliam, $\S c^2$, & multiplicatâ utrâque æqua-
 litatis parte per $2a$, seu, quod idem est, diviso utriusque denomi-
 natore per $2a$, instituatur porro multiplicatio per crucem, ut fra-
 ctiones evanescant, fietque $cd^2 - bd^2 - bcdd + bbdd + bbcd$
 $- b^2d + aacd - aabd \S ce^2 \S be^2 \propto c^2d - c^2b - bccd +$
 $bbcc + bbcd - b^2c + aacd - aabc \S de^2 \S be^2$. Et, dele-
 tis .

Signum \S
 significat
 + vel -
 Signum \S
 significat
 + vel -
 sensu con-
 trario

us utrinque æqualibus, restitutoque valore quantitatis assumptæ prioris si-
 g^1 , fiet $cd^3 - bd^3 - bcdd + bdd - b^3d - aabd - b^3c$ gni, h. e., cum per signum 8 intelligitur
 $+ 2aacy - aabc \infty c^3d - c^3b - bccd + bbcc - b^3c - aabc$
 $- b^3d + 2aady - aabd$. Vbi si demum demantur utrobique
 æquales quantitates, & quæ in y ductæ sunt transferantur, ut u-
 nam faciant æquationis partem, reliquæ autem alteram, ac tan-
 dem divisio instituat per $d - c$, orietur $cdd + ccd - bdd -$
 $2bcd + bbd + bbc - bcc \infty 2aay$. tum per signum 8 intelligitur; aut cum per signum 8 intelligitur +.

Similiter, cum rectæ HF & FM æquales sint, erunt quoque
 earum quadrata $\frac{x^4}{a^2} - \frac{2xz^2}{a} + xx + xz - 2zy + yy$ & $xx - \frac{2bbx}{a}$
 $+ \frac{b^4}{a^2} + bb - 2by + yy$ æqualia. Vnde ablatis utrinque æquali-
 bus, reliquisque multiplicatis per aa , adhibeatur porro translatio,
 ut quantitates in x ductæ unam teneant æquationis partem, reli-
 quæ verò alteram, fietque $x^4 - b^4 + 2aaby - 2aaz + aaz$
 $- aabb \infty 2azx - 2abbx$. Dividatur jam utraque pars per
 $z - b$, & orietur $z^3 + bz + bbz + b^3 - 2aay + aaz + aab$
 $\infty 2azx + 2abx$. Rursus dividatur utrinque per $2az + 2ab$,
 & habebitur $x \infty \frac{z^3 + bz + bbz + b^3 - 2aay + aaz + aab}{2az + 2ab}$.

Quia verò & supra quantitas x inventa fuit
 $\infty \frac{c^3 - bcc + bbc - b^3 + 2aay + aac - aab}{2ac - 2ab}$, erunt
 $\frac{z^3 + bz + bbz + b^3 - 2aay + aaz + aab}{2az + 2ab}$ &
 $\frac{c^3 - bcc + bbc - b^3 + 2aay + aac - aab}{2ac - 2ab}$ inter se æqualia. Brevi-

tatis causâ, scribatur rursus g^1 pro $-b^3 + 2aay - aab$, &
 g^2 pro $+b^3 - 2aay + aab$, & multiplicatâ utrâque æquali-
 tatis parte per $2a$, seu, quod idem est, diviso utriusque denomina-
 tore per $2a$, instituat per crucem, ut fractiones
 evanescent, fietque $cz^3 - bz^3 + bcz - bbz + bccz -$
 $b^3z + aacz - aabz$ $\text{g}^1 \text{g}^2$ $\infty c^3z + b^3c - bccz -$
 $bbcc + aacz + b^3c + bccz + aabc$ $\text{g}^1 \text{g}^2$ $\infty c^3z + b^3c - bccz -$
 $bbcc + b^3c + aabc - b^3z + 2aaz - aabz$. Vbi si rursus
 utrobique demantur æquales, & quantitates in y ductæ ad unam

partem revocentur, reliquæ verò ad alteram, ac demum utraque pars æqualitatis dividatur per $z+c$, oriatur $czz-ccz-bzz+2bcz-bcc-bbz+bbc \propto 2aay$.

Cum verò & supra inventum fuerit $cd+ccd-bdd-2bcd+bbd+bbc-bcc \propto 2aay$, & quæ eidem æquantur, inter se quoque sint æqualia, erit $czz-ccz-bzz+2bcz-bcc-bbz+bbc \propto cdd+ccd-bdd-2bcd+bbd+bbc-bcc$. Deleantur utrinque æqualia, & quantitates in zz ductæ unam partem æquationis constituent, reliquæ verò alteram, habebiturque

$$\begin{array}{r} +czz \propto +ccz+ccd \\ -b \quad -2bc+ccd \\ +bb-bdd \\ -2bcd \\ +bbd \end{array}$$

tur per $c-b$, oriatur $zz \propto cz+dd$. Hoc est, si collocentur

$$\begin{array}{r} -b+cd \\ -bd \end{array}$$

quantitates omnes ad unam partem, erit

$$\begin{array}{r} zz-cz-dd \propto 0 \\ +b-cd \\ +bd \end{array}$$

Quare postquam percurrimus omnia propositionis data, ea-que sic enodavimus, ut difficultas omnis reducta sit ad æquationem $zz-cz-dd \propto 0$: superest ut ipsa contineat quæsitum

$$\begin{array}{r} +b-cd \\ +bd \end{array}$$

propositionis, modò sit verum atque ex datis deduci possit. Ad quod explorandum, videri debet, num æquatio inventa dividi possit per $z-c-d+b \propto 0$. Quare cum reperiat divisionem fieri posse, atque oriri $z+d \propto 0$, sequitur quæsitum propositionis esse verum, hoc est, $z+b$ æuari $c+d$, sive HI & MN simul sumptas æquales esse ipsiis BC & ED simul sumptis. Quod erat demonstrandum.

Vnde liquet, si Circulus non transiens per verticem Parabolæ eam tangat in B vel E, hoc est, rectas CB, DE sibi invicem æquales faciat, tunc HI, MN simul sumptas ipsius CB vel DE duplas fore.

Si enim in hac ultima æquatione prodescribatur c , erit æquatio

tio talis: $2c - c - 2c \infty 0$, quæ dividi potest per $2 - c +$
 $+ b + bc$

$b \infty 0$, & oritur $2 + c \infty 0$. Id quod arguit, 2 valere $2c - b$, sive
 $2 + b \infty 2c$, hoc est, HI & MN simul sumptas æquales esse
 ipsi C B seu D E bis sumptæ.

Quare constat Theorematis veritas.

Si autem habeatur $z^3 \infty - pz + q$, regula, cujus in-
ventionem Cardanus &c.] Quod ea, quæ de exprimendis ra-
 dicibus Equationum Cubicarum Autor hic breviter perstrinxit,
 cuivis manifestiora fiant: visum fuit post sequentis loci illustratio-
 nem asserre huc Appendicem, quam de Cubicarum Equationum
 resolutione anno 1646 simul cum Organica Conicarum Sectio-
 num descriptione in lucem emisimus, & nunc emendato hic illic
 sensu cum additione quorundam subjungimus.

Hanc autem curvam in 6 diversis punctis secare po-
test, ita ut hic sex diverse radices in Equatione ha-
beri queant. Atque cum illam in paucioribus secat, hoc
indicio est, quasdam ex hisce radicibus inter se æquales
esse, aut ipsarum aliquas esse tantum imaginarias.]
 Quoniam hic nonnulli scrupulum sibi ipsis injiciunt, concipien-
 di, qui fieri possit, ut circulus aliquis hanc curvam in 6 diversis
 punctis secet: haud abs re fore credidi, si hoc loco exemplum, quod
 sibi jam pridem ingeniosissimus Huddenus, ad difficultatem hu-
 jus rei è medio tollendam, subjecit, adducerem.

Quocirca sumendo ad hoc æquationem $y^6 - 21y^4 + 169y^2 -$
 $675y^1 + 1414y - 1464y + 576 \infty 0$, cujus radices, ut, 1, 2, 3,
 3, 4, & 8, sunt omnes veræ ac rationales, & ex his duæ, ut 3 & 3,
 ad calculi prolixitatem evitandam, inter se æquales: oportet, ad
 curvæ hujus descriptionem, assumere $AB \infty \frac{1}{2}p \infty 10\frac{1}{2}$,

$p \infty 21$ BK $\infty \sqrt{\frac{1}{V^2} + q} - \frac{1}{2}pp$ seu $n \infty \sqrt{\frac{479}{4}}$, & ED vel *Vide si*
 $q \infty 169$ *guras*
 $r \infty 675$ TV $\infty \frac{1V^2}{p^2} \infty \sqrt{\frac{9216}{211239}}$. Deinde, ut inveniatur *Pag. 98*
 $s \infty 1414$ circulus PCN, oportet, acceptâ BL æquali ED ∞ *et 100.*
 $t \infty 1464$
 $v \infty 576$ $\sqrt{\frac{9216}{211239}}$, assumere LH $\infty \frac{1}{2n\sqrt{v}} \infty \sqrt{\frac{1721}{479}}$; & ex pun-

cto H erectâ perpendiculari HI $\infty \frac{r}{2nn} + \frac{1V^2}{nn} + \frac{p^2}{4nn\sqrt{v}}$.

(id quod brevitatis causâ vocetur $\frac{m}{nn}$) $\infty \frac{2727}{479}$, in circulo cujus
 diame-

diameter I L inscribere $LP \propto \sqrt{\frac{f+P\sqrt{v}}{nn}} \propto \sqrt{\frac{7672}{479}}$: critque I P

radius quæsitæ circuli $\propto \sqrt{\frac{\frac{m}{nn} + \frac{11}{4nnv} - \frac{f}{nn} - \frac{P\sqrt{v}}{nn}}{\frac{5544000}{229441}}} \propto \sqrt{\frac{5544000}{229441}}$.

Iam ut constet, circulum hunc ex I intervallo invento I P descriptum secare vel tangere curvam A C N in tot diversis punctis, quot æquatio inæquales habet radices, hoc est, hic in 5 diversis punctis, cum propter duas æquales 3 & 3 circulus hanc curvam ibidem non secet sed tangat: considerandum est, lineam I M esse $\propto \frac{m}{nn} - y$ vel $y - \frac{m}{nn}$, adeoque quadratum ex I M semper esse $\frac{m}{nn} - \frac{2my}{nn} + yy$, & lineam G H vel C M semper

$\propto -y^3 + \frac{1}{2}Pyy + \frac{1}{2}\sqrt{v} - \sqrt{v}$. Ac proinde, si, tribuendo radici y

unumquemque ex supra dictis valoribus, ex lineis hisce, per 47 primi Elem. Eucl., quæramus lineam I C, eamque singulis vicibus æqualem reperiamus radio ante invento I P $\propto \sqrt{\frac{5544000}{229441}}$: certum est, quòd circulus P C N eandem curvam A C N, quemadmodum indicatum fuit, sit secturus vel tacturus.

Hinc, si ponatur $y \propto 1$, erit $\left\{ \begin{array}{l} \square \text{ I M. } \frac{5053504}{229441} \\ \square \text{ C M. } \frac{490496}{229441} \end{array} \right. y \propto 2$, erit $\left\{ \begin{array}{l} \square \text{ I M. } \frac{3129361}{229441} \\ \square \text{ C M. } \frac{2614639}{229441} \end{array} \right.$

adeoque $\square \text{ I C. } \frac{5544000}{229441}$ adeoque $\square \text{ I C. } \frac{5544000}{229441}$

$y \propto 3$, erit $\left\{ \begin{array}{l} \square \text{ I M. } \frac{1664100}{229441} \\ \square \text{ C M. } \frac{3879900}{229441} \end{array} \right. y \propto 4$, erit $\left\{ \begin{array}{l} \square \text{ I M. } \frac{657721}{229441} \\ \square \text{ C M. } \frac{4886279}{229441} \end{array} \right. y \propto 8$, erit $\left\{ \begin{array}{l} \square \text{ I M. } \frac{1221025}{229441} \\ \square \text{ C M. } \frac{4322975}{229441} \end{array} \right.$

adeoque $\square \text{ I C. } \frac{5544000}{229441}$ adeoque $\square \text{ I C. } \frac{5544000}{229441}$ adeoque $\square \text{ I C. } \frac{5544000}{229441}$.

Ex quibus igitur apparet, quòd, assumptâ qualibet ex radicibus, linea I C semper ipsi I P inveniatur æqualis, hoc est, quòd circulus, qui ex I intervallo I P describitur, curvam A C N in 5 diversis punctis secet vel tangat, in tot videlicet, quot æquatio proposita diversos admittit radices valores. Quod erat ostendendum.

Eodem modo liquet, si æquatio proposita 6 radices inæquales habuerit, quòd tunc quoque circulus P C N curvam A C N in 6 diversis punctis secet.

A P.

A P P E N D I X,

D E

C V B I C A R V M

ÆQVATIONVM RESOLVTIONE.



EQVATIONES Cubicæ omnes, & Quadrato-
quadrata, * quæ quidem & ad Cubicas reducun-
tur, quarum radix duarum est dimensionum, sem-
per ad aliquam trium sequentium formularum re-
duci possunt.

$$z^3 \propto * - pz + q.$$

$$z^3 \propto * + pz + q.$$

$$z^3 \propto * + pz - q.$$

* Vide quæ
habentur
pag. 92. d
lin. 11. us-
que ad fi-
nem ejus-
dem pagi-
na.

In priori autem formulâ, ubi z^3 æquatur $-pz + q$, regula
Cardani, cujus inventionem Scipioni Ferreo tribuit, nos docet ra-
dicem esse $\sqrt[3]{C. + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}} - \sqrt[3]{C. - \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$.

Quemadmodum etiam si habeatur $z^3 \propto + pz + q$, in qua qua-
dratum semissis ultimi termini sit majus cubo trientis quantitatis
cognitæ penultimi termini, similis regula ostendit radicem fore

$$\sqrt[3]{C. + \frac{1}{2}q + \sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}} + \sqrt[3]{C. + \frac{1}{2}q - \sqrt{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}}.$$

Vnde liquet in omnibus Problematis, quorum difficultates
ad æquationem hujus vel illius formulæ reducuntur, ejus æqua-
tionis radices, aliàs numero non explicabiles, semper hoc modo
juxta Cardani regulas per latera cuborum quorundam, quorum
contentum cognoscitur, exprimi posse.

Deinde verò si habeatur $z^3 \propto + pz + q$, ubi $\frac{1}{4}qq$ sit minus
quàm $\frac{1}{27}p^3$, ibi prædicta regula non habet locum, nec ejusdem
beneficio radix ullo modo intelligibili explicari potest, sicut infe-
rius ostendemus. Quæ quidem res olim multæ fuit caliginis, &
ut scribit Albertus Girardus in libello cui titulus: *Invention nou-
velle en l'Algebre*, qui anno 1629 prodiit: hoc est, in quo Autores
hactenus fuerunt valde intricati, & ut verum fatear in re quàm maxi-
mè difficili.

Hinc, quæ huc spectant subobscura, aut neglectâ demonstra-


Xx

tione

tione apud prædictos Autores invenimus, ea illustrare nobis visum fuit: præmittentes ad hoc sequentia Theoremata demonstrata.

THEOREMA I.

Si fuerit triangulum æquilaterum MNL circulo inscriptum, atque ex L educta utcumque recta LF usque ad circumferentiam in F , quæ secet MN in O , junctæque rectæ MF , FN : Dico FL æqualem esse ipsi MF , FN simul sumptis.



¹ per 21
prop. ter-
tii Elem.

² per 32
primi E-
lem.

³ per 4^{am}
sexti E-
lem.

⁴ per 24
quinti
Elem.


Triangula enim LNO & LNf similia sunt, cum habeant angulum ad L communem, & angulum LNO , hoc est, LMN ipsi LNf æqualem, unde & tertius LOn tertio LNf æqualis est. Quocirca ¹ erit ut NO ad LN , ita FN ad LF . Eodem modo cum similia sint triangula LMO & LFM , erit ut

MO ad LM seu LN , ita FM ad LF . Igitur ⁴ erit, ut NO , MO simul ad LN , ita FN , FM simul ad LF . Æquales autem sunt NO , MO simul sumptæ ipsi LN , æquales ergo quoque erunt FN , FM simul sumptæ ipsi LF . Quod erat ostendendum.

THEOREMA II.

Iisdem positis, ductâ diametro FHK , sumatur arcus GLK triplus arcus LK , jungaturque GF : Dico similiter arcum GMF arcus MF , nec non arcum GNF arcus NF triplum esse.

Ducatur enim diameter LHP . Hæc namque secabit arcum MFN bifariam in P . Quoniam autem propter triangulum æquilaterum MNL circumferentia circuli dividitur in tres partes æqua-



æquales, ac ipsa tripla est
arcus MPN, erit & se-
micircumferentia FMK
tripla arcus MP. Quo-
circa cum eadem ratio sit
arcus FMK ad arcum
MP, totius ad totum,
quæ arcus GLK ad ar-
cum LK seu FP, ablati
ad ablatum, erit quoque
reliqui arcus GMF ad
reliquum arcum MF ea-

dem ratio, quæ totius ad totum *. Triplus autem est arcus FMK
arcus MP. Triplus ergo etiam est arcus GMF arcus MF. Quod
erat demonstrandum. * per 19
quinta
Elem.

Eodem modo ostenditur arcum GNF arcus NF triplum esse.

THEOREMA III.


Iisdem positis, ducatur recta n N parallela f m, oc-
currens rectæ FL in N; itemque m M parallela f n,
secans quidem rectam FL in M, occurrens autem du-
ctæ n N in I: Dico si ducantur HI, HN, & HM ipsas
inter se æquales esse, unamquamque verò æqualem re-
ctæ LK.

Quoniam enim anguli m FM & NF n singuli circumferentiæ
tertiæ parti insunt, & ob parallelas ductas angulus FM m an-
gulo NF n æquatur, at angulus FN n angulo m FM: erunt trian-
gula m FM & NF n, quemadmodum etiam triangulum NM I
æquiangula, ac proinde æquilatera. Porro cum FL æquetur ipsis
 m F, FN simul sumptis (ut supra ostensum fuit); atque ablata FM
ipsi m F, erit reliqua MI ipsi FN æqualis: cumque FN æquetur
ipsi m I, erunt quoque MI & m I, atque adeo omnes tres m I,
 n N, & MI inter se æquales. Vnde si ab his æqualibus rectis aufe-
rantur rectæ inter se æquales MI, NI, & MN, remanebunt simili-
ter m M, n I, & NI inter se æquales. Præterea cum m n, n L, & L m
tres rectæ sint inter se æquales, liquet triangula m n I, n L N, & L m M

X x 2

inter


inter se constare ex æqualibus lateribus, ipsaque ob hoc & angulos singulos singulis æquales habere, hoc est, æquales inter se erunt anguli mnl , nln , & lmM . Quia autem & anguli mnh , nln , & lmH inter se æquales sunt, patet, si hi ex prædictis æqualibus inter se angulis demantur, reliquos itidem angulos hnl , hln , & hmM inter se æquales fore. Denique, propter æqualitatem radiorum hn , hl , & hm , perspicuum est, triangula hnl , hnl ,



& hmM habere inter se duo latera duobus lateribus, utrumque utrique æqualia; ac insuper angulum angulo, inter æqualia latera contentum: unde & basin basi æqualem habebunt, atque adeo æquales inter se erunt rectæ hl , hn , & hm . Quod autem præterea unaquæque ex ipsis æquetur rectæ LK , consequenter sic ostenditur. Producat h ut secet FL in Q . Hæc igitur ad rectos angulos cadet in FL , atque eam bifariam secabit in Q . Quia porro, propter similitudinem triangulorum FLK & FQH , FL est ad LK , ut FQ ad QH ; & permutando FL ad FQ , ut LK ad QH , atque FL ipsius FQ est dupla: erit quoque LK ipsius QH

QH dupla. Dupla autem etiam est H/ipsius QH, siquidem æquilaterum est triangulum M/N: quare & H/nec non HM, HN ipsi LK æquales erunt. Quod erat ostendendum.

Ex his perspicua sunt ea, quæ ab Alberto Girardo afferuntur in libello supra citato, ubi docet quo pacto radix æquationis $1 \odot \infty 13 \odot + 12$, in qua cubus trientis numeri radicem major est quadrato semissis numeri absoluti, sit exprimenda.



Vt autem pateat MN esse $\sqrt{13}$, ob $13 \odot$ in æquatione, sciendum est ductis rectis HM, MP triangulum HMP esse æquilaterum, ac proinde quadratum MR triplum esse quadrati HR. Quocirca cum eadem sit ratio duplæ MR, hoc est, ipsius MN ad duplam HR, hoc est, HP, quàm simplæ MR ad simplam HR: erit quoque quadratum MN quadrati HP triplum. Unde si statuamus radium circuli æqualem radici quadratæ ex triente numeri radicem 13, hoc est, $\infty \sqrt{4\frac{1}{3}}$, liquet MN tunc fore $\sqrt{13}$. Sicut proponebatur.

Lubet autem propositum ipsius ulteriùs inquirere, atque rem omnem paucis patefacere.

In quem finem ejusmodi quæstionem proponimus.

Circulo existente FGK, cujus diameter FK, in eoque inscripta FG, trifariam secetur arcus GK, à diametro & inscripta interceptus, in punctis I & L, & recta con-

X x 3 etatur

Etatur FL; datâ autem FH seu HK $\propto a$, & FG $\propto b$,
oporteat invenire FL $\propto x$.


¹ per 6
primi
Elem.
² per 21
cor 22
tertiū E-
lem. nec
non 13
primi
Elem.
³ per 29
tertiū
Elem.

Iungantur KL, LI, & IG, ductâque FI producatur ad S, do-
nec angulus FSL æquetur angulo IFL: eritque SL æqualis LF,
& SI æqualis FL. Æqualisenim est SL ipsi LF¹, & SI ipsi FK,
propter triangula ILS & KLF, quorum duo anguli LIS & S
unius singuli sunt æquales duobus LKF & LFK alterius², æ-
præterea latus IL lateri LK³. Eodem modo, productâ FG do-
nec angulus FTI æquetur angulo GFI; erit similiter TI æqua-
lis IF, atque TG ipsi LF. Porro cum similia sint triangula FHL,
FLS, & FIT: erit ut HF ad FL, ita LF ad FS. Vnde cum
HF sit $\propto a$, & FL $\propto x$, erit FS $\propto \frac{x}{a}$, è quâ si auferatur SI seu
KF $\propto a$, relinquetur IF $\propto \frac{x}{a} - a$. Eâdem ratione, cum sit ut

HF ad FL, ita IF ad FT, erit FT $\propto \frac{x^2}{a^2} - 2x$, è quâ si tollatur TG

seu FL $\propto x$, remanebit
GF $\propto \frac{x^2}{a^2} - 3x$. Restat

igitur, ut $\frac{x^3}{a^3} - 3x$ ad-
æquetur ipsi GF da-
tæ $\propto b$. Quare æquali-
tate ordinatâ, x^3 æqua-
bitur $3ax + aab$. Quæ
æquatio secundæ for-
mulæ est, in quâ qua-
dratum semissis ultimi
termini est minus cubo
trientis quantitatis co-
gnitæ penultimi: majus
enim est a^3 quàm $\frac{1}{4}a^2bb$.
Nam si utrobique divi-
damus per a^3 , fit aa ma-
jus quàm $\frac{1}{4}bb$, cum, u-
trinque extrahendo ra-
dicem, a fiat majus quàm
 $\frac{1}{2}b$, seu a majus quàm b .
Vt est manifestum, cum
 $2a$ dia-



2 ^a diametrum circuli referat, *b* autem in eodem inscriptam GF, atque diameter omnium rectorum circulo inscriptarum ¹ sit maxima. Vnde si ^a æquetur ^a *bb*, tunc quoque inscripta GF æqualis erit diametro FK: ita ut eo casu duæ hæ linearum coincident, ac eadem fiat quæstio ac si semicircumferentia FGK in tres æquales partes secanda foret. Quo quidem casu radix quæsitæ FL sit latus trianguli æquilateri, eodem circulo inscripti.

E quibus plana sunt illa, quæ ad explicationem radicis supradictæ æquationis $1 \textcircled{1} \infty 13 \textcircled{1} + 12$ Albertus Girardus in medium affert. Vbi inter $4\frac{1}{3}$ (tertiam partem ipsius 13) & unitatem, mediam proportionalem invenit $\sqrt{4\frac{1}{3}}$, eamque semidiametrum circuli statuit FH, quâ ut radio ipsum describit, ac in eo deinde lineam FG adaptat æqualem $2\frac{1}{3}$, (quotienti videlicet divisionis 12 per $4\frac{1}{3}$). In quo porro trifariam secando arcum GK in punctis I & L, jungendoque FL, ait FL esse valorem radicis quæsitæ $1 \textcircled{1}$ æquationis propositæ. Dicens præterea alios duos valores ipsius $\textcircled{1}$, per — expressos, designari per rectas FM, FN, eosque duobus modis inveniri. Iuxta priorem quidem, si ² centro H & in ² ut in fig. pag. 348. intervallo LK arcus describatur MN, secans FL in M & N; Iuxta ³ ut in fig. pag. 347. posteriorem verò, ³ describendo in circulo à puncto L triangulum æquilaterum LMN, jungendoque FM & FN. Illas enim utroque modo easdem inveniri, ex supra demonstratis manifestum est.

Vbi præterea notat in æquatione $1 \textcircled{1} \infty 13 \textcircled{1} - 12$ ostensos valores prioris æquationis radici quæsitæ propositæ æquationis satisfacere, si tantum eorum signa + & — immutaverimus, eaque denotaverimus per — FL, + FM, & + FN. Sed hoc ex sequentibus perspicuum fiet. Quemadmodum etiam illud, quod spectat ad æquationes secundæ formulæ, quas inquit neminem ad suum usque tempus resolvere scivisse, quæ secundum Analysin speciosam Vietæ ita denotantur:

$$\left. \begin{array}{l} \text{A cubus æqualis} + \text{BB} \\ + \text{BC} \\ + \text{CC} \end{array} \right\} \text{in A} \quad \left. \begin{array}{l} + \text{B} \\ + \text{C} \end{array} \right\} \text{in BC}.$$

Quod eodem fecidit ac si earundem constitutionem sic agnosceres, conciperesque è duobus lateribus, puta B & C, facta esset tria proportionalia plana BB, BC & CC, quorum aggregatum sit BB + BC + CC, seu quantitas *p*; & quod sit ex medio plano

plano in aggregatum eorundem laterum sit $\overline{B+C}$ in BC , seu quantitas g . Quod quidem ultimum factum sic quoque interpretari poteris, dicendo illud produci ex multiplicatione duorum priorum planorum in latus secundum; vel etiam ex summa duorum posteriorum planorum in latus primum: cum tria illa solida inter se æqualia sint, ut experienti constabit.

Vt autem penitiùs hæc introspeciamus, atque æquationum harum constitutionem agnoscamus, ponamus $x \propto d$ seu $x - d \propto 0$, & rursus $x \propto -b$ seu $x + b \propto 0$, ac denuo $x \propto -c$ seu $x + c \propto 0$, ducamusque $x - d \propto 0$ in $x + b \propto 0$, tum verò quod inde fit in $x + c \propto 0$, & prodibit æquatio:

$$\begin{array}{rcl}
 x^3 - dxx - bdx - bcd \propto 0, & \text{vel} & x^3 \propto dxx + bdx + bcd. \\
 +b & -cd & -b & +cd \\
 +c & +bc & -c & -bc
 \end{array}$$

In qua si ponatur d , verus valor radices x , æqualis $b + c$, duobus falsis valoribus ipsius x simul sumptis, tunc quidem $+d$ destruet $-b$, fietque $0xx$, hoc est, evanescet adfectio sub quadrato, nec ampliùs sese destruent. Nam cum ex hypothesi d æquatur $b + c$, communi multiplicatore d , fiet quoque dd æquale $bd + cd$. At verò dd majus est quàm bc , quandoquidem idem valet quod $bb + 2bc + cc$, quadratum videlicet à $b + c$. Quare & $bd + cd$ majus erit quàm bc , manebitque adfectio sub latere cum signo $+$. Ita ut, si $+bd + cd - bc$ interpreteris per $+p$, & $+bcd$ per $+q$, æquatio hanc recipiat formam: $x^3 \propto +px + q$. Quam itaque constat tres admittere diversos radices valores, unum quidem verum seu $+$ quàm 0 , & alios duos falsos seu $-$ quàm 0 , qui simul sumpti ipsi vero sunt æquales.

Porro, ut hæc æquatio tres semper ejusmodi radices valores recipiat, requiritur, ut in illâ $\frac{2}{3}p\sqrt{\frac{1}{3}p}$ non sit minus quàm q , seu quod idem est, ut $2\sqrt{\frac{1}{3}p}$ non sit minus quàm $\frac{3}{p}q$, sive etiam $\frac{2}{3}p^3$ non minus quàm $\frac{4}{3}q^3$. Quandoquidem, si p planum in tria plana dividitur proportionalia, maximum solidum, quod fit ex ductu summæ duorum priorum vel duorum posteriorum in latus secundum vel primum, est illud, quod fit, cum p planum in tria plana æqualia dividitur.

Aliàs enim radix ejusdem æquationis de unico tantum valore explicabilis est, utpote verò, cum æquatio tunc non producat

ex

ex ductu trium ejusmodi laterum in se invicem, nisi duo sumantur fictitia seu non existentia, quæ & impossibilia appellantur. Quemadmodum in exemplum afferre licet æquationem $1 C \infty 6 N + 40$, ubi $1 N$ valet $+4$, cum $1 C 80 Q - 6 N - 40 \infty 0$ *Signum 8* dividatur per $1 N - 4 \infty 0$, oriaturque æquatio impossibilis $1 Q + 4 N + 10 \infty 0$, quæ nullas omnino admittit radices. Nisi velis illas, quarum sanè valor nullo modo comprehendi potest, utcunque tamen exprimere, ut scribendo $1 N \infty -2 + \sqrt{-6}$, nec non $1 N \infty -2 - \sqrt{-6}$. Ita ut verus valor ipsius $1 N$ realis existat & sit 4 , & duo falsi ficticii sint $-2 + \sqrt{-6}$, & $-2 - \sqrt{-6}$. *significat + vel -*

Quòd si verò proponatur æquatio $1 \alpha \infty 6 \alpha + 6$, seu $1 \alpha 80 \alpha - 6 \alpha - 6 \infty 0$, quæ per $1 \alpha + \text{vel} -$ aliquo numero, ultimum terminum 6 dividente, dividi nequit, poterit neque radix ejus 1α per ullum numerum absolutum vel fractum designari; sed verum valorem admittet, qui est irrationalis, quique juxta secundam Cardani regulam (hîc ante expositam) sic exprimitur: $1 \alpha \infty \sqrt{\alpha 4 + \sqrt{\alpha 2}}$.

In quo porrò sensu æquatio prioris formulæ accipi debet, quæ nullæ determinationi est obnoxia. Nam si, verbi gratiâ, proponatur $1 C \infty -3 N + 14$, poterit $1 C 80 Q + 3 N - 14 \infty 0$ dividi per $1 N - 2$, & oriatur æquatio impossibilis $1 Q + 2 N + 7 \infty 0$. Vnde liquet $1 N$ valere tantum 2 , nec ullos alios valores admittere; nisi eos sic velis exprimere $-1 + \sqrt{-6}$, & $-1 - \sqrt{-6}$.

Sin autem æquatio ejusdem formulæ sit $1 \alpha \infty -3 \alpha + 10$ seu $1 \alpha 80 \alpha + 3 \alpha - 10 \infty 0$, quæ per $1 N -$ aliquo numero, ultimum terminum 10 dividente, dividi nequit, valor quoque verus radice nullo numero absoluto vel fracto designari poterit. Quo igitur casu explicabitur secundum priorem Cardani regulam, hoc modo: $1 \alpha \infty \sqrt{\alpha. \sqrt{26 + 5}} - \sqrt{\alpha. \sqrt{26 - 5}}$.

Sed hæc mittentes veniamus ad ea, quibus secundæ formulæ æquationis usum detegamus. Proponentes in eum finem hoc quod sequitur.


P R O B L E M A.

In semicirculo supra diametrum AD descripto quadrilatero ABCD, cognita sint tria ejus latera AB, BC, & CD: Oporteatque invenire diametrum seu quartum latus AD.

Esto AB $\propto a$, BC $\propto b$, CD $\propto c$, diameter verò AD $\propto x$; ducaturque recta BD, atque in BC productam perpendicularis demittatur DE.

¹ per 31
terti
Elem.
² per 47
primi E-
lem.
³ per 12
secundi
Elem.

Quia itaque ¹ triangulum ABD est rectangulum, ideoque ² quadratum AD \propto quadrato AB, BD: si à quadrato AD $\propto xx$ subducatur quadratum AB $\propto aa$, relinquetur quadratum BD $\propto xx - aa$. Porro quoniam obtusangulum est ³ triangulum BDC, atque ¹ quadratum BD majus quadrato BC, CD simul sumptis, duplo rectangulo BCE; si à quadrato BDC $\propto xx - aa$ subducamus aggregatum quadratorum BC, CD $\propto bb$



⁴ per 22
terti
Elem.

+ cc, restabit duplum rectangulum BCE $\propto xx - aa - bb - cc$. Denique cum similia sint triangu-
la ABD & CED, siquidem
ipsa rectangula sunt, ac an-
gulos præterea A & DCE
æquales habent: erit ut
DA ad AB, ita DC ad

CE. Vnde cum AD sit $\propto x$, AB $\propto a$, & DC $\propto c$ erit CE $\propto \frac{ac}{x}$.

Quæ si ducatur in duplam BC $\propto 2b$, fiet duplum rectangulum BCE $\propto \frac{2abc}{x}$. Æquandum propterea duplo rectangulo BCE

ante invento $\propto xx - aa - bb - cc$. Quare $\frac{2abc}{x}$ æquabitur
 $xx - aa - bb - cc$. Hoc est ordinatâ æqualitate, erit

$$\begin{aligned} x^3 &\propto + aax + 2abc. \\ &\quad + bb \\ &\quad + cc \end{aligned}$$

Vnde cum hæc æquatio sit cubica secundæ formulæ, viden-
dum deinceps an quadratum semissis ultimi termini sit majus cu-
bo trientis quantitatis cognitæ penultimi, an verò ipsi æquale, an

co

eo minus. In quem finem quæro tam hunc cubum quàm illud quadratum. Triens autem quantitatis cognitz penultimi termini est $\frac{aa+bb+cc}{3}$, ejus cubus

$$a^3 + 3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + b^3 + 6aabbcc + 3b^2cc + 3aac^2 + 3bb^2c + c^3.$$

Quadratum autem semissis ^{27.} ultimi termini est $aabbcc$. Oportet itaque horum utriusque relationem indagare. In quem finem productas quantitates $a^6 + 3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + b^6 + 6aabbcc + 3b^2cc + 3aac^2 + 3bb^2c + c^6$ & $27aabbcc$ inter se conféro, ut sequitur.

$3a^2bb$, $3aabbcc$, $3bb^2c$, sunt tres proportionales in ratione aa ad cc , unde $3a^2bb + 3bb^2c$ majus erit quàm $6aabbcc$, per 25 quinti Elementorum.

Sic $3aab^2$, $3aabbcc$, $3aac^2$, sunt tres proportionales in ratione bb ad cc , unde $3aab^2 + 3aac^2$ majus erit quàm $6aabbcc$.

Vt & $3a^2cc$, $3aabbcc$, $3b^2cc$, sunt tres proportionales in ratione aa ad bb , unde $3a^2cc + 3b^2cc$ majus erit quàm $6aabbcc$.

Quare & omnes simul omnibus simul erunt majores, hoc est, erit $3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + 3bb^2c + 3aac^2 + 3b^2cc$ majus quàm $18aabbcc$.

Vnde & illius subtriplum $a^2bb + aab^2 + a^2cc + bb^2c + aac^2 + b^2cc$ majus quàm hujus subtriplum $6aabbcc$.

Rursus quoniam a^6 , a^2bb , aab^2 , b^6 , sunt proportionales continuè in ratione aa ad bb , erit $a^6 + b^6$ majus quàm $a^2bb + aab^2$.

Sic etiam quia b^6 , b^2cc , bb^2c , c^6 , sunt proportionales continuè in ratione bb ad cc , erit $b^6 + c^6$ majus quàm $b^2cc + bb^2c$.

Similiter cum a^6 , a^2cc , aac^2 , c^6 , sint proportionales continuè in ratione aa ad cc , erit $a^6 + c^6$ majus quàm $a^2cc + aac^2$.

Quare & simul omnes simul omnibus erunt majores, hoc est, erit $2a^6 + 2b^6 + 2c^6$ majus quàm $a^2bb + aab^2 + b^2cc + bb^2c + a^2cc + aac^2$. Quia autem hoc ipsum majus est quàm $6aabbcc$, ut supra ostendimus, erit $2a^6 + 2b^6 + 2c^6$ majus quàm $6aabbcc$. Vnde & semissis $a^6 + b^6 + c^6$ majus quàm $3aabbcc$.

Quocirca cum $3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + 3bb^2c + 3aac^2 + 3b^2cc$ majus sit quàm $18aabbcc$, ac ipsi addatur $a^6 + b^6 + c^6$ quod majus est quàm $3aabbcc$, & adhuc utrobique $6aabbcc$ majus quàm $27aabbcc$.

Fiet quoque $a^6 + 3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + b^6 + 6aabbcc + 3b^2cc + 3aac^2 + 3bb^2c + c^6$ majus quàm $27aabbcc$.

E quibus liquet cubum trientis quantitatis cognitz penultimi termini majorem esse quadrato semissis ultimi, ac propterea radicem æquationis juxta regulam Cardani inveniri non posse.

Notandum autem porro est, Problema propositum solidum esse, si tria latera data AB , BC , & CD inter se inæqualia statuuntur, cum ad æquationem cubicam reducatur, quæ divisione ad quadratam reduci nequit. Cùm verò duo quolibet ex dictis lateribus sunt æqualia, tunc quidem æquatio reducitur ad quadratam. Vt si b & c æqualia fuerint, devenietur ad æquationem: $x^3 - \frac{a^3}{abb}x - 2abb \infty 0$, quæ dividi poterit per $x + a \infty 0$, quâ ratione ipsa reducetur ad quadratam: $xx - ax - 2bb \infty 0$, quæ ulterius dividi nequit.

Sin autem tria latera æqualia ponantur, tunc quidem æquatio hanc accipiet formam: $x^3 - 3aax - 2a^3 \infty 0$, eamque dividi poterit per $x - 2a \infty 0$, orietur namque æquatio: $xx + 2ax + aa \infty 0$, duas admittens falsas radices, quæ sibi invicem sunt æquales. Unde sequitur verum valorem radicis x eo casu fore $2a$, & duos falsos valores esse $-a$ & $-a$. Hoc enim manifestum est, quoniam, si tria latera AB , BC , & CD æqualia inter se extiterint, figura $ABCD$ fit semi-hexagonum regulare, in quo latus quodlibet semidiametro est æquale.

Porro si velimus idem Problema per numeros resolvere, esto AB seu $a \infty 24$, BC seu $b \infty 20$, CD seu $c \infty 15$, & quærat $AD \infty x$. Hinc, cum $aa + bb + cc$ inveniatur $\infty 1201$, & $2ab \infty 14400$, exurget ejusmodi æquatio: $x^3 \infty 1201x + 14400$, seu $x^3 \infty 0$, oritur namque æquatio $xx - 25x - 576 \infty 0$, seu $xx \infty 25x + 576$, cujus radix x duos admittit valores, ut $12\frac{1}{2} + \sqrt{732\frac{1}{2}}$ & $12\frac{1}{2} - \sqrt{732\frac{1}{2}}$. Ita ut radix prædictæ æquationis $x^3 \infty 1201x + 14400$ seu diameter quæsitæ AD tres recipiat diversos valores, unum verum seu $+$ quàm 0 , ut $12\frac{1}{2} + \sqrt{732\frac{1}{2}}$; atque duos falsos seu $-$ quàm 0 , ut -25 & $12\frac{1}{2} - \sqrt{732\frac{1}{2}}$. Qui quidem simul sumpti ipsi vero sunt æquales.

Quòd si verò æquatio supra dicta $x^3 \infty 1201x - 14400 \infty 0$ dividi non potuisset per quantitatem incognitam $x +$ vel $-$ aliquo numero ultimum terminum 14400 dividente, arguisset id ipsum & neque ullam ex radicibus tam veram quàm falsam


sam ullo numero exprimi potuisse, sed eam hoc casu denotandam esse per rectam datum angulum vel arcum in tres æquales partes dividendem, vel alio denique modo, ut infra ostendetur.

Vt si, exempli gratiâ, proponatur æquatio $x^3 \propto 243 x + 1215$, seu $x^3 80xx - 243 x - 1215 \propto 0$, quæ cum præcedenti modo dividi nequeat, poterit neque ulla ex radicibus tam vera quam falsa ullis numeris exprimi, nec minùs per latera quorundam cuborum, quorum contentum cognoscitur, ut docet Cardani regula. Quandoquidem ad illam revocare non licet, cum hîc cubus trientis numeri radicum major sit quàm quadratum semissis numeri absoluti. Aded ut radix ejus per sectionem anguli in tres æquales partes sit denotanda, quemadmodum innuit Albertus Girardus. Nimirum describendo circulum cujus radius FH seu HK sit 9 seu $\sqrt{\frac{1}{3}p}$, in eoque adaptando rectam FG æqualem 15 seu $\frac{1}{2}p$, atque trifariam porrò secando arcum GK seu angulum GFK per rectam FL, quam ait veram quantitatem ipsius radices exprimere. Vbi præterea, si centro H intervallo rectæ LK arcum descriperimus secantem ipsam FL in M & N¹, vel quod ^{ut in fig. 2^{da}. 349^a} idem est à puncto L triangulum æquilaterum circulo inscripserimus LMN², rectæ FM & FN utramque falsam quantitatem ra ^{ut in fig. pag. 350.} dicis x designabunt.

Quod idem cum D. des Cartes in eundem ferè modum licebit exsequi. Videlicet, si, ^{ut in fig. 2^{da}. 349^a} intervallo rectæ FH vel HK $\propto 9$ seu $\sqrt{\frac{1}{3}p}$ describatur circulus, in quo, inscriptâ rectâ FG $\propto 15$ seu $\frac{1}{2}p$, ar- ^{pag. 350.} cus FMG & FNG trifariam porrò secentur, per rectas FM & FN, quas inquit simul sumptas radici quæ sit esse æquales.

Sin autem ejusdem æquationis radicem juxta modum Viëtæ exponere lubeat, Oportebit duo triangula æquicrura concipere, cruribus alterum alteri æqualia, quorum secundi angulus, qui est ad basin, triplus sit anguli, qui est ad basin primi, & intelligere basin quidem secundi esse $7\frac{1}{2}$ seu $\frac{1}{2}p$, crus verò esse 9 seu $\sqrt{\frac{1}{3}p}$. x autem, de qua quæritur, esse basin primi.

Quod ut cuivis obvium sit, supponamus triangula illa esse ABC, & CDE, quorum crus quodlibet AB, BC, CD, vel DE sit $\propto a$, & basis secundi CE $\propto b$: Oporteatque invenire basin primi AC $\propto x$.



Quia itaque demissis ad hoc perpendicularibus BI, DK, in triangulo rectangulo ABI, quadratum ex AI $\propto \frac{1}{2}xx$ subductum à quadrato ex AB $\propto aa$; relinquit quadratum ex BI $\propto \frac{1}{2}xx$; erit quadratum ex BI $\propto aa - \frac{1}{2}xx$.

Eodem modo, in triangulo rectangulo CDK, quadrato ex CK $\propto \frac{1}{2}bb$ subducto à quadrato ex CD $\propto aa$, relinquitur $aa - \frac{1}{2}bb$, pro quadrato ex DK.

Porro quoniam, propter similitudinem triangulorum ABI & ADK², AI est ad IB, sicut AK ad KD: erit quoque ut $\frac{1}{2}xx$, quad. ex AI, ad $aa - \frac{1}{2}xx$, quad. ex IB; sic $xx + bx + \frac{1}{2}bb$, quad. ex AK, ad $aa - \frac{1}{2}bb$, quad. ex KD. Vnde multiplicando extrema, inuenietur productum $\frac{1}{2}aaxx - \frac{1}{16}bbxx$ quale $aaxx + aabx + \frac{1}{2}aabb - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}bx^3 - \frac{1}{16}bbxx$, producto sub mediis. Hoc est, demptis utrinque æqualibus, & terminis omnibus per 4 ductis, si ipsi deinde ad unam partem transferantur, habebitur $x^4 + bx^3 - 3aaxx - 4aabbx - aabb \propto 0$. Quæ summa si porro per $x + b \propto 0$ dividatur, obtinebitur æquatio $x^3 - 3aax - aabb \propto 0$, seu $x^3 \propto * + 3aax + aab$. eadem nempe quæ superior pag. 350, in qua cubus trientis quantitatis cognitz penultimi termini excedit quadratum semissis ultimi termini, cuiusque æquationis vera radix illic per rectam FL, hic autem per rectam AC designatur.

Cæterum quod angulus secundi trianguli DCE, qui est ad basin, triplus sit anguli A, qui est ad basin primi, ita patet: Æquales enim sunt anguli A & BCA³, propter æqualia crura AB, BC; & ob id⁴ externus CBD alterutrius hujus duplus. Est autem hic CBD æqualis ipsi CDB⁵, propter æqualitatem linearum CB, CD. Quare & CDB, id est, CDA ipsius A duplus est. Atqui⁶ binis hisce A & CDA æqualis est externus DCE.

¹ per 47
primi
Elem.

² per 4
Sexti
Elem.

³ per 5
primi
Elem.

⁴ per 32
primi
Elem.

⁵ per 5
primi
Elem.

⁶ per 32
primi
Elem.

DCE. Hinc, qualium partium angulus A est 1, talium angulus CDA erit 2, & DCE 3, hoc est, triplus erit angulus DCE anguli A. Quemadmodum fuit propositum.

Denique quoniam omnes similes æquationes ad æquationem præcedentis Problematis revocari queunt, poterimus quoque radicem x æquationis propositæ $x^3 - 243x + 1215$ sic interpretari: dicentes eam esse diametrum semicirculi, supra quam descripto quadrilatero inæqualium laterum, tria superiora in se invicem ducta faciant $607\frac{1}{2}$ seu 1215 ; at verò summa quadratorum ex ipsis faciat 243 seu 243 .

Vbi præterea notandum, æquationem numericam $x^3 - 12x + 12$, à Girardo allatam, non indigere ut radix ejus hoc modo exprimitur, cum in illa x^3 valeat $+4$, -3 , & -1 ; ac ipsa æquatio $x^3 - 8x + 12$ seu $x^3 - 12x + 12$ per $x^3 - 4x + 0$, & per $x^3 + 3x + 0$, atque etiam per $x^3 + 12x + 0$ dividi queat. Ita ut tantum radices earum æquationum secundæ formulæ juxta aliquem præcedentium modorum opus sit exprimere, in quibus constat ipsas nec numero, nec Cardani regulâ exprimi posse.

Sed jam tempus est ut ad tertiam æquationem Cubicarum formulam accedamus, ubi z^3 æquatur $* + pz - q$.

Hæc autem æquatio tres diversos radices valores admittit, duos nempe veros & unum falsum, æqualem veris illis simul sumptis, sicut ex ejusdem æquationis constitutione agnoscere licet. Nam si ponamus $x = b$ seu $x - b = 0$, & $x = c$ seu $x - c = 0$, atque etiam $x = d$ seu $x + d = 0$, & multiplicemus $x - b = 0$ per $x - c = 0$, ac denuo quod inde fit per $x + d = 0$, proveniet æquatio:

$$x^3 + dx - bdx + bcd = 0, \text{ vel } x^3 - dxx + bdx - bcd \\ -b -cd +b +cd \\ -c +bc +c -bc$$

In qua si ponatur d , valor falsus radices x , æqualis $b + c$, duobus veris valoribus ipsius x simul sumptis, tunc quidem $b + c$ destruet $-d$, fietque $0xx$, hoc est, evanescet adfectio sub xx , nec amplius sese destruent. Nam cum ex hypothesi $b + c$ æquatur d , multiplicando utrinque per d , fiet quoque $bd + cd$ æquale dd . At verò dd majus est quàm bc , quandoquidem tantundem valet ac $bb + 2bc + cc$, quadratum videlicet à $b + c$. Quare & $bd + cd$ majus erit quàm bc , manebitque adfectio sub x cum signo—. Ita

Ita

Ita ut, si $+bd+cd-bc$ interpreteris per $+p$, & $-bcd$ per $+q$, æquatio hanc induat formam: $x^3 \propto * +px - q$. Quam constat tres admittere differentes valores radices x , duos quidem veros seu $+quàm\ 0$, unum autem falsum seu $-quàm\ 0$, æqualem veris illis simul sumptis.

Porro ut hæc æquatio recipiat semper tres ejusmodi radices valores, requiritur ut in illa $\frac{2}{3}p \sqrt[3]{\frac{2}{3}p}$ non sit minus quàm q , seu $2\sqrt[3]{\frac{2}{3}p}$ non minus quàm $\frac{3}{2}q$, sive etiam $\frac{2}{3}p^3$ non minus quàm $\frac{1}{4}qq$. Ob rationem supra dictam.

Aliàs enim duo veri valores non nisi fictitii forent, nec ullus realis extaret præter falsum, qui juxta Cardani regulam sic exprimeretur: $x \propto \sqrt[3]{C. \frac{1}{3}q + \sqrt{\frac{1}{3}qq - \frac{1}{27}p^3}} + \sqrt[3]{C. \frac{1}{3}q - \sqrt{\frac{1}{3}qq - \frac{1}{27}p^3}}$.

Vt in exemplum afferre licet æquationem: $1 \propto 6x - 40$, in qua $1x$ valet -4 , cum $1 \propto 8 \ 0x - 6x + 40 \propto 0$ dividi queat per $1x + 4 \propto 0$, oriaturque æquatio impossibilis $1x - 4x + 10 \propto 0$, seu $1x \propto 4x - 10$, cujus valores radices nullo modo comprehendi possunt, nisi eos sic exprimere velimus: $1x \propto 2 + \sqrt{-6}$, & $1x \propto 2 - \sqrt{-6}$. Adeò ut duo veri valores ipsius $1x$ sint tantùm fictitii $2 + \sqrt{-6}$ & $2 - \sqrt{-6}$, & falsus realis sit $\propto -4$.

E quibus patet tertiæ hujus atque secundæ formulæ æquationum convenientia mutuaque radicum suarum reciprocatio.


Lubet autem in usum æquationis hujus tertiæ formulæ unum aut alterum Problema adducere, ut sequentia manifestiora fiant.

PROBLEMA.

Circulo dato FMGN, in eoque inscriptâ FG, trifariam secetur arcus uterque FMG & FNG in M & N: Oporteatque invenire FM subtensam trientis unius, & FN subtensam trientis alterius.

Esto FH seu HK $\propto a$, FG $\propto b$, & FM $\propto x$, quæzaturque ex HF & FM seu datis juxta modum paginæ 91 hujus Geometriæ inscripta FG, perinde atque ipsa esset incognita: quæ ideo erit $3x - \frac{x^3}{a^2}$. Iam verò cum ipsa detur $\propto b$, erit $3x - \frac{x^3}{a^2} \propto b$. Vnde æqualitate ordinatâ, x^3 æquabitur $3ax - aab$.

Eodem



Eodem modo, si pro FN
ponatur x , atque ex HF &
FN quæramus FG, incide-
mus in eandem æquationem.
E quibus sequitur utramlibet
subtensam FM vel FN quæ-
sitæ quantitati radicis x æqua-
lem esse. Hinc cum $1 \textcircled{1}$ æque-
tur $13 \textcircled{1} - 12$, seu $1 \textcircled{1} 80$
 $\textcircled{1} - 13 \textcircled{1} + 12$ æquetur 0,
ac ipsa æquatio dividi possit
per $1 \textcircled{1} - 1 \textcircled{1} 00$, & per $1 \textcircled{1}$

$- 3 \textcircled{1} 00$, nec non per $1 \textcircled{1} + 4 \textcircled{1} 00$: arguit id ipsum FM fore 1,
at verò FN 3. Porro quoniam æquationes hujus tertiæ formulæ
æquæ ac secundæ formulæ tres admittunt differentes valores ra-
dicis, quorum quidem duo simul sumpti tertio sunt æquales, ita
& addendo duos veros 1 & 3, fiet falsus $- 4$, seu quantitas lineæ
FL, quæ ipsis MF & FN simul sumptis ostensa est æqualis.

Vnde perspicua fiunt ea, quæ ab Alberto Girardo in libello su-
pra citato allata sunt ad æquationum radices hujus tertiæ formulæ
inveniendas. Vbi docet, illas ad secundum casum secundæ for-
mulæ revocandas esse, convertendo tantum signum $-$ numeri
absoluti in signum $+$: cum in iis sicut hîc cubus trientis numeri
radicum non minor requiratur quàm quadratum semissis numeri
absoluti. Ac proinde inventis tribus valoribus radicis quæsitæ,
sicut in secunda formula explicuimus, oportet tantum illos ex 0
auferre seu eorum signa immutare, ut habeantur tres quæsitæ hu-
jus, in qua duo semper veri sunt seu $+$ quàm 0, & tertius est fal-
sus seu $-$ quàm 0, quemadmodum est ostensum.

ALIUD PROBLEMA.


*In circulo, cujus diameter AD, inscriptis tribus inæ-
qualibus rectis lineis AB, BC, & CD, sibi invicem con-
tiguës, quarum quidem extremæ prodeunt ex diametri
terminis A & D: Oportet ex iisdem cognitis invenire
diametrum AD.*

Ponatur ad hoc $AB \propto a, BC \propto b, CD \propto c, \& AD \propto x$. jun-
gan-

Lz

ganturque A C, B D, & in B C, productam, si opus sit, perpendicularis demittatur D E.

Duplex autem hic occurrit casus considerandus, juxta quem hæc inscriptæ diversimodè in circulo positæ intelligi possunt; primus, in quo rectæ A B & C D è diametri terminis prodeunt ad diversas partes; & secundus, in quo ipsæ ex iisdem terminis educæ sunt ad eandem partem, se mutuò interfecantes. In priori igitur positione si quadratum B D $\propto x x - a a$ subducatur ex ag-




^{1 per 13} gregato quadratorum B C, C D $\propto b b + c c$, relinquetur ¹ dup-
^{secunda} plum rectangulum B C E $\propto b b + c c - x x + a a$. Deinde, quo-
^{Elem.} niam triangula A B D & C E D similia sunt, cum anguli ad B & E
^{2 per 21} sint recti, & B A D, E C D æquales ², utpote eidem peripheriæ
^{terti} B D insistentes: crit ut D A $\propto x$ ad A B $\propto a$, ita D C $\propto c$ ad
^{Elem.} C E $\propto \frac{a c}{x}$. Hæc autem ducta in duplam B C $\propto 2 b$ dat duplum re-

ctangulum B C E $\propto \frac{2 a b c}{x}$, æquale $b b + c c - x x + a a$, duplo vi-
 delicet rectangulo B C E, ante invento. Vnde ordinatâ æquatio-
 ne invenitur: $x^3 \propto + a a x - 2 a b c$, æquatio cubica tertiæ for-
 $+ b b$
 $+ c c$

mulæ, in qua quadratum semissis ultimi termini est minus cubo
 quantitatis cognitæ penultimi termini, ut constat ex præmissis
 Problemate paginæ 354.

In secunda autem positione, si à quadrato D C $\propto c c$ auferantur
^{1 per 12} quadrata D B, B C $\propto x x - a a + b b$, relinquetur ¹ duplum re-
^{secunda} ctangulum C B E $\propto c c - x x + a a - b b$. Cæterum, quoniam
^{Elem.} rursus



rursus propter similitudinem triangulorum ABD & CED , $AD \propto x$ est ad $AB \propto a$, sicut $DC \propto cad$ CE : erit $CE \propto \frac{ac}{x}$. Equâ subductâ $CB \propto b$, remanebit $BE \propto \frac{ac}{x} - b$. Hæc autem si multiplicetur per duplam CB , proveniet dup-

plum rectangulum $CBE \propto \frac{2abc}{x} - 2bb$: æquale duplo rectangulo CBE ante invento $\propto cc - xx + aa - bb$. Vnde addito utrinque bb , ordinatâque secundum artem æquatione, obtinebitur eadem atque superior: $x^3 \propto + aax - 2abc$.
 $+bb$
 $+cc$

Quocirca cum utroque casu in eandem incidamus æquationem, cujus radix diametrum referat AD , sequitur quoque eam differentem sortiri quantitatem, & ex eisdem datis inscriptis pro diversa earum positione dupliciter inveniri.

Vbi præterea notandum est, Problema propositum esse solidum, si tres inscriptæ $AB, BC, \& CD$ inæquales inter se fuerint: siquidem ad cubicam æquationem ascendit, quæ divisione ad quadratam reduci nequit. Quum verò duæ quælibet ex inscriptis æquales ponuntur, tunc quidem æquatio inventa reducetur ad quadratam, & Problema erit planum. Statuendo enim $b \& c$ æqualia, exsurgit æquatio talis: $x^3 - aax + 2abb \propto 0$, quæ di-

vidi poterit per $x - a \propto 0$, & orietur æquatio quadrata $xx + ax - 2bb \propto 0$, quæ ulterius non est reducibilis.

Si autem juxta alterutram positionem omnes hæ tres inscriptæ æquales fiantur, ita ut inde deducatur æquatio $x^3 - 3aax + 2a^3 \propto 0$, poterit hæc ipsa dividi per $x + 2a \propto 0$, orieturque æquatio $xx - 2ax + aa \propto 0$, quæ porro dividi poterit per $x - a \propto 0$, & orietur $x - a \propto 0$. Quoniam verò hoc casu inscriptæ cum diametro coïncidere intelliguntur ac ipsi diametro esse æquales, constat æquationis radicem x , hoc est, diametrum AD duos in co-

Z z 2

admit-

admittere veros valores sibi invicem æquales, qui singuli per unamquamque ex illis inscriptis designantur; ac præterea falsum, alterutrius illius duplum.

Ceterùm si desideremus propositum Problema per numeros resolvere, esto $AB \infty a \infty 24$, $BC \infty b \infty 20$, $CD \infty c \infty 15$, & quæzatur $A D \infty x$. Hinc cum $aa + bb + cc$ sit 1201, & $2abc \infty 14400$, invenietur æquatio talis: $x^3 \infty 1201x - 14400$, seu $x^3 \text{ } 80xx - 1201x + 14400 \infty 0$. Quæ dividi potest per $x - 25 \infty 0$, oritur namque æquatio $xx + 25x - 576 \infty 0$, seu $xx \infty -25x + 576$. Cujus porrò vera radix est $\sqrt{732\frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$, & falsa $-\sqrt{732\frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$. Ita ut diametrum quæzita AD , hoc est, x radix prædictæ æquationis $x^3 \infty 1201x - 14400$, tres ferat differentes valores, duos scilicet veros seu $+$ quàm 0, nimirum $+25$ majorem, & $\sqrt{732\frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$ minorem, & unum falsum seu $-$ quàm 0, nimirum $-\sqrt{732\frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$, qui veris istis simul sumptis est æqualis. Quocirca cum tres superioris æquationis $x^3 \infty 1201x + 14400$ radices inventæ sint -25 , $12\frac{1}{2} - \sqrt{732\frac{1}{2}}$, & $12\frac{1}{2} + \sqrt{732\frac{1}{2}}$, patet eas tantùm ex 0 esse auferendas, seu earum signa esse immutanda, ad habendas tres radices hujus posterioris æquationis.

Quòd si verò hæc ipsa æquatio $x^3 \text{ } 80xx - 1201x + 14400 \infty 0$ dividi non potuisset per quantitatem incognitam x vel $-$ aliquo numero ultimum terminum 14400 dividente, argumentum fuisset quòd & nulla radicum tam vera quàm falsa ullo numero fuisset explicabilis, sed eam tunc designandam esse per rectam datum angulum vel arcum in tres æquales partes dividendem, vel alio denique modo, ut infra ostendetur.

Vt si in exemplum proponatur æquatio $x^3 \infty 2700x - 32400$, seu $x^3 \text{ } 80xx - 2700x + 32400 \infty 0$, quæ cum præcedenti modo dividi nequeat, poterit quoque valor radicis x , sive is verus sive falsus fuerit, nullis numeris exprimi, nec per latera quorundam cuborum, quorum contentum cognoscitur, ut docent Cardani regulæ. Quippe illum ad has non revocare licet, cum ipsæ exigant ut cubus trientis numeri radicum à quadrato semissis numeri absoluti auferatur, qui quidem cubus hîc major datur. Ad eò ut radices ejus per rectas subtendentes trientem anguli vel arcus dati sint denotandæ, ut vult D. des Cartes, atque ut etiam Albertus Girardus innuit. Scilicet describendo circumulum cujus radius


FH

FH seu HK sit 30 seu $\sqrt{\frac{1}{2}p}$, in eoque accommodando rectam
 FG $\propto 36$ seu $\frac{1}{2}p$, atque deinde trifariam secando utrumque ar-
 cum FMG & FNG per rectas FM & FN. Nam uti circulus,
 cujus radius 30 per inscriptam 36 in duos inæquales arcus dispe-
 scitur, ita quoque incognita quantitas x duplicem verum valorem
 sortitur; sitque alterutra è subtenfis FM vel FN, tam trientis
 FM minoris arcus FMG, quàm trientis FN majoris FNG:
 Falsus autem ejusdem valor æqualis est veris illis simul sumptis,
 atque per rectam FL designatur.

Quos binos radices valores cum Vieta Aliâ porrò ratione ex-
 plicare licet, ut sequitur.

Duo intelligantur triangula æquicrura, cruribus alterum alteri
 æqualia, quorum secundi angulus, qui est ad basin, sit triplus an-
 guli, qui est ad basin primi, & basis secundi intelligatur esse 18
 seu $\frac{1}{2}p$, crus verò 30 seu $\sqrt{\frac{1}{2}p}$. x autem de qua quæritur, esse basin
 dimidiam primi, multatam continuatamve longitudine ejus re-
 ctæ, cujus quadratum est æquale triplo quadrato altitudinis primi.

Quod ut perspicuum fiat, fingantur triangula illa esse ABC &
 CDE, quorum (ut ante) crus quodlibet AB, BC, CD, vel DE
 sit $\propto a$, & basis secundi CE sit $\propto b$. Demissis autem in iis perpen-
 dicularibus BI, DK, sumatur BF æqualis duplæ BI: eritque FI
 recta, cujus quadratum est æquale triplo quadrato altitudinis primi.



Quibus ita positis, ut inveniatur AF, liquet, si pro ea pona-
 mus y , & pro AC, ut ante, ponamus x , quadratum ex BI fore $\propto aa$
 $-\frac{1}{2}xx$, adeoque quadratum ex FI $\propto 3aa - \frac{1}{2}xx$. Quoniam verò
 ex AI $\propto x$ sublatâ AF $\propto y$, relinquitur FI $\propto x - y$, cujus qua-
 dratum est $\frac{1}{2}xx - xy + yy$: erit $\frac{1}{2}xx - xy + yy \propto 3aa - \frac{1}{2}xx$.

Hoc est, ordinatâ æquatione, habebitur $xx \propto yx + 3aa$. Vnde

— yy
 extractâ radice, fit $x \propto \frac{1}{2}y \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{2}yy}$. Hinc, si in æquatione olim inventa $x^3 \propto * + 3aax + aab$ in locum x substituatur valor inventus $\frac{1}{2}y \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{2}yy}$, & in locum x^3 ejus cubus, qui est $\frac{2}{3}aay - y^3 \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{2}yy}$, obtinebimus æquationem $y^3 \propto * + 3aay - aab$. Cujus ideo vera radix erit linea A F.

Eodem modo ad inveniendam F C, si pro ea ponamus z , atque ab ipsa tollamus I C $\propto \frac{1}{2}x$, remanebit F I $\propto z - \frac{1}{2}x$. Vnde cum quadratum ejus sit $z^2 - xz + \frac{1}{4}xx$: erit itidem $z^2 - xz + \frac{1}{4}xx \propto 3aa - \frac{1}{2}xx$. Hoc est, ordinatâ æquatione, habebitur $xx \propto zx + 3aa$. Et fit, extractâ radice $x \propto \frac{1}{2}z \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{2}zz}$.

— zz
 Hinc si rursus in æquatione olim inventa $x^3 \propto * + 3aax + aab$ in locum x subrogetur valor inventus $\frac{1}{2}z \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{2}zz}$, & in locum x^3 ejus cubus $\frac{2}{3}aaz - z^3 \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{2}zz}$, obtinebimus æquationem $z^3 \propto * + 3aaz - aab$. Cujus ideo vera radix est linea F C.

Ex quibus colligitur, si æquatio proposita fuerit $x^3 \propto * + 3aax - aab$, eandem duas admittere veras radices, quarum minor A F obtinetur, si ex A I vel I C dimidia base primi trianguli A B C auferatur recta F I, cujus quadratum sit æquale triplo quadrato ejusdem altitudinis B I; & major, si ad A I vel I C ipsa F I addatur. Omnino ut fuit propositum.

Vbi porro advertendum, quòd, in eadem æquatione $x^3 \propto * + 3aax - aab$, ob mutuam radicum æquationis hujus tertix ac secundæ formulæ reciprocationem, tertia radix fit falsa, quæ per A C, basin primi trianguli A B C, designatur, quæque ipsis veris A F, F C simul sumptis est æqualis. Et contra si æquatio fuerit $x^3 \propto * + 3aax + aab$, quòd præter veram, quæ per A C exhibetur, aliæ duæ extent falsæ, quarum minor est A F, & major F C, quæ similiter simul sumptæ ipsi veræ A C sunt æquales.

Denique quoniam omnes similes æquationes ad æquationem posterioris Problematis revocari queunt, poterimus quoque propositæ æquationis $x^3 \propto 2700x - 32400$ valores radices x sic exprimere: Dicentes eos per diametrum circuli A D designari, in quo si inscribantur tres rectæ lineæ inæquales A B, B C, & C D, fibi

sibi invicem contiguæ, quarum extremæ prodeunt è diametri terminis A & D, solidum ex ipsis tribus sit $\infty 16200$ seu $\frac{1}{2}q$, & summa quadratorum earundem sit $\infty 2700$ seu p . Nam quemadmodum hæ tres inscriptæ cum diametro duobus modis girgillum referunt, & utrâque positione diameter duplicem quantitatem sortitur, ita quoque ipsa in hac vel illa positione veram semper radicem designat. Falsa autem, ipsis veris adæquans, exhibetur per diametrum semicirculi, in quo descripto supra diametrum quadrilatero, tria hujus reliqua latera dictis inscriptis sumpta sint æqualia. Vt ex superioribus manifestum est.

Vbi advertendum insuper restat, æquationem numericam $1 \textcircled{1} \infty 13 \textcircled{1} - 12$, à Girardo propositam, non requirere ut radices ejus hoc modo exprimantur: cum in illa $1 \textcircled{1}$ valeat $-4, +1$, & $+3$, ac ipsa æquatio $1 \textcircled{1} 8 \textcircled{2} - 13 \textcircled{1} + 12 \infty 0$ per $1 \textcircled{1} + 4 \infty 0$, & per $1 \textcircled{1} - 1 \infty 0$, nec non per $1 \textcircled{1} - 3 \infty 0$ dividi possit. Ita ut duntaxat radices earum æquationum tertiæ formulæ juxta aliquem præcedentium modorum opus sit exprimere, in quibus constat ipsas nec numero, nec Cardani regula explicari posse.

Vnde demum cum D. des Cartes concludere licet, valorem radicem æquæ faciliè, immo quidem faciliùs concipi, cum ipse per subtenfas arcuum designatur, quorum triplum est datum, quam cum per latera certorum cuborum exprimitur, quorum non nisi contentum cognoscitur. Præterquam quòd ad illas subtenfas non magis indigeamus aliquo charactere peculiari, quam $\sqrt[3]{C}$. ad exprimenda latera cubica, & $\sqrt[3]{C}$ ad quadrata. Adeo ut cubicarum æquationum valores radicum, qui nec numero nec per Cardani regulas exprimi queunt, allatis quidem modis clarè ac distinctè explicari possint.

Cæterum ne quid hic desideretur, sed etiam appareat, quo pacto hæ Cardani regulæ fuerint inventæ, lubet hoc loco afferre eas, quæ circa hanc rem acutissimus noster Huddenius olim adinvenit, mihiq; coram communicavit.

Proponatur æquatio $z^3 \infty * - pz + q$, & sit z quantitas, quam invenire oportet.

Ponatur ad hoc $z \infty x - y$. Eritque $z^3 \infty x^3 - 3xy + 3xy - y^3$. Vnde cum & z^3 æquetur $-pz + q$: erit similiter $-pz + q \infty x^3 - 3xy + 3xy - y^3$.

Divi-


P R O B L E M A.

In semicirculo supra diametrum AD descripto quadrilatero ABCD, cognita sint tria ejus latera AB, BC, & CD: Oporteatque invenire diametrum seu quartum latus AD.

Esto $AB \propto a$, $BC \propto b$, $CD \propto c$, diameter verò $AD \propto x$; ducaturque recta BD, atque in BC productam perpendicularis demittatur DE.

¹ per 31
terti
Elem.
² per 47
primi E-
lem.
³ per 12
secundi
Elem.

Quia itaque ¹ triangulum ABD est rectangulum, ideoque ² quadratum AD æquale duobus quadratis AB, BD: si à quadrato AD $\propto xx$ subducatur quadratum AB $\propto aa$, relinquetur quadratum BD $\propto xx - aa$. Porro quoniam obtusangulum est triangulum BDC, atque ³ quadratum BD majus quadratis BC, CD simul sumptis, duplo rectangulo BCE; si à quadrato B $\propto xx - aa$ subducamus aggregatum quadratorum BC, CD $\propto bb$



⁴ per 22
terti
13 primi
Elem.

+ cc, restabit duplum rectangulum BCE $\propto xx - aa - bb - cc$. Denique cum similia sint triangu-
la ABD & CED, siquidem
ipsa rectangula sunt, ac an-
gulos præterea A & DCE
æquales habent: erit ut
DA ad AB, ita DC ad

CE. Vnde cum AD sit $\propto x$, AB $\propto a$, & DC $\propto c$ erit CE $\propto \frac{ac}{x}$.

Quæ si ducatur in duplam BC $\propto 2b$, fiet duplum rectangulum BCE $\propto \frac{2abc}{x}$. Equandum propterea duplo rectangulo BCE

ante invento $\propto xx - aa - bb - cc$. Quare $\frac{2abc}{x}$ æquabitur
 $xx - aa - bb - cc$. Hoc est ordinatæ æqualitate, erit

$$\begin{aligned} x^3 &+ aax + 2abc \\ &+ bb \\ &+ cc \end{aligned}$$

Vnde cum hæc æquatio sit cubica secundæ formulæ, viden-
dum deinceps an quadratum semissis ultimi termini sit majus cu-
bo trientis quantitatis cognitæ penultimi, an verò ipsi æquale, an

co

eo minus. In quem finem quæro tam hunc cubum quàm illud quadratum. Triens autem quantitatis cognitz penultimi termini est $\frac{aa+bb+cc}{3}$, ejus cubus

$$a^3 + 3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + b^3 + 6aabbcc + 3b^2cc + 3aac^2 + 3bbc^2 + c^3.$$

Quadratum autem semissis ultimi termini est $aabbcc$. Oportet itaque horum utriusque relationem indagare. In quem finem productas quantitates $a^6 + 3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + b^6 + 6aabbcc + 3b^2cc + 3aac^2 + 3bbc^2 + c^6$ & $27aabbcc$ inter se conféro, ut sequitur.

$3a^2bb : 3aabbcc. 3bbc^2$. sunt tres proportionales in ratione aa ad cc , unde $3a^2bb + 3bbc^2$ majus erit quàm $6aabbcc$, per 25 quinti Elementorum.

Sic $3aab^2 : 3aabbcc. 3aac^2$. sunt tres proportionales in ratione bb ad cc , unde $3aab^2 + 3aac^2$ majus erit quàm $6aabbcc$.

Vt & $3a^2cc : 3aabbcc. 3b^2cc$. sunt tres proportionales in ratione aa ad bb , unde $3a^2cc + 3b^2cc$ majus erit quàm $6aabbcc$.

Quare & omnes simul omnibus simul erunt majores, hoc est, erit $3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + 3bbc^2 + 3aac^2 + 3b^2cc$ majus quàm $18aabbcc$.

Vnde & illius subtriplum $a^2bb + aab^2 + a^2cc + bbc^2 + aac^2 + b^2cc$ majus quàm hujus subtriplum $6aabbcc$.

Rursus quoniam $a^6. a^2bb. aab^2. b^6$. sunt proportionales continuè in ratione aa ad bb , erit $a^6 + b^6$ majus quàm $a^2bb + aab^2$.

Sic etiam quia $b^6. b^2cc. bbc^2. c^6$. sunt proportionales continuè in ratione bb ad cc , erit $b^6 + c^6$ majus quàm $b^2cc + bbc^2$.

Similiter cum $a^6. a^2cc. aac^2. c^6$. sint proportionales continuè in ratione aa ad cc , erit $a^6 + c^6$ majus quàm $a^2cc + aac^2$.

Quare & simul omnes simul omnibus erunt majores, hoc est, erit $2a^6 + 2b^6 + 2c^6$ majus quàm $a^2bb + aab^2 + b^2cc + bbc^2 + a^2cc + aac^2$. Quia autem hoc ipsum majus est quàm $6aabbcc$, ut supra ostendimus, erit $2a^6 + 2b^6 + 2c^6$ majus quàm $6aabbcc$. Vnde & semissis $a^6 + b^6 + c^6$ majus quàm $3aabbcc$.

Quocirca cum $3aabb + 3aaba + 3aac^2 + 3bbc^2 + 3aac^2 + 3b^2cc$ majus sit quàm $18aabbcc$, ac ipsi addatur $a^6 + b^6 + c^6$ ————— quod majus est quàm $3aabbcc$, & adhuc utrobique $6aabbcc$ ————— $6aabbcc$.

Fiet quoque $a^6 + 3a^2bb + 3aab^2 + 3a^2cc + b^6 + 6aabbcc + 3b^2cc + 3aac^2 + 3bbc^2 + c^6$ majus quàm $27aabbcc$.

E quibus liquet cubum trientis quantitatis cognitæ penultimi termini majorem esse quadrato semissis ultimi, ac propterea radicem æquationis juxta regulam Cardani inveniri non posse.

Notandum autem porro est, Problema propositum solidum esse, si tria latera data $A B$, $B C$, & $C D$ inter se inæqualia statuuntur, cum ad æquationem cubicam reducatur, quæ divisione ad quadratam reduci nequit. Cum verò duo quælibet ex dictis lateribus sunt æqualia, tunc quidem æquatio reducitur ad quadratam. Vt si b & c æqualia fuerint, devenietur ad æquationem: $x^3 - \frac{a^3}{16b}x - 2abb \infty 0$, quæ dividi poterit per $x + a \infty 0$, quâ ratione ipsa reducetur ad quadratam: $xx - ax - 2bb \infty 0$, quæ ulterius dividi nequit.

Sin autem tria latera æqualia ponantur, tunc quidem æquatio hanc accipiet formam: $x^3 - 3aax - 2a^3 \infty 0$, eaque dividi poterit per $x - 2a \infty 0$, orietur namque æquatio: $xx + 2ax + aa \infty 0$, duas admittens falsas radices, quæ sibi invicem sunt æquales. Unde sequitur verum valorem radicis x eo casu fore $2a$, & duos falsos valores esse $-a$ & $-a$. Hoc enim manifestum est, quoniam, si tria latera $A B$, $B C$, & $C D$ æqualia inter se extiterint, figura $A B C D$ fit semi-hexagonum regulare, in quo latus quodlibet semidiametro est æquale.

Porro si velimus idem Problema per numeros resolvere, esto $A B$ seu $a \infty 24$, $B C$ seu $b \infty 20$, $C D$ seu $c \infty 15$, & quæritur $A D \infty x$. Hinc, cum $aa + bb + c$ inveniatur $\infty 1201$, & $2ab \infty 14400$, exurget ejusmodi æquatio: $x^3 \infty 1201x + 14400$, seu $x^3 \infty 1201x - 14400 \infty 0$. Quæ dividi potest per $x + 25 \infty 0$, oritur namque æquatio $xx - 25x - 576 \infty 0$, seu $xx \infty 25x + 576$, cujus radix x duos admittit valores, ut $12\frac{1}{2} + \sqrt{732\frac{1}{2}}$ & $12\frac{1}{2} - \sqrt{732\frac{1}{2}}$. Ita ut radix prædictæ æquationis $x^3 \infty 1201x + 14400$ seu diameter quæsitæ $A D$ tres recipiat diversos valores, unum verum seu $+$ quàm 0 , ut $12\frac{1}{2} + \sqrt{732\frac{1}{2}}$; atque duos falsos seu $-$ quàm 0 , ut -25 & $12\frac{1}{2} - \sqrt{732\frac{1}{2}}$. Qui quidem simul sumpti ipsi vero sunt æquales.

Quod si verò æquatio supra dicta $x^3 \infty 1201x - 14400 \infty 0$ dividi non potuisset per quantitatem incognitam $x +$ vel $-$ aliquo numero ultimum terminum 14400 dividente, arguisset id ipsum & neque ullam ex radicibus tam veram quàm falsam.

sam ullo numero exprimi potuisse, sed eam hoc casu denotandam esse per rectam datum angulum vel arcum in tres æquales partes dividendam, vel alio denique modo, ut infra ostendetur.

Vt si, exempli gratiâ, proponatur æquatio $x^3 \infty 243x + 1215$, seu $x^3 80xx - 243x - 1215 \infty 0$, quæ cum præcedenti modo dividi nequeat, poterit neque ulla ex radicibus tam vera quàm falsa ullis numeris exprimi, nec minùs per latera quorundam cuborum, quorum contentum cognoscitur, ut docet Cardani regula. Quandoquidem ad illam revocare non licet, cum hîc cubus trientis numeri radicum major sit quàm quadratum semissis numeri absoluti. Addeò ut radix ejus per sectionem anguli in tres æquales partes sit denotanda, quemadmodum innuit Albertus Girardus. Nimirum describendo circulum cujus radius FH seu HK sit 9 seu $\sqrt{\frac{1}{3}p}$, in eoque adaptando rectam FG æqualem 15 seu $\frac{1}{2}p$, atque trifariam porrò secando arcum GK seu angulum GFK per rectam FL, quam ait veram quantitatem ipsius radicis x exprimere. Vbi præterea, si centro H intervallo rectæ LK arcum describerimus secantem ipsam FL in M & N¹, vel quod ^{ut in fig. pag. 349.} idem est à puncto L triangulum æquilaterum circulo inscripserimus LMN², rectæ FM & FN utramque falsam quantitatem xa ^{ut in fig. pag. 350.} dicis x designabunt.


Quod idem cum D. des Cartes in eundem ferè modum licebit exsequi. Videlicet, si, ³ intervallo rectæ FH vel HK $\infty 9$ seu $\sqrt{\frac{1}{3}p}$ ^{ut in fig. pag. 350.} describatur circulus, in quo, inscriptâ rectâ FG $\infty 15$ seu $\frac{1}{2}p$, arcus FMG & FNG trifariam porrò secentur, per rectas FM & FN, quas inquit simul sumptas radici quæritæ esse æquales.

Sin autem ejusdem æquationis radicem juxta modum Viëtz exponere lubeat, Oportebit duo triangula æquicrura concipere, cruribus alterum alteri æqualia, quorum secundi angulus, qui est ad basin, triplus sit anguli, qui est ad basin primi, & intelligere basin quidem secundi esse $7\frac{1}{2}$ seu $\frac{1}{2}p$, crus verò esse 9 seu $\sqrt{\frac{1}{3}p}$. x autem, de qua quæritur, esse basin primi.

Quod ut cuiusvis obvium sit, supponamus triangula illa esse ABC, & CDE, quorum crus quodlibet AB, BC, CD, vel DE sit ∞a , & basis secundi CE ∞b : Oporteatque invenire basin primi AC ∞x .

Yy 3

Quia



¹ per 47
primi
Elem.

Quia itaque demissis ad hoc perpendicularibus BI, DK, in triangulo rectangulo ABI, quadratum ex AI $\infty \frac{1}{4}xx$ subductum à quadrato ex AB ∞aa , relinquit quadratum ex BI $\infty \frac{1}{4}xx$: erit quadratum ex BI $\infty aa - \frac{1}{4}xx$.

Eodem modo, in triangulo rectangulo CDK, quadrato ex CK $\infty \frac{1}{4}bb$ subducto à quadrato ex CD ∞aa , relinquetur $aa - \frac{1}{4}bb$, pro quadrato ex DK.

² per 4
Secuti
Elem.

Porrò quoniam, propter similitudinem triangulorum ABI & ADK², AI est ad IB, sicut AK ad KD: erit quoque ut $\frac{1}{4}xx$, quad. ex AI, ad $aa - \frac{1}{4}xx$, quad. ex IB; sic $xx + bx + \frac{1}{4}bb$, quad. ex AK, ad $aa - \frac{1}{4}bb$, quad. ex KD. Vnde multiplicando extrema, inuenietur productum $\frac{1}{4}aaxx - \frac{1}{16}bbxx$ quale $aaxx + aabx + \frac{1}{4}aabb - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{4}bx^3 - \frac{1}{16}bbxx$, producto sub mediis. Hoc est, demptis utrinque xqualibus, & terminis omnibus per 4 ductis, si ipsi deinde ad unam partem transferantur, habebitur $x^4 + bx^3 - 3aaxx - 4aabbx - aabb \infty 0$. Quæ summa si porrò per $x + b \infty 0$ dividatur, obtinebitur æquatio $x^3 - 3aax - aabb \infty 0$, seu $x^3 \infty * + 3aax + aab$. eadem nempe quæ superior pag. 350, in qua cubus trientis quantitatis cognitz penultimi termini excedit quadratum semissis ultimi termini, cujusque æquationis vera radix illic per rectam FL, hic autem per rectam AC designatur.

³ per 5
primi
Elem.

⁴ per 32
primi
Elem.

⁵ per 5
primi
Elem.

⁶ per 32
primi
Elem.

Cæterum quòd angulus secundi trianguli DCE, qui est ad basin, triplus sit anguli A, qui est ad basin primi, ita patet: Æquales enim sunt anguli A & BCA³, propter xqualia crura AB, BC; & ob id⁴ externus CBD alterutrius hujus duplus. Est autem hic CBD xqualis ipsi CDB⁵, propter xqualitatem linearum CB, CD. Quare & CDB, id est, CDA ipsius A duplus est. Atqui⁶ binis hisce A & CDA xqualis est externus DCE.

DCE. Hinc, qualium partium angulus A est 1, talium angulus CDA erit 2, & DCE 3, hoc est, triplus erit angulus DCE anguli A. Quemadmodum fuit propositum.

Denique quoniam omnes similes æquationes ad æquationem præcedentis Problematis revocari queunt, poterimus quoque radice æquationis propositæ $x^3 \ominus 243x + 1215$ sic interpretari: dicentes eam esse diametrum semicirculi, supra quam descripto quadrilatero inæqualium laterum, tria superiora in se invicem ducta faciant $607\frac{1}{2}$ seu $\frac{1215}{2}$; at verò summa quadratorum ex ipsis faciat 243 seu p .

Vbi præterea notandum, æquationem numericam $1 \textcircled{1} \ominus 13 \textcircled{1} + 12$, à Girardo allatam, non indigere ut radix ejus hoc modo exprimat, cum in illa $1 \textcircled{1}$ valeat $+4$, -3 , & -1 ; ac ipsa æquatio $1 \textcircled{1} 80 \textcircled{2} - 13 \textcircled{1} - 12 \textcircled{2} 0$ per $1 \textcircled{1} - 4 \textcircled{2} 0$, & per $1 \textcircled{2} + 3 \textcircled{2} 0$, atque etiam per $1 \textcircled{2} + 1 \textcircled{2} 0$ dividi queat. Ita ut tantum radices earum æquationum secundæ formulæ juxta aliquem præcedentium modorum opus sit exprimere, in quibus constar ipsas nec numero, nec Cardani regulâ exprimi posse.

Sed jam tempus est ut ad tertiam æquationum Cubicarum formulam accedamus, ubi z^3 æquatur $* + px - q$.

Hæc autem æquatio tres diversos radices valores admittit, duos nempe veros & unum falsum, æqualem veris illis simul sumptis, sicut ex ejusdem æquationis constitutione agnoscere licet. Nam si ponamus $x \textcircled{1} b$ seu $x - b \textcircled{2} 0$, & $x \textcircled{1} c$ seu $x - c \textcircled{2} 0$, atque etiam $x \textcircled{1} d$ seu $x + d \textcircled{2} 0$, & multiplicemus $x - b \textcircled{2} 0$ per $x - c \textcircled{2} 0$, ac denuo quod inde fit per $x + d \textcircled{2} 0$, proveniet æquatio:

$$x^3 + dx - bdx + bcd \textcircled{2} 0, \text{ vel } x^3 \textcircled{1} - dxx + bdx - bcd. \\ \begin{array}{r} -b \quad -cd \quad \quad \quad +b \quad +cd \\ -c \quad +bc \quad \quad \quad +c \quad -bc \end{array}$$

In qua si ponatur d , valor falsus radices x , æquales $b + c$, duobus veris valoribus ipsius x simul sumptis, tunc quidem $b + c$ destruet $-d$, fietque $0xx$, hoc est, evanescet adfectio sub xx , nec amplius sese destruent. Nam cum ex hypothesi $b + c$ æquatur d , multiplicando utrinque per d , fiet quoque $bd + cd$ æquale dd . At verò dd majus est quàm bc , quandoquidem tantundem valet ac $bb + 2bc + cc$, quadratum videlicet à $b + c$. Quare & $bd + cd$ majus erit quàm bc , manebitque adfectio sub x cum signo—. Ita

Ita

Ita ut, si $+bd+cd-bc$ interpreteris per $+p$, & $-bcd$ per $+q$, æquatio hanc induat formam: $x^3 \propto * + px - q$. Quam constat tres admittere differentes valores radices x , duos quidem veros seu $+$ quàm 0, unum autem falsum seu $-$ quàm 0, æqualem veris illis simul sumptis.

Porro ut hæc æquatio recipiat semper tres ejusmodi radices valores, requiritur ut in illa $\frac{2}{3}p \sqrt[3]{\frac{1}{3}p}$ non sit minus quàm q , seu $2\sqrt[3]{\frac{1}{3}p}$ non minus quàm $\frac{3}{p}q$, sive etiam $\frac{2}{3}p^3$ non minus quàm $\frac{1}{3}qq$. Ob rationem supra dictam.

Aliàs enim duo veri valores non nisi fictitii forent, nec ullus realis extaret præter falsum, qui juxta Cardani regulam sic exprimeretur: $x \propto \sqrt[3]{C. \frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{3}qq - \frac{1}{27}p^3}} + \sqrt[3]{C. \frac{1}{3}q - \sqrt[3]{\frac{1}{3}qq - \frac{1}{27}p^3}}$.

Vt in exemplum afferre licet æquationem: $1x \propto 6x - 40$, in qua $1x$ valet -4 , cum $1x \propto 80x - 6x + 40 \propto 0$ dividi queat per $1x + 4 \propto 0$, oriaturque æquatio impossibilis $1x - 4x + 10 \propto 0$, seu $1x \propto 4x - 10$, cujus valores radices nullo modo comprehendi possunt, nisi eos sic exprimere velimus: $1x \propto 2 + \sqrt{-6}$, & $1x \propto 2 - \sqrt{-6}$. Ad eò ut duo veri valores ipsius $1x$ sint tantum fictitii $2 + \sqrt{-6}$ & $2 - \sqrt{-6}$, & falsus realis sit $\propto -4$.

E quibus patet tertiæ hujus atque secundæ formulæ æquationum convenientia mutuaque radicum suarum reciprocatio.


Lubet autem in usum æquationis hujus tertiæ formulæ unum aut alterum Problema adducere, ut sequentia manifestiora fiant.

PROBLEMA.

Circulo dato FMGN, in eoque inscriptâ FG, trifariam secetur arcus uterque FMG & FNG in M & N: Oporteatque invenire FM subtensam trientis unius, & FN subtensam trientis alterius.

Estō FH seu HK $\propto a$, FG $\propto b$, & FM $\propto x$, quæratque ex HF & FM seu datis juxta modum paginæ 91 hujus Geometriz inscripta FG, perinde atque ipsa esset incognita: quæ ideo erit $3x - \frac{x^3}{a}$. Iam verò cum ipsa detur $\propto b$, erit $3x - \frac{x^3}{a} \propto b$. Vnde æqualitate ordinatâ, x^3 æquabitur $3ax - ab$.

Eodem



Eodem modo, si pro FN ponatur x , atque ex HF & FN quæramus FG, incidemus in eandem æquationem. E quibus sequitur utramlibet subtensam FM vel FN quæsitæ quantitati radicis æqualem esse. Hinc cum $1 \textcircled{1}$ æquetur $13 \textcircled{2} - 12$, seu $1 \textcircled{1} 80 \textcircled{2} - 13 \textcircled{1} + 12$ æquetur 0, ac ipsa æquatio dividi possit per $1 \textcircled{2} - 1 \textcircled{1} 00$, & per $1 \textcircled{1}$

$- 3 \textcircled{0} 0$, nec non per $1 \textcircled{1} + 4 \textcircled{0} 0$: arguit id ipsum FM fore 1, at verò FN 3. Porro quoniam æquationes hujus tertiæ formulæ æquæ ac secundæ formulæ tres admittunt differentes valores radicis, quorum quidem duo simul sumpti tertio sunt æquales, ita & addendo duos veros 1 & 3, fiet falsus $- 4$, seu quantitas lineæ FL, quæ ipsis MF & FN simul sumptis ostensa est æqualis.

Vnde perspicua sunt ea, quæ ab Alberto Girardo in libello supra citato allata sunt ad æquationum radices hujus tertiæ formulæ invenendas. Vbi docet, illas ad secundum casum secundæ formulæ revocandas esse, convertendo tantum signum $-$ numeri absoluti in signum $+$: cum in iis sicut hic cubus trientis numeri radicem non minor requiratur quàm quadratum semissis numeri absoluti. Ac proinde inventis tribus valoribus radicis quæsitæ, sicut in secunda formula explicuimus, oportet tantum illos ex 0 auferre seu eorum signa immutare, ut habeantur tres quæsitæ hujus, in qua duo semper veri sunt seu $+$ quàm 0, & tertius est falsus seu $-$ quàm 0, quemadmodum est ostensum.

ALIUD PROBLEMA.

In circulo, cujus diameter AD, inscriptis tribus inæqualibus rectis lineis AB, BC, & CD, sibi invicem contiguis, quarum quidem extremæ prodeunt ex diametri terminis A & D: Oportet ex iisdem cognitis invenire diametrum AD.


Ponatur ad hoc $AB \propto a, BC \propto b, CD \propto c, \& AD \propto x$. jun-

Zz

gan-

ganturque A C, B D, & in B C, productam, si opus sit, perpendicularis demittatur D E.

Duplex autem hūc occurrit casus considerandus, juxta quem hæ inscriptæ diversimodè in circulo positæ intelligi possunt; primus, in quo rectæ A B & C D è diametri terminis prodeunt ad diversas partes; & secundus, in quo ipsæ ex iisdem terminis educæ sunt ad eandem partem, se mutuò interfecantes. In priori igitur positione si quadratum B D $\propto x x - a a$ subducatur ex ag-



¹ per 13
secundæ
Elem.

² per 21
tertiæ
Elem.


gregato quadratorum B C, C D $\propto b b + c c$, relinquetur ¹ duplum rectangulum B C E $\propto b b + c c - x x + a a$. Deinde, quoniam triangula A B D & C E D similia sunt, cum anguli ad B & E sint recti, & B A D, E C D æquales ², utpote eidem peripheriæ B D insistentes: crit ut D A $\propto x$ ad A B $\propto a$, ita D C $\propto c$ ad C E $\propto \frac{a c}{x}$. Hæc autem ducta in duplam B C $\propto 2 b$ dat duplum re-

ctangulum B C E $\propto \frac{2 a b c}{x}$, æquale $b b + c c - x x + a a$, duplo videlicet rectangulo B C E, ante invento. Vnde ordinatâ æquatione invenitur: $x^3 \propto + a a x - 2 a b c$, æquatio cubica tertiæ formæ $+ b b + c c$

mulæ, in qua quadratum semissis ultimi termini est minus cubo quantitatis cognitæ penultimi termini, ut constat ex præmissis Problemate paginæ 354.

³ per 12
secundæ
Elem.

In secunda autem positione, si à quadrato D C $\propto c c$ auferantur quadrata D B, B C $\propto x x - a a + b b$, relinquetur ³ duplum rectangulum C B E $\propto c c - x x + a a - b b$. Cæterum, quoniam
rursus



rursus propter similitudinem triangulorum ABD & CED , $AD \propto x$ est ad $AB \propto a$, sicut $DC \propto c$ ad CE : erit $CE \propto \frac{ac}{x}$. Equâ subductâ $CB \propto b$, remanebit $BE \propto \frac{ac}{x} - b$. Hæc autem si multiplicetur per duplam CB , proveniet dup-

plum rectangulum $CBE \propto \frac{2abc}{x} - 2bb$: æquale duplo rectangulo CBE ante invento $\propto cc - xx + aa - bb$. Vnde addito utrinque bb , ordinatâque secundum artem æquatione, obtinebitur eadem atque superior: $x^3 \propto \frac{+aa}{+bb}x - 2abc$.

Quocirca cum utroque casu in eandem incidamus æquationem, cujus radix diametrum referat AD , sequitur quoque eam differentem sortiri quantitatem, & ex eisdem datis inscriptis pro diversa earum positione dupliciter inveniri.

Vbi præterea notandum est, Problema propositum esse solidum, si tres inscriptæ $AB, BC, \& CD$ inæquales inter se fuerint: siquidem ad cubicam æquationem ascendit, quæ divisione ad quadratam reduci nequit. Quum verò duæ quælibet ex inscriptis æquales ponuntur, tunc quidem æquatio inventa reducetur ad quadratam, & Problema erit planum. Statuendo enim $b \& c$ æqualia, exsurgit æquatio talis: $x^3 - aa x + 2abb \propto 0$, quæ di-

vidi poterit per $x - a \propto 0$, & orietur æquatio quadrata $xx + ax - 2bb \propto 0$, quæ ulterius non est reducibilis.

Si autem juxta alterutram positionem omnes hæ tres inscriptæ æquales fiantur, ita ut inde deducatur æquatio $x^3 - 3aa x + 2a^3 \propto 0$, poterit hæc ipsa dividi per $x + 2a \propto 0$, orieturque æquatio $xx - 2ax + aa \propto 0$, quæ porro dividi poterit per $x - a \propto 0$, & orietur $x - a \propto 0$. Quoniam verò hoc casu inscriptæ cum diametro coincidere intelliguntur ac ipsi diametro esse æquales, constat æquationis radicem x , hoc est, diametrum AD duos in eo

Zz 2

admit-

admittere veros valores sibi invicem æquales, qui singuli per unamquamque ex illis inscriptis designantur; ac præterea falsum, alterutrius illius duplum.

Cæterùm si desideremus propositum Problema per numeros resolvere, esto $AB \propto a \propto 24$, $BC \propto b \propto 20$, $CD \propto c \propto 15$, & quæzatur $A D \propto x$. Hinc cum $aa + bb + cc$ sit 1201, & $2abc \propto 14400$, invenietur æquatio talis: $x^3 \propto 1201x - 14400$, seu $x^3 80xx - 1201x + 14400 \propto 0$. Quæ dividi potest per $x - 25 \propto 0$, oritur namque æquatio $xx + 25x - 576 \propto 0$, seu $xx \propto -25x + 576$. Cujus porro vera radix est $\sqrt{732\frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$, & falsa $-\sqrt{732\frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$. Ita ut diameter quæzita AD , hoc est, x radix prædictæ æquationis $x^3 \propto 1201x - 14400$, tres ferat differentes valores, duos scilicet veros seu $+$ quàm 0, nimirum $+25$ majorem, & $\sqrt{732\frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$ minorem, & unum falsum seu $-$ quàm 0, nimirum $-\sqrt{732\frac{1}{2}} - 12\frac{1}{2}$, qui veris istis simul sumptis est æqualis. Quocirca cum tres superioris æquationis $x^3 \propto 1201x + 14400$ radices inventæ sint -25 , $12\frac{1}{2} - \sqrt{732\frac{1}{2}}$, & $12\frac{1}{2} + \sqrt{732\frac{1}{2}}$, patet eas tantùm ex 0 esse auferendas, seu earum signa esse immutanda, ad habendas tres radices hujus posterioris æquationis.

Quòd si verò hæc ipsa æquatio $x^3 80xx - 1201x + 14400 \propto 0$ dividi non potuisset per quantitatem incognitam x + vel $-$ aliquo numero ultimum terminum 14400 dividente, argumentum fuisset quòd & nulla radicum tam vera quàm falsa ullo numero fuisset explicabilis, sed eam tunc designandam esse per rectam datum angulum vel arcum in tres æquales partes dividendem, vel alio denique modo, ut infra ostendetur.

Vt si in exemplum proponatur æquatio $x^3 \propto 2700x - 32400$, seu $x^3 80xx - 2700x + 32400 \propto 0$, quæ cum præcedenti modo dividi nequeat, poterit quoque valor radices x , sive is verus sive falsus fuerit, nullis numeris exprimi, nec per latera quorundam cuborum, quorum contentum cognoscitur, ut docent Cardani regulæ. Quippe illum ad has non revocare licet, cum ipsæ exigant ut cubus trientis numeri radicum à quadrato semissis numeri absoluti auferatur, qui quidem cubus hîc major datur. Ad eò ut radices ejus per rectas subtendentes trientem anguli vel arcus dati sint denotandæ, ut vult D. des Cartes, atque ut etiam Albertus Girardus innuit. Scilicet describendo circulum cujus radius

FH


FH seu HK fit 30 seu $\sqrt{\frac{1}{2}p}$, in eoque accommodando rectam FG $\propto 36$ seu $\frac{1}{2}p$, atque deinde trifariam secando utrumque arcum FMG & FNG per rectas FM & FN. Nam uti circulus, cujus radius 30 per inscriptam 36 in duos inæquales arcus dispescitur, ita quoque incognita quantitas x duplicem verum valorem sortitur; fitque alterutra è subtenfis FM vel FN, tam trientis FM minoris arcus FMG, quàm trientis FN majoris FNG: Falsus autem ejusdem valor æqualis est veris illis simul sumptis, atque per rectam FL designatur.

Quos binos radices valores cum Vieta aliâ porrò ratione explicare licet, ut sequitur.

Duo intelligantur triangula æquicrura, cruribus alterum alteri æqualia, quorum secundi angulus, qui est ad basin, sit triplus anguli, qui est ad basin primi, & basis secundi intelligatur esse 18 seu $\frac{1}{2}p$, crus verò 30 seu $\sqrt{\frac{1}{2}p}$. x autem de qua quæritur, esse basin

dimidiam primi, multatam continuatamve longitudine ejus rectæ, cujus quadratum est æquale triplo quadrato altitudinis primi.

Quod ut perspicuum fiat, fingantur triangula illa esse ABC & CDE, quorum (ut ante) crus quodlibet AB, BC, CD, vel DE sit $\propto a$, & basis secundi CE sit $\propto b$. Demissis autem in iis perpendicularibus BI, DK, sumatur BF æqualis duplæ BI: eritque FI recta, cujus quadratum est æquale triplo quadrato altitudinis primi.



Quibus ita positis, ut inveniatur AF, liquet, si pro ea ponamus y , & pro AC, ut ante, ponamus x , quadratum ex BI fore $\propto aa$ — $\frac{1}{2}xx$, adeoque quadratum ex FI $\propto 3aa - \frac{1}{2}xx$. Quoniam verò ex AI $\propto \frac{1}{2}x$ sublatâ AF $\propto y$, relinquitur FI $\propto \frac{1}{2}x - y$, cujus quadratum est $\frac{1}{4}xx - xy + yy$: erit $\frac{1}{4}xx - xy + yy \propto 3aa - \frac{1}{2}xx$.

Zz 3

Hoc

Hoc est, ordinatâ æquatione, habebitur $xx \propto yx + 3aa$. Vnde

— yy
 extractâ radice, fit $x \propto \frac{1}{3}y \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{3}yy}$. Hinc, si in æquatione olim inventa $x^3 \propto * + 3aax + aab$ in locum x substituatur valor inventus $\frac{1}{3}y \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{3}yy}$, & in locum x^3 ejus cubus, qui est $\frac{1}{27}aay - y^3 \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{3}yy}$, obtinebimus æquationem $y^3 \propto * + 3aay - aab$. Cujus ideo vera radix erit linea A F.

Eodem modo ad inveniendam F C, si pro ea ponamus z , atque ab ipsa tollamus I C $\propto \frac{1}{3}x$, remanebit F I $\propto z - \frac{1}{3}x$. Vnde cum quadratum ejus sit $z^2 - xz + \frac{1}{9}xx$: erit itidem $zz - xz + \frac{1}{9}xx \propto 3aa - \frac{1}{9}xx$. Hoc est, ordinatâ æquatione, habebitur $xx \propto zx + 3aa$. Et fit, extractâ radice $x \propto \frac{1}{3}z \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{3}zz}$.
 — zz

Hinc si rursus in æquatione olim inventa $x^3 \propto * + 3aax + aab$ in locum x subrogetur valor inventus $\frac{1}{3}z \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{3}zz}$, & in locum x^3 ejus cubus $\frac{1}{27}aaz - z^3 \sqrt[3]{3aa - \frac{1}{3}zz}$, obtinebimus æquationem $z^3 \propto * + 3aaz - aab$. Cujus ideo vera radix est linea F C.

Ex quibus colligitur, si æquatio proposita fuerit $x^3 \propto * + 3aax - aab$, eandem duas admittere veras radices, quarum minor A F obtinetur, si ex A I vel I C dimidia base primi trianguli A B C auferatur recta F I, cujus quadratum sit æquale triplo quadrato ejusdem altitudinis B I; & major, si ad A I vel I C ipsa F I addatur. Omnino ut fuit propositum.

Vbi porro advertendum, quòd, in eadem æquatione $x^3 \propto * + 3aax - aab$, ob mutuam radicum æquationis hujus tertix ac secundæ formulæ reciprocactionem, tertia radix sit falsa, quæ per A C, basin primi trianguli A B C, designatur, quæque ipsi veris A F, F C simul sumptis est æqualis. Et contra si æquatio fuerit $x^3 \propto * + 3aax + aab$, quòd præter veram, quæ per A C exhibetur, aliæ duæ extent falsæ, quarum minor est A F, & major F C, quæ similiter simul sumptæ ipsi veræ A C sunt æquales.

Denique quoniam omnes similes æquationes ad æquationem posterioris Problematis revocari queunt, poterimus quoque propositæ æquationis $x^3 \propto 2700x - 32400$ valores radicis x sic exprimere: Dicentes eos per diametrum circuli A D designari, in quo si inscribantur tres rectæ lineæ inæquales A B, B C, & C D, sibi

sibi invicem contiguæ, quarum extremæ prodeunt è diametri terminis A & D, solidum ex ipsis tribus sit $\infty 16800$ seu $\frac{1}{2}q$, & summa quadratorum earundem sit $\infty 2700$ seu p . Nam quemadmodum hæ tres inscriptæ cum diametro duobus modis girgillum reserunt, & utrâque positione diameter duplicem quantitatem sortitur, ita quoque ipsa in hac vel illa positione veram semper radicem designat. Falsa autem, ipsis veris adæquans, exhibetur per diametrum semicirculi, in quo descripto supra diametrum quadrilatero, tria hujus reliqua latera dictis inscriptis sumpta sint æqualia. Ut ex superioribus manifestum est.

Vbi advertendum insuper restat, æquationem numericam $1 \textcircled{1} \textcircled{2} 13 \textcircled{1} - 12$, à Girardo propositam, non requirere ut radices ejus hoc modo exprimantur: cum in illa $1 \textcircled{1}$ valeat -4 , $+1$, & $+3$, ac ipsa æquatio $1 \textcircled{1} 80 \textcircled{2} - 13 \textcircled{1} + 1200$ per $1 \textcircled{1} + 400$, & per $1 \textcircled{1} - 100$, nec non per $1 \textcircled{1} - 300$ dividi possit. Ita ut duntaxat radices earum æquationum tertiæ formulæ juxta aliquem præcedentium modorum opus sit exprimere, in quibus constat ipsas nec numero, nec Cardani regula explicari posse.

Vnde demum cum D. des Cartes concludere licet, valorem radicem quæ faciliè, immo quidem faciliùs concipi, cum ipse per subtenfas arcuum designatur, quorum triplum est datum, quam cum per latera certorum cuborum exprimitur, quorum non nisi contentum cognoscitur. Præterquam quod ad illas subtenfas non magis indigeamus aliquo charactere peculiari, quam $\sqrt[3]{C}$. ad exprimenda latera cubica, & $\sqrt[3]{C}$ ad quadrata. Adeo ut cubicarum æquationum valores radicum, qui nec numero nec per Cardani regulas exprimi queunt, allatis quidem modis clarè ac distinctè explicari possint.

Cæterum ne quid hîc desideretur, sed etiam appareat, quo pacto hæ Cardani regulæ fuerint inventæ, lubet hoc loco afferre eas, quæ circa hanc rem acutissimus noster Huddenius olim adinvenit, mihiq; coram communicavit.

Proponatur æquatio $z^3 \infty * - pz + q$, sit z quantitas, quam invenire oportet.

Ponatur ad hoc $z \infty x - y$. Eritque $z^3 \infty x^3 - 3xy + 3xy - y^3$. Vnde cum & z^3 æquetur $-pz + q$: erit similiter $-pz + q \infty x^3 - 3xy + 3xy - y^3$.

Divi-

Dividamus jam hanc æquationem in duas, nempe $-pz \infty -3xy + 3xyy, & q \infty x^3 - y^3$. Quarum prima divisa per $z \infty x - y$ dat $-p \infty -3xy$, seu $p \infty 3xy$; & fit $x \infty \frac{\frac{1}{3}p}{y}$. Vnde, si in secunda in locum x subrogetur valor inventus $\frac{\frac{1}{3}p}{y}$, & in locum x^3 hujus cubus $\frac{\frac{1}{27}p^3}{y^3}$, obtinebitur $q \infty \frac{\frac{1}{27}p^3}{y^3} - y^3$. Hoc est, multiplicando utrinque per y^3 , & ordinando æquationem, habebitur $y^6 \infty -qq^3 + \frac{1}{27}p^3$. Cujus radix, juxta pag. 6, est $y^3 \infty -\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}$. Et fit $y \infty \sqrt[3]{C. -\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$. Adeoque $x \infty \frac{\frac{1}{3}p}{y}$

$\infty \frac{\frac{1}{3}p}{\sqrt[3]{C. -\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}}$. Posueramus autem $z \infty x - y$. Erit itaque $z \infty \sqrt[3]{C. -\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}} - \sqrt[3]{C. -\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$.

Qui sanè valor eo Cardani simplicior censeri potest, siquidem ad hunc obtinendum radix cubica semel tantum est extrahenda. Quòd si verò ipsius z valor cum Cardano sit exhibendus, ita porro operari licebit. videlicet in æquatione jam dictâ $q \infty x^3 - y^3$ in locum y^3 substituendo valorem inventum $-\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}$: habebiturque $q \infty x^3 + \frac{1}{3}q - \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}$, seu $x^3 \infty +\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}$. Et fit $x \infty \sqrt[3]{C. +\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$. Hinc cum z sit $\infty x - y$: erit $z \infty \sqrt[3]{C. +\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}} - \sqrt[3]{C. -\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq + \frac{1}{27}p^3}}$.

Haud dissimili modo procedendum in æquatione $z^3 \infty * + pz + q$, ubi z valet $\sqrt[3]{C. +\frac{1}{3}q + \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}} + \sqrt[3]{C. +\frac{1}{3}q - \sqrt[3]{\frac{1}{4}qq - \frac{1}{27}p^3}}$. ponendo nempe $z \infty x + y$.

Notandum verò, in his æquationibus supponi $x +$ vel $-y$, non autem pluribus incognitis institui nequeunt; ut & $-pz$ supponi $\infty -3xy + 3xyy$, ex eo quòd tunc æquationem hanc dividere licet per $z \infty x - y$, atque sic deinde ipsarum x, y , & z valores in simplicissimis terminis invenire. Idem quoque aliter fieri potest, ad modum paginæ 296.

Hæc autem de Cubicarum Æquationum Resolutione dicta sufficiant.

A D-

ADDITAMENTVM.

Ceterum ut pateat, non facile Problema aliquod datum iri, quod hanc Geometriam effugiat, aut ejusdem Methodo solvi non possit, subjungam in ejus specimen solutionem artificiosissimam Problematis, quod habetur in libello ingeniosissimo, qui operâ Jacobi à Waessenaer Anno 1640 sub titulo: *Den ontfijssen VVis-konstenaer. I. I. S:ampiöenins*, in lucem prodiit. Verum enimverò quoniam ad ejus solutionem, ibi traditam, quædam admittuntur ut concessa, quæ demonstrare operæ pretium duxi, visum fuit ea sequenti Theoremate demonstrata exhibere.


THEOREMA.

Alicubi terrarum in Zonis frigidis, cum Sol non occidit, defixis ad plumbum supra planum horizontale tribus baculis in punctis A, B, & C, ita se habentibus, ut, postquam eodem die extremitas umbræ baculi A transire deprehensa fuerit per B & C, reperta item sit extremitas umbræ baculi B transiisse per C & A, nec non ejus qui in C per A: Demonstrandum est eandem transiisse pariter per B.

Quod ut fiat, sciendum primò est umbram baculi A descripsisse Ellipsin vel Circulum, transeuntem per puncta B & C, prout videlicet hæc observata ponantur in Sphæra obliqua vel parallela. Deinde junctis CA, AB, BC, productisque BA, AC donec ejus circumferentiæ occurrant in punctis E & F, ductâque per A rectâ D G ipsi BC parallelâ, & utrinque peripheriæ occurrente in punctis D & G: evidens est, quòd, postquam umbra baculi B finit in A, eodem puncto temporis umbra baculi A finierit quoque in E; ita ut BA ad AE, rationem, quæ est inter baculum B & baculum A, designet. Eodem modo, postquam umbra baculi C pertigit ad A, pertigit etiam umbra baculi A ad F; ita ut CA ad AF sit, sicut baculus C ad baculum A. Similiter, dum umbra ipsius B pervenit ad C, pervenit etiam umbra ipsius A ad D; ita ut BC sit ad AD, sicut baculus B ad baculum A. Quibus sic in-

A a a

tellè-



telleſtis, ut conſtet, umbram baculi C tranſiſſe item per B, oſtendendum eſt, cum umbra baculi A incidit in G, umbram ipſius C incidiſſe ſimiliter in B, hoc eſt, baculum C ad baculum A, vel C A ad A F eſſe, ſicut C B ad A G.

Quod ipſum igitur ut fiat manifeſtum, inveniendus nobis eſt valor lineæ A G. Quocirca ad hoc ductâ G H parallelâ A C, ſecante A B, B C in I & K, & Ellipſis vel Circuli circumferentiæ occurrente in H, ponatur $AB \propto a$, $BC \propto b$, $CA \propto c$, $AF \propto d$, $AE \propto e$, $HK \propto x$, & A G vel C K $\propto z$: eritque $KB \propto b - z$.

Deinde, ut innotſcat A D, quoniam baculus B eſt ad baculum A, ut B A ad A E; itemque B baculus ad A baculum, ut B C ad A D: erit ut B A ad A E, vel a ad e , ſic B C vel b ad A D. quæ ideo erit $\frac{be}{a}$. Cum autem hæc multiplicata per A G ſeu z producat

$\frac{be z}{a}$ rectangulum D A G, ſimiliterque A G vel C K ſeu z multiplicata per K B ſeu $b - z$ producat $bz - zz$ rectangulum C K B; & quidem, juxta 17 prop. 3^æ libri Conicorum Apollonii, $\frac{be z}{a}$ ad $bz - zz$ ſit, vel $\frac{be}{a}$ ad $b - z$, ſicut $\square F A C$ ad $\square G K H$ ſeu $c d$ ad

c d ad e x , vel d ad x : fiet, multiplicando medios tum extremos,
 $db - dz \propto \frac{be x}{a}$, vel $adb - adz \propto be x$.

Iam, ut habeatur KI , fiat, propter similitudinem triangulorum
 $B CA$ & $B KI$, ut $BC \propto bad$ $CA \propto c$, ita $BK \propto b - z$ ad KI
 $\propto \frac{cb - cz}{b}$. quæ ad HK seu x addita dat $HI \propto \frac{cb - cz + bx}{b}$; at
 verò ex KG vel CA seu c subducta relinquit $IG \propto \frac{c z}{b}$. ex qua-
 rum ductu unius in alteram invenitur $\square GIH \propto \frac{cbz - czx + cbxz}{bb}$.

Porro, ut obtineatur AI , fiat, propter similitudinem triangu-
 lorum AGI & $B CA$, ut $BC \propto b$ ad $BA \propto a$, ita $AG \propto z$ ad
 $AI \propto \frac{az}{b}$. quæ ad AE seu e addita dat $EI \propto \frac{az + eb}{b}$; at vero ex
 $AB \propto a$ subducta relinquit $IB \propto \frac{ab - az}{b}$. ex quarum mutua
 multiplicatione exurgit $\square EIB \propto \frac{abz + abe - aaz - abez}{bb}$. Iam
 cum, ut ante, per 17. 3^{ta} Con. Apoll., $\square FAC$ seu cd sit ad
 $\square GIH$ seu $\frac{cbz - czx + cbxz}{bb}$, sive ad $\frac{cbz - czx + bxz}{bb}$, sicut
 $\square EAB$ seu ea ad $\square EIB$ seu $\frac{abz + abe - aaz - abez}{bb}$, sive ea ad
 $\frac{abz + bbe - aaz - bez}{bb}$: fiet, multiplicando extremos tum me-

dios, omisso priùs communi denominatore bb , $abd z + bbed -$
 $adz z - bedz \propto cbz - czx + be x z$. Quoniam autem su-
 pra inventum fuit $adb - adz \propto be x$, hoc est, multiplicando u-
 trinque per z , $abd z - adz z \propto be x z$: obfnebitur, subducen-
 do unam æquationem ex altera, $bbed - bedz \propto cbz - czx z$,
 vel $bbd - bdz \propto cbz - cz z$. Hoc est, æqualitate ritè ordina-
 tâ, erit $z z \propto \frac{cb + db}{c}$ in $z - \frac{bb d}{c}$. Quæ æquatio juxta regulam

pag. 7 resoluta dat $z \propto b$, ut & $z \propto \frac{d b}{c}$. Cum verò horum duo-
 rum valorum ipsius z dantur $\frac{d b}{c}$ quæ sit AG respondeat, hic-
 que nos doceat c esse ad d , sicut b ad z : patet, CA ad $A F$ esse
 sicut $C B$ ad $A G$. Quod erat ostendendum.


Sequitur Problema, ejusque solutio.

A a a 2

PRO-

P R O B L E M A.

TEmpore verno erectis alicubi terrarum ad perpendicularum tribus baculis in plano Horizontali in punctis A, B, & C, quorum is qui in A sit 6 pedum, qui in B 18 pedum, & qui in C 8 pedum, existente lineâ A B 33 pedum: Contingit quodam die extremitatem umbræ baculi A transire per puncta B & C, baculi autem B per puncta A & C, & baculi C per punctum A, unde fit ut etiam per punctum B sit transitura. Quæritur jam quo terræ loco atque anni die hæc evenerint?




Solutio.

Vt hoc Problema solverem, primò consideravi, Solem, baculi cujusque umbrâ, eo die quo hæc observata sunt, descripsisse Ellipsin, Hyperbolam, aut Parabolam.

Deinde etiam facilè perspexi, umbram illam non Hyperbolam, nec Parabolam, sed Ellipsin descripsisse, eamque observationem, quæ prima recensetur, non matutino tempore, sed ante
me-

mediam noctem factam fuisse. Quibus brevitatis causâ suppositis ad Problemæ solutionem ita procedo.

Sit $P G Q C$ Ellipsis, quam descripsit umbra baculi A , ejusque maxima diameter sit $P Q$, repræsentans lineam meridianam: liquet, cum umbra baculi A pertigit ad Q , fuisse mediam noctem, & cum à Q per C transiens pervenit ad P fuisse meridiem, & denique à P per G decurrens usque in Q rursus ad mediam noctem fuisse perventum. Deinde, cum umbra baculi B incidit in A , tum quoque umbra baculi A incidit in E ; ita ut $A B$ sit ad $A E$, ut 3 ad 1. Porro, cum umbra baculi C pertigit ad A , pertigit etiam umbra baculi A ad F ; ita ut $C A$ ad $A F$ sit, ut 4 ad 3. Denique, cum umbra baculi B terminabatur in C , terminabatur quoque umbra baculi A in D ; ita ut $G A$ ad $A D$ sit, ut 9 ad 4. Quibus rationibus in Ellipsi sic explicatis, demittantur perpendiculares $B M, E N, C H, F L, G I, \& D K$.



Deinde, in secunda figura supponendo $P R Q$ esse Conum, in quo $P Q$ designet majorem prædictæ Ellipseos diametrum, $A R$ baculum A , $R S$ axem Coni, angulus $A S R$ altitudinem Poli, & angulus $R P Y$ distantiam inter æquatorem & locum Solis in Ecliptica: fiat in Ellipsi $P Q \propto q$, latus rectum $Q O \propto r$, $A Q \propto p$, $M Q \propto x$, $H Q \propto y$, & $K Q \propto z$: eritque $A M \propto p - x$, $A N \propto \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}x$, $N Q \propto \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}x$, $A H \propto p - y$, $A L \propto \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}y$, $L Q \propto \frac{1}{2}p - \frac{1}{2}y$, & $K A \propto z - p$; In Cono verò, $A R \propto c$, seu 6, $P Q \propto q$, $A V \propto q u$, $S V \propto f n q$: eritque $A S \propto q n - f n q$, & $P S \propto \frac{1}{2}q - f n q$.

His positis, quæro primùm rationem, quam inter se habent MQ, HQ, & KQ, ut &, BM, HC, & DK: & invenio BM + HC æquari 3 DK: cum BC & AD parallelæ existentes inter se sint, sicut baculus B ad baculum A, hoc est, ut 3 ad 1: ac proinde BM + HC ∝ 3 DK. E quibus porro invenitur PA ad AQ esse, ut $\frac{1}{2}q - \frac{7q}{16\sqrt{3}}$ ad $\frac{1}{2}q + \frac{7q}{16\sqrt{3}}$, hoc est, ut $\sqrt{3} - \frac{7}{4}$ ad $\sqrt{3} + \frac{7}{4}$.

Deinde beneficio AM & AB quæro perpendicularem BM, quæ etiam in aliis terminis inveniri potest. unde innotescit latus rectum r , quod postea quoque aliter beneficio Coni invenitur.

Ex duplicibus terminis quantitati r æqualibus quæro f , tum q , ac postea etiam u .

Cognitis autem f , q , & u , quæritur ratio AS ad AR, ostendens Polielevationem.

Denique investigatur ratio, quæ est inter TX & TR, hoc est, inter PY & YR, & inde innotescit distantia inter Æquatorem & locum Solis in Ecliptica.

Primò igitur MQ sic investigatur: Vt PQ seu q ad QO seu r , ita quadratum MQ seu xx ad $\frac{rxx}{q}$, quod subductum ab rx , relictangulo MQO, relinquit $rx - \frac{rxx}{q}$, pro quadrato ex BM, adeoque $\sqrt{rx - \frac{rxx}{q}}$ pro BM. Rursus, ut q ad r , ita quadratum NQ $\frac{16}{9}pp - \frac{1}{3}px + \frac{1}{3}xx$ ad $\frac{\frac{16}{9}ppr - \frac{1}{3}prx + \frac{1}{3}rxx}{q}$. quod si subtrahatur à $\frac{1}{3}pr - \frac{1}{3}rx$, relictangulo NQO, & ex reliquo extrahatur radix quadrata, fiet $\sqrt{\frac{1}{3}pr - \frac{1}{3}rx - \frac{16ppr + 8prx - rxx}{9q}}$.

E pro NE, ∝ $\sqrt{\frac{rx}{9} - \frac{rxx}{9q}}$, tertiæ videlicet parti ipsius BM. Quæ æquatio si reducatur, invenietur $x \propto \frac{4pp - 3pq}{2p - q}$, pro MQ.

Deinde, ad inveniendam HQ, investigetur priùs eodem modo HC, $\sqrt{ry - \frac{r^2y}{4}}$. Tum fiat, ut CA ad AF, seu 4 ad 3, ita $\sqrt{rx - \frac{r^2y}{4}}$ ad $\sqrt{\frac{2}{16}ry - \frac{9r^2y}{16q}}$, seu LF. Porro, ut q ad r , ita quadratum LQ $\frac{49pp}{16} - \frac{21py}{8} + \frac{9y^2}{16}$ ad $\frac{49ppr}{16q} - \frac{21pry}{8q} + \frac{9r^2y}{16q}$.
Quod

$GI \propto \sqrt{\frac{81rx}{16} - \frac{81rx^2}{16q}}$, ante inventz. Quæ æquatio si reducatur, habebitur $z \propto \frac{13pp-4pq}{18p-9q}$.

Atque ita inventz sunt

$$MQ \text{ seu } x \propto \frac{4pp-3pq}{2p-q}$$

$$HQ \text{ seu } y \propto \frac{7pp-4pq}{6p-3q}$$


$$KQ \text{ seu } z \propto \frac{13pp-4pq}{18p-9q}$$

Ad inveniendas jam BM, HC, & DK, quoniam ante inventa est BM $\sqrt{rx - \frac{rx^2}{q}}$, loco x substituatur $\frac{4pp-3pq}{2p-q}$, & $16p^4 - 24p^3q + 9ppq^2$ loco xx , fietque BM $\frac{4pp-4pq+qq}{\sqrt{-16p^4r+32p^3qr-19ppqqr+3pq^2r}}$.

Eodem modo, quoniam HC inventa est $\sqrt{ry - \frac{ry^2}{q}}$, loco y scribatur $\frac{7pp-4pq}{6p-3q}$, & $49p^4 - 56p^3q + 16ppq^2$ loco yy , eritque HC $\sqrt{\frac{-49p^4r+98p^3qr-61ppqqr+12pq^2r}{36ppq-36pq^2+9q^3}}$.

Similiter, quoniam DK inventa est $\sqrt{rz - \frac{rz^2}{q}}$, loco z ponatur $\frac{13pp-4pq}{18p-9q}$, & $169p^4 - 104p^3q + 16ppq^2$ loco zz , fietque DK $\sqrt{\frac{-169p^4r+338p^3qr-205ppqqr+36pq^2r}{324ppq-324bqq+81q^3}}$.

Quibus inventis, facile est invenire rationem ipsius PA ad AQ. Cum enim 3 DK æquetur BM + HC, ut supra dictum est: hinc inventos terminos ad eandem denominationem reduco, utpote ipsius HC, multiplicando tam numeratorem, quam denominatorem ipsius BM per $\sqrt{9}$, & denominatorem ipsius DK dividendo per 3, fietque omisso communi denominatore, pro BM $\sqrt{-144p^4r+288p^3qr-171ppqqr+27pq^2r}$,
pro



pro H C $\sqrt{-49p^2r + 98p^3qr - 61ppqq + 12pq^2r}$, &
 pro tripla D K $\sqrt{-169p^2r + 338p^3qr - 205ppqq + 36p^2q^2r}$.
 Qui singuli si per pr dividantur, fiet pro B M

$\sqrt{-144p^2 + 288ppq - 171pqq + 27q^3}$, pro H C
 $\sqrt{-49p^2 + 98ppq - 61pqq + 12q^3}$, & pro tripla D K
 $\sqrt{-169p^2 + 338ppq - 205pqq + 36q^3}$; & hi rursus di-
 visi per $-p + q$, dant pro B M $\sqrt{-144pp + 144pq - 27qq}$,
 pro H C $\sqrt{-49pp + 49pq - 12qq}$, & pro tripla D K
 $\sqrt{-169pp + 169pq - 36qq}$. Vbi porro, si supponatur
 $-p + q \propto n$, habebitur $\sqrt{+144pn - 27qq}$ pro B M, .
 $\sqrt{+49pn - 12qq}$ pro H C, & $\sqrt{+169pn - 36qq}$ pro
 tripla D K, adeoque $\sqrt{144pn - 27qq} + \sqrt{49pn - 12qq}$
 $\propto \sqrt{169pn - 36qq}$. Quæ æquatio reducta dabit $ppnn \propto +$
 $\frac{315qq}{768}pn - \frac{141q^2}{3072}$. Et fit $pn \propto \frac{1}{4}qq$, nec non $pn \propto \frac{141}{768}qq$.

Vbi sciendum, accipiendam esse tantum radicem $pn \propto \frac{141}{768}qq$:
 cum reliqua radix $pn \propto \frac{1}{4}qq$, restituendo valorem ipsius n , pro-
 ducat hanc æquationem $pp \propto qp - \frac{1}{4}qq$, cujus radix est $p \propto \frac{1}{4}q$;
 ostendens baculum A in medio ipsius P Q fuisse constructum.

Bbb

Quod

Quod sanè fieri non potest, quandoquidem umbræ baculi A utrinque non sunt æquales. Hinc, cum $p n$, hoc est, $\frac{143}{768} q q$,

sit $\infty - p p + p q$, seu $p p \infty q p - \frac{143}{768} q q$, cujus radix est $p \infty \frac{1}{2} q -$

H $\frac{7 q}{16 \sqrt{3}}$, nec non $p \infty \frac{1}{2} q + \frac{7 q}{16 \sqrt{3}}$; fiet pro P A $\frac{1}{2} q - \frac{7 q}{16 \sqrt{3}}$, & $\frac{1}{2} q +$

I $\frac{7 q}{16 \sqrt{3}}$ pro A Q. Vnde porro innotescit P A esse ad A Q, sicut $\sqrt{3} - \frac{1}{2}$ ad $\sqrt{3} + \frac{1}{2}$.

*Quo pacto
cognosca-
tur pri-
mam ob-
servatio-
nem ma-
tutino
tempore
non fuisse
factam.*

Iam si in Ellipsi primam observationem matutino tempore ponamus factam esse, & P Q, ut ante, lineam meridianam designare, atque baculi A umbram, motum Solis insequentem, à P per F transisse usque ad Q (quo tempore Sol humillimus existens mediam noctem efficit): erit B ex eadem parte sumendum qua punctum C, non autem qua punctum F. Quo posito, si per modum præcedentem quærat æquatio, fiet $p p n n \infty \frac{67 q q}{160} p n - \frac{143 q^2}{3200}$: in qua numerus absolutus major est quadrato semissis numeri radicum. Vnde, cum nulla sit linea, quæ Equationis hujus radix esse possit: liquet, primam observationem matutino tempore non contigisse, sed ante mediam noctem. Sicut initio fuit suppositum.

*Quæ ra-
tione inno-
tescat um-
bram non
descripsisse
Hyperbo-
lam, aut
Parabo-
lam. Quo-
modo in-
veniantur
latus re-
ctum per
Ellipsin.*

Deinde, si ponatur, umbram baculi A descripsisse Hyperbolam, inveniatur æquatio $p p n n \infty - \frac{335 q q}{768} p n - \frac{143 q^2}{3072}$. Quæ cum nullam admittat radicem, quæ proposito convenire possit, indicio est, umbram non descripsisse Hyperbolam. Eodem modo ostenditur ipsam non descripsisse Parabolam.

Postea ad inveniendum r , latus rectum Ellipseos, quærat A M, ut sequitur. Quoniam subducendo M Q ex A Q, hoc est, $\frac{4 p p - 3 p q}{2 p - q}$ ex p , relinquitur $\frac{-2 p p + 2 p q}{2 p - q}$, pro A M: hinc si loco p substituat $\frac{1}{2} q + \frac{7 q}{16 \sqrt{3}}$, ante inventum, & $\frac{1}{2} q q +$


$\frac{7 q q}{16 \sqrt{3}} + \frac{49 q q}{768}$ loco $p p$; fiet $\frac{143 q}{112 \sqrt{3}}$ pro A M. Porro, posito baculo A $\infty 6 \infty c$, erit A B $\infty 33 \infty \frac{11 c}{2}$ (est enim ut 6 ad 33, seu 2 ad 11, sic c ad $\frac{11 c}{2}$). à cujus quadrato $\frac{121 c c}{4}$ si auferatur

$\frac{143,143,99}{112,112,3}$, quadratum ex A M; relinquetur $\frac{121cc}{4} - \frac{143,143,99}{112,112,3}$,
 pro quadrato ex B M. Subducta autem A M $\frac{143q}{112\sqrt{3}}$ ex A Q
 $\frac{1}{2}q + \frac{7q}{16\sqrt{3}}$, remanet $\frac{1}{2}q - \frac{47q}{56\sqrt{3}}$ pro M Q seu x. Iam cum
 quadratum ex B M, primò inventum, sit $rx - \frac{rxx}{q}$, subrogato
 $\frac{1}{2}q - \frac{47q}{56\sqrt{3}}$ in locum x, & $\frac{1}{2}qq - \frac{47qq}{56\sqrt{3}} + \frac{47,47,99}{56,56,3}$ in locum xx; R
 habebitur $\frac{143q}{56,56,3}$, pro quadrato ex B M. Ac proinde, cum paulò
 ante pro quadrato ex B M inventum quoque sit $\frac{121cc}{4} - \frac{143,143,99}{112,112,3}$,
 erit $\frac{143q}{56,56,3} \propto \frac{121cc}{4} - \frac{143,143,99}{112,112,3}$. Quæ æquatio si reducatur,
 proveniet $\propto \frac{11,14,56,3cc}{13q} - \frac{143q}{4}$.

Præterea, ad investigandum latus rectum r in aliis terminis *Quamodo*
 addatur quadratum ex A S, $qqvv - 2fvvqq + ffvvqq$, ad *latus re-*
 quadratum ex A R, cc; & habebitur $cc + qqvv - 2fvvqq$ *ctum in-*
 $+ ffvvqq$, pro quadrato ex R S: adeoque *veniat*
 $\sqrt{cc + qqvv - 2fvvqq + ffvvqq}$, pro R S. quæ brevitatís *per Co-*
 causâ nominetur n. Deinde, quoniam, propter similitudinem *mentis*
 triangulorum A R S, T S V, & P Y S, R S seu n est ad A R seu c,
 sicut S V seu fvq ad T V, & P S seu $\frac{1}{2}q - fvq$ ad P Y; invenitur

$\frac{fvqc}{n}$ pro T V, & $\frac{\frac{1}{2}qc - fvqc}{n}$, pro P Y, quæ additæ efficiunt
 $\frac{\frac{1}{2}qc}{n}$, pro T X. Rursus, quia, propter eandem triangulorum si- *L*
 militudinem, R S, seu n, est ad A S seu $qv - fvq$, sicut S V
 seu fvq ad S T, & P S seu $\frac{1}{2}q - fvq$ ad S Y; fiet pro S T
 $\frac{qqvv - ffvvqq}{n}$, & $\frac{\frac{1}{2}qqv - fvvqq - \frac{1}{2}fvqq + ffvvqq}{n}$, pro

S Y. quæ ab R S $\frac{cc + qqvv - 2fvvqq + ffvvqq}{n}$ subducta, re-
 linquit $\frac{cc + qqvv - fvqq + \frac{1}{2}fvqq - \frac{1}{2}qqv}{n}$ pro R Y. Ad-
 ditis autem R S & S T, habebitur $\frac{cc + qqvv - fvqq}{n}$ pro R T.



Iam cum, ob quatuor lineas proportionales $RT, RY, TX,$ & PY , RT multiplicata per PY tantundem producat atque RY per TX : proveniet $\frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}qqvv - \frac{1}{2}fvvqq - ccfv - fqqv + ffv^1qq \propto \frac{1}{2}cc + \frac{1}{2}qqvv - \frac{1}{2}fvvqq + \frac{1}{2}fvqq^1 - \frac{1}{2}qqv$, adeoque $cc \propto fv vqq - qqvv + \frac{1}{2}qq$. Porro subducto quadrato ex TV à quadrato ex TX vel TZ , relinquetur $\frac{1}{2}qqcc - ffvvqqcc$ pro quadrato ex ZV , $\propto \frac{1}{2}qr$. Vnde sic invenitur. Restituatur valor ipsius nn , & fit

$\frac{1}{2}ccqq - ffvvqqcc \propto \frac{1}{2}qr$, vel $ccq - ccr - cc + qqvv - 2fvvqq + ffvvqq \propto \frac{1}{2}qr$, vel $ccq - ccr - 4ffvvqqcc \propto qqvv - 2fvvqq + ffvvqq$: itemque loco cc valor ejus jam modò inventus, & habebitur, qq utrobique exemptis, $fvvq - 4fv^1q - vvq + 4fv^1q - \frac{1}{2}q + \frac{1}{2}r + ffvvq - fv vq + \frac{1}{2}q - \frac{1}{2}r \propto -fvvr + ffvvv$. Quibus demum per multiplicationis, si quantitates in r ductæ ad unam partem transferantur, obtinebitur, utramque partem per $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}ffvv + fv$ dividendo, $r \propto q - 4fvvq$.

Quod rati-
one, ex
duplici
termino-
rum gene-
re ipsius
 r , inve-
niatur f .

Postquam igitur inventa est $r \propto \frac{11, 14, 56, 2, cc}{139} - \frac{143q}{4}$, nec non $r \propto q - 4fvvq$, erit $\frac{11, 14, 56, 2, cc}{139} - \frac{143q}{4} \propto q - 4fvvq$.

4fvvq.

4f v v q. Ex qua æquatione quero f, hoc modo: pro $\frac{11, 14, 56, 3}{13}$

scribatur breuitatis causâ d, eritque $\frac{d c c}{q} - \frac{143 q}{4} \infty q - 4 f v v q$.

Rurſus pro $\frac{143}{4}$ ſcribatur b, & erit $\frac{d c c}{q} - b q \infty q - 4 f v v q$, hoc

eſt, ſubrogato f v v q q - q q v v + $\frac{1}{2} q q$ - $\frac{1}{2} q q$ in locum c c, habe-

bitur d f v v q - d v v q + $\frac{1}{2} d q$ - $\frac{1}{2} d q$ - b q ∞ q - 4 f v v q. Vn-

de, diuidendo utrinque per q, & multiplicando per f, inuenietur,

quantitatibus in f f ductis ad unam partem tranſlatis, d v v f f +

4 v v f f ∞ f + b f + $\frac{1}{2} d f$ + d v v f - $\frac{1}{2} d$: adeoque ſi reſtituantur

valores quantitatum d & b, atque in locum v ſubſtituatur $\frac{7}{16 \sqrt{3}}$,

$\frac{317569}{2496} f f \infty \frac{137543}{208} f - \frac{6468}{13}$, vel $f f \infty \frac{33684}{6481} f - \frac{25344}{6481}$, M

cujus æquationis radix eſt f $\infty \frac{16842 - \sqrt{119398500}}{6481}$ ſeu N

$\frac{16842 - 390 \sqrt{785}}{6481}$.

Deinde, ex iſſdem terminis quero q, ut ſequitur. Reſumptâ

æquatione $\frac{25872 c c}{13 q} - \frac{143 q}{4} \infty q - 4 f v v q$, loco c c repona-

tur valor ejus datuſ 36, & ubique multiplicetur per q, fietque

$\frac{25872, 36}{13} - \frac{143 q q}{4} \infty q q - 4 f v v q q$, vel $\frac{25872, 36}{13} \infty q q +$

$\frac{143 q q}{4} - 4 f v v q q$, adeoque q q $\infty \frac{1}{1 + \frac{143}{4}} - 4 f v v$. Quoniam,

autem inventa eſt f & v, hinc in locum $\frac{1}{1 + \frac{143}{4}} - 4 f v v$ ſubſtituatur

$\frac{-4, 7, 7, 16842 + 4, 7, 7, 390 \sqrt{785}}{16, 16, 3, 6481}$,

ſeu $\frac{-196, 16842 + 76440 \sqrt{785}}{768, 6481}$.

$$\text{seu } \sqrt{\frac{49, 11, 48, 32, 6481}{16, 48}}, \text{ hoc est } \sqrt{\frac{49, 11, 32, 6481}{16}},$$

$$\text{seu } \infty \sqrt{49, 22, 6481}.$$

Iam, ut inveniatur ratio A Sad AR, quoniam $1 - f$ multiplicata per qv producit $qv - fvg$, atque f est $\frac{16842 - 390 \sqrt{785}}{6481}$: ideo, si $1 - f \infty \frac{390 \sqrt{785} - 10361}{6481}$ *pro ra-
tio A Sad
AR.*

multiplicetur per $qv \infty \sqrt{49, 22, 6481}$, exsurget $qv - fvg \infty$
 $\sqrt{\frac{49, 22, 6481 \text{ in } 390 \sqrt{785} - 10361}{6481}}$, pro A S; seu A S ∞
 $\sqrt{\frac{7 \sqrt{22, 6481 \text{ in } 13, 30 \sqrt{785} - 13, 797}}{\sqrt{6481, 6481}}}$, hoc est,

$$\frac{7, 13, \sqrt{22 \text{ in } 30 \sqrt{785} - 797}}{\sqrt{6481}}; \& AR \infty 13 \text{ in } \sqrt{11749 + 5 \sqrt{785}}.$$

Quibus per 13 divisis, erit A S $\infty \frac{7 \sqrt{22 \text{ in } 30 \sqrt{785} - 797}}{\sqrt{6481}}$,

& AR $\infty \sqrt{11749 + 5 \sqrt{785}}$, aut, si ponatur A S $\infty 7 \sqrt{22}$, erit
 AR $\frac{\sqrt{6481 \text{ in } \sqrt{11749 + 5 \sqrt{785}}}}{30 \sqrt{785} - 797}$; multiplicatoque hujus tum

numeratore tum denominatore per denominatoris residuum,
 proveniet AR $\infty \frac{\sqrt{6481 \text{ in } \sqrt{11749 + 5 \sqrt{785}} \text{ in } 797 + 30 \sqrt{785}}}{11, 6481, \text{ vel } 11, \sqrt{6481}, \sqrt{6481}}$,

$$\text{hoc est, AR } \infty \frac{\sqrt{11749 + 5 \sqrt{785}} \text{ in } 797 + 30 \sqrt{785}}{11 \sqrt{6481}},$$

$$\text{seu } \sqrt{\frac{15951432541 + 568545725 \sqrt{785}}{121, 6481}}, \text{ seu}$$

$\sqrt{20341 + 725 \sqrt{705}}$. Ac proinde si A S $\infty 7 \sqrt{22}$ sumatur
 pro radio, erit AR $\infty \sqrt{20341 + 725 \sqrt{785}}$, tangens anguli
 A SR siue elevationis Poli, videlicet 80 grad. 45 min. circiter.

Denique ad investigandam rationem TX ad TR, vel PY ad
 YR; cum TX supra inventa sit $\frac{169}{n}$, & TR $\infty \frac{169 - fvg}{n}$;

hinc

hinc ut inveniatur ratio horum terminorum, (quoniam supposita

AR seu $c \propto 1, q q$ est $\frac{11, 48, 32, 6481}{169 \text{ in } 11749 + 5 \sqrt{785}}$, vel, numeratore

atque denominatore per $11749 - 5 \sqrt{785}$ multiplicato,

$q q \propto \frac{11, 48, 32, 6481 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}{169, 138019376}$, seu

$\frac{48, 2, 176, 6481 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}{169, 121, 176, 6481}$ hoc est, $\frac{48, 2 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}{169, 121}$,

& $q \propto \sqrt{\frac{48, 2 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}{169, 121}}$, & vv est $\frac{49}{1256, 1}$, adeoque $q q v v$

$\propto \frac{48, 2, 49 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}{169, 121, 256, 3}$, seu $\frac{96, 49 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}{169, 121, 96, 8}$, hoc est,

$\frac{49 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}{169, 121, 8}$) neglecto communi denominatore n , mul-

tiplicetur $1 - f$ per $q q v v$, & fit $q q v v - f v v q q \propto$

$\frac{390 \sqrt{785} - 10361 \text{ in } 49 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}{6481}$, seu

$\frac{-6317, 11, 6481 + 49, 5, 11, 6481 \sqrt{785}}{13, 11, 11, 8, 6481}$, hoc est, $\frac{-6317 + 49, 5 \sqrt{785}}{13, 11, 8}$.

Cui si addatur $c c \propto 1$, fiet $c c + q q v v - f v v q q \propto$

$\frac{-5371 + 49, 5 \sqrt{785}}{13, 11, 8}$, pro TR. Eodem modo multiplicato

$q \propto \frac{\sqrt{48, 2 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}}{169, 121}$, per $\frac{1}{2} c$, seu $\frac{1}{2}$ (quandoquidem c est 1):

habebitur $\frac{1}{2} c q \propto \frac{\sqrt{24 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}}{169, 121}$, pro TX. Inventz igitur

TX & TR si reducantur ad eandem denominationem, ac

deinde denominator communis omittatur, obtinebitur TX \propto

$\sqrt{04, 24 \text{ in } 11749 - 5 \sqrt{785}}$, & TR $\propto 49, 5 \sqrt{785} - 5373$, five

TX $\propto \sqrt{18046464 - 46301184000}$, & TR $\propto \sqrt{47119625 - 5373}$.

P Quorum si TX vel PY sumatur pro radio, erit TR vel YR tangens anguli TXR vel YPR, grad. 19, & 27 min. circiter, distantie loci Solis in Ecliptica ab Aequatore.

Cum autem in exposita hujus Problematis solutione nonnulla occurrant, quæ illustrationem aliquam requirere videntur, atque minüs

minùs exercitatis scrupulum injicere possent; placuit ea, quæ ad eorum explicationem Vir Clarissimus D. Erasmius Bartholinus, Casp. Fil. Medicinæ ac Mathematicum in Academia Hafniensi Professor Regius concinnavit, paucis hîc adjicere.

Ita ut GA ad AD sit, ut 9 ad 4.] Ostensum enim est A
Theoremate præcedenti CA esse ad AF, hoc est, baculum C ad
baculum A, sicut CB ad AG. Vnde cum baculus A ad baculum
B sit, sicut DA ad CB: erit quoque ex æqualitate in proportione
perturbata, ut C baculus ad B baculum, hoc est, ut 8 ad 18, seu 4
ad 9, ita DA ad AG; & convertendo GA ad AD, ut 9 ad 4.

AV ∞ qu, SV ∞ fuq.] Puta hîc unitatem subintelligi, B
quæ sit a; ita ut a seu 1 sit ad q, sicut n ad qn; & rursus a seu 1 ad
qu, sicut f ad fuq.

Ac proinde BM + HC ∞ 3 DK.] Nam cum, propter C
similitudinem triangulorum α BM & α CH, α B sit ad BM, sicut ^{Huc refer}
α C ad CH, & permutando α B ad α C, sicut BM ad CH, com- ^{fig. p. 171.}
ponendoque BC ad α C, sicut BM + CH ad CH: & propter
similia triângula C α H & D A K, α C ad CH, sicut AD ad DK,
permutandoque α C ad AD, sicut CH ad DK; erit ex æquo, ut
BC ad AD, sic BM + CH ad DK. Vnde cum B C ipsius AD
tripla sit, erit quoque BM + HC ipsius DK tripla.

Equibus porrò invenitur PA ad A Q esse, ut 1 q — 79 D
ad 1 q + 79, hoc est, ut $\sqrt{3} - \frac{7}{4}$ ad $\sqrt{3} + \frac{7}{4}$.] Quemadmo-
dum postea perspicuum fiet.

Tertiæ videlicet parti ipsius BM.] Nimirum, propter E
similitudinem triangulorum ABM & AEN, ubi AB est ad BM,
sicut AE ad EN, & permutando AB ad AE, sicut BM ad NE.
Vnde cum AB ad AE (ut supra) sit, sicut 3 ad 1: erit quoque
BM ipsius NE tripla.

Et hi rursus divisi per — p + q, &c.] Vbi notandum, si F
 $BM \sqrt{-144p^3 + 288ppq - 171pqq + 27q^3}$, HC
 $\sqrt{-49p^3 + 98ppq - 61pqq + 12q^3}$, & tripla DK
 $\sqrt{-169p^3 + 338ppq - 205pqq + 36q^3}$ dividantur per
— p + q, oriri pro BM $\sqrt{+144pp - 144pq + 27qq}$, pro
HC

$HC\sqrt{+49pp-49pq+12qq}$, & pro tripla DK

$\sqrt{+169pp-169pq+36qq}$; non autem

$\sqrt{-144pp+144pq-27qq}$ $\sqrt{-49pp+49pq-12qq}$,

& $\sqrt{-169pp+169pq-36qq}$, ut habet Auctor, Ratio autem cur ita signa immutaverit, est, quòd signa negata prævaleant signis affirmatis. quod sic ostendi potest.

Etenim cum $2p$ — major sit quàm — q — — — $2p$ major quàm q
& utrinque multiplicetur per $72q$ — — — — $72q$ utraque in se $2p$ — — — q

erit quoque $144pq$ — major quàm — $72qq$, & fiet $4pp$ major quàm qq :
unde si auferatur * $144pp$ — major quàm — $36qq$ adeoque mul-

tiplicando u-
relinquetur $144pq$ — $144pp$ major quàm $36qq$: trinquè per 36 — — — 36
adeoque addendo utrinque $144pp$ — — — — $144pp$ * erit $144pp$ major quàm $36qq$
erit quoque $144pq$ major quàm $144pp + 36qq$.

Ac proinde $144pq$ multò major quàm $144pp + 27qq$. Et sic de reliquis. Vbi notandum, si loco divisoris superioris — $p + q$ fumatur divisor $+p - q$, eosdem terminos inveniri, iisdemque signis affectos, quemadmodum ab Auctore sunt propositi.

G *Vbi porrò si supponatur — $p + q \infty n$, habebitur*

$\sqrt{+144pn-27qq}$ pro BM .] Etenim existente — $p + q \infty n$, si utrobique multiplicetur per $+144p$, fiet — $144pp + 144pq \infty + 144pn$: adeoque — $144pp + 144pq - 27qq \infty + 144pn - 27qq$, ac proinde

$\sqrt{-144pp+144pq-27qq} \infty \sqrt{+144pn-27qq}$.
Et sic de reliquis.

H *Fiet pro $P A \frac{7q}{16\sqrt{3}}$, & $\frac{7q}{16\sqrt{3}}$ pro AQ .]*

Vide
pag. 165
vel 284.

Quoniam enim æquatio $pp \infty qp - \frac{144}{768} qq$, duas admittit veras radices, quarum summa est q , referens quantitatem cognitam secundi termini qp , atque designans lineam PQ : fit, ut si una $\frac{1}{2}q + \frac{7q}{16\sqrt{3}}$ fumatur pro linea AQ , pro quâ supposita fuit p , altera $\frac{1}{2}q - \frac{7q}{16\sqrt{3}}$ fumenda sit pro linea PA .

I *Vnde porrò innotescit PA esse ad AQ , sicut $\sqrt{3} - \frac{1}{2}$ ad $\sqrt{3} + \frac{1}{2}$.]* Quod sic liquet,

AP

AP

AQ

$$\begin{array}{l} \text{Multiplicetur } \frac{\frac{1}{2}q - \frac{7q}{16\sqrt{3}}}{q - \frac{7q}{8\sqrt{3}}} \text{ ad } \frac{\frac{1}{2}q + \frac{7q}{16\sqrt{3}}}{q + \frac{7q}{8\sqrt{3}}} \\ \text{utrinque per 2, \& fit} \\ \text{tum rursus} \\ \text{per } \sqrt{3}, \& \text{ fit } q\sqrt{3} - \frac{7q}{8} \text{ ad } q\sqrt{3} + \frac{7q}{8}. \end{array}$$

Denique dividatur

$$\text{utrobique per } q, \text{ fietque } \sqrt{3} - \frac{7}{4} \text{ ad } \sqrt{3} + \frac{7}{4}.$$

Subrogato $\frac{1}{2}q - \frac{47q}{56\sqrt{3}}$ *in locum* x , $\& \frac{1}{2}qq - \frac{47qq}{56\sqrt{3}} +$ K
 $\frac{47 \cdot 47 \cdot qq}{56, 56, 3}$ *in locum* xx , *habebitur* $\frac{143qr}{56, 56, 3}$, *pro quadrato ex*
BM.] Id quod hoc pacto fieri potest.

$$\begin{array}{l} \text{Ex } rx \propto \frac{1}{2}qr - \frac{47qr}{56\sqrt{3}} \\ \text{subtrahatur } \frac{rx}{q} \propto \frac{1}{2}qr - \frac{47qr}{56\sqrt{3}} + \frac{47 \cdot 47 \cdot qr}{56, 56, 3} : \\ \& \text{ remanebit } rx - \frac{rx}{q} \propto \frac{1}{2}qr - \frac{47 \cdot 47 \cdot qr}{56, 56, 3} \text{ vel } \frac{142qr}{56, 56, 3}. \\ \text{Nimirum si reducatur } \frac{1}{2}qr \text{ ad denominatorem ipsius } \frac{47 \cdot 47 \cdot qr}{56, 56, 3}. \\ \text{utpote faciendo ut 4 ad 56, sic 1 ad 14, eritque } \frac{1}{2}qr \propto \frac{14qr}{56}. \\ \& \text{ deinde multiplicando tam numeratorem quàm denomina-} \\ \text{torem hujus fractionis per 56, 3, fiet } \frac{56, 3, 14qr}{56, 56, 3}, \text{ vel } \frac{2352qr}{56, 56, 3} : \\ \text{à quo subducto } \frac{47 \cdot 47 \cdot qr}{56, 56, 3} \text{ seu } \frac{2209qr}{56, 56, 3}, \text{ relinquetur } \frac{143qr}{56, 56, 3}. \end{array}$$

Quæ additæ efficiunt $\frac{\frac{1}{2}qc}{n}$, *pro TX.]* Est enim PY L
 qualis VX. Quod faciliè demonstrari potest. Cum enim Sol quoti-
 dianâ suâ conversione circa mundi axem rectos Conos efficiat:
 fit, ut PY, si producta concipiatur, donec ipsi R Occurrat, ab
 axe RT in puncto Y bifariam atque ad angulos rectos secetur,
 triangulumque efficiat, quod triangulo VXQ sit simile ac simi-
 liter positum. cujus latus PQ duplum existens lateris VQ trian-
 guli VXQ (propter punctum V, quod centrum refert Ellipsis,
 cujus transversa diameter est PQ, & ZV semissis secundæ dia-
 metri)

metri) facit ut etiam linea P Y producta ipsius V X dupla sit futura, adeoque P Y æqualis V X.

M *Atque in locum v substituitur* $\frac{7}{16\sqrt{3}}$.] Convincitur autem *v* esse $\frac{7}{16\sqrt{3}}$: est enim A Q supra inventa $\infty \frac{1}{2}q + \frac{7q}{16\sqrt{3}}$, & P A $\infty \frac{1}{2}q - \frac{7q}{16\sqrt{3}}$. Vnde cum P Q sit ∞q , & V punctum medium ipsius P Q, adeoque P V vel V Q $\infty \frac{1}{2}q$; erit A V $\infty \frac{7q}{16\sqrt{3}}$. Hinc cum A V supposita sit ∞vq , erit $vq \infty \frac{7q}{16\sqrt{3}}$, ac proinde $v \infty \frac{7}{16\sqrt{3}}$.

N *Cujus æquationis radix f est* $\frac{16842 - \sqrt{119398500}}{6481}$, seu $\frac{16842 - 390\sqrt{785}}{6481}$.] Notandum hîc, æquationem $ff \infty \frac{33684}{6481}f - \frac{25344}{6481}$ aliam adhuc admittere radicem, nempe $f \infty \frac{16842 + 390\sqrt{785}}{6481}$, juxta ea, quæ habentur pag. 7.

Quam quidem radicem, cum major sit quàm $v \infty \frac{7}{16\sqrt{3}}$, cuius non nisi partem designare debet, Author meritò neglexit. Esse autem $\frac{16842 + 390\sqrt{785}}{6481}$ quàm $\frac{7}{16\sqrt{3}}$ majorem, patet, si reducantur ad eandem denominationem, utpote ponendo $\frac{16842, 7 + 390, 7\sqrt{785}}{6481, 16\sqrt{3}}$, & $\frac{6481, 7}{6481, 16\sqrt{3}}$.

O *Ac proinde si* $AS \infty 7\sqrt{22}$ *sumatur pro radio, erit* $AR \infty \sqrt{20341 + 725\sqrt{785}}$, *tangens anguli ASR sive elevationis Poli, videlicet 80 grad. 45 min. circiter.*] Est enim $7\sqrt{22}$ in rationalibus $\infty 32, 8'3''1''$, circiter, & $\sqrt{20341 + 725\sqrt{785}} \infty 201, 6'2''8''$, circiter. Vnde si fiat ut A S $32, 8'3''1''$ ad radium 100000, ita A R $201, 6'2''8''$ ad quantum 614105: erit 614105 tangens anguli A S R. proximè respondens tangenti grad. 80, & 45 min.

Qua-

Quarum si TX vel PT sumatur pro radio, erit TR^p vel YR tangens anguli TXR vel TPR, grad. 19, & 27 min. circiter, distantie loci Solis in Ecliptica ab Equatore.] Cum enim pro TX inventa sit

$\sqrt{18046464} - \sqrt{46301184000}$, quæ in rationalibus ferè est 4222, 7' 1" 1", & pro TR $\sqrt{47119625} - 5373$, quæ in rationalibus est 1491, 3' 7" 4" circiter: hinc, si fiat ut TX 4222, 7' 1" 1" ad radium 100000, ita TR 1491, 3' 7" 4" ad quartum 35318; erit 35318; tangens anguli TXR vel YPR, congruens quàm proximè tangenti grad. 19. & 27 min.

Et tantum de solutione Problematis, quod in specimen hujus Methodi afferreviſum fuit: quæ cum talis sit, ut ad Arithmeticæ quæſtiones enodandas, non minùs quàm ad Geometrix Problemata resolvenda atque construenda deferviat, non abs re fuerit, si Coronidis loco hîc subjiciam regulam quandam generalem, ex eadem Methodo depromptam, extrahendi radices quælibet ex quibuscunque Binomiis, radicem binomiam habentibus, quæ unà cum præcedenti solutione tunc temporis prodiit; præfertim cum illa à nemine (quod sciam) antea sit inventa, nec ab aliquo ea in re cuiquam satisfactum, cujus demonstrationem, qualis à me inventa est, breviter sum subjuncturus.

*Regula generalis extrahendi quælibet radices
ex quibuscunque Binomiis, radicem
binomiam habentibus.*

P R Œ P A R A T I O.

PRimo, si in dato Binomio reperiantur fractiones, oportet illas, multiplicando binomium per illarum denominatorem, eximere. Vt, exempli gratiâ, ad extrahendam $\sqrt{\odot}$ ex $\sqrt{242 + 12\frac{1}{2}}$, multiplico binomium per 2, & fit $\sqrt{968 + 25}$. Similiter si sit $\sqrt{\frac{242}{5} + \frac{125}{4}}$, primùm multiplico binomium per

Ccc 3

$\sqrt{5}$

$\sqrt{5}$, & fit $\sqrt{242 + \frac{1}{2}}$, deinde per 2, ut jam factum est, & sic de cæteris.

Deinde, si neutra pars binomii rationalis fuerit, reducendum est per multiplicationem aut divisionem ad aliud binomium, cujus altera pars sit rationalis. Id quod per multiplicationem alterius partis semper fieri potest; sed brevius plerumque per minoris numeri multiplicationem aut divisionem. Quemadmodum $\sqrt{242} + \sqrt{243}$ multiplicari quidem potest per $\sqrt{242}$, & fit $242 + \sqrt{58806}$; sed compendiosius per $\sqrt{2}$, & provenit $22 + \sqrt{486}$. Eodem modo $\sqrt{13993} + \sqrt{17578125}$ potest bis multiplicari per $\sqrt{13993}$, & producitur aliud binomium, cujus absolutus numerus est 3993; sed brevius per $\sqrt{19}$; & adhuc brevius, si dividatur per $\sqrt{13}$, fietque $11 + \sqrt{125}$.

Vbi notandum, postquam habetur binomium, cujus una pars est rationalis, tunc quoque quadratum alterius partis rationale esse debere; aut nullam ex eo radicem, nec etiam ex alio binomio, utramque partem irrationalem habente, à quo per multiplicationem aut divisionem deductum est, extrahi posse.

Tertiò, ad extrahendam $\sqrt{6}$, oportet primò radicem quadratam extrahere, & deinde ex hac $\sqrt{1}$. Et ad extrahendam $\sqrt{2}$ oportet bis extrahere $\sqrt{1}$. Et sic de reliquis radicibus, quæ per numeros compositos, hoc est, qui per alios dividi possunt, designantur. Radicem verò quadratam quod attinet, regula ad illam extrahendam satis nota est: quapropter hîc tantum opus est, ut doceam, quo pacto extrahendæ sint $\sqrt{1}$, $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, & similes aliæ, quæ per numeros primos, hoc est, qui per alios dividi nequeunt, denotantur.

Postremò ad extrahendam $\sqrt{1}$, $\sqrt{1}$, $\sqrt{2}$, aut similem, per numerum primum designatam, explorandum primò est, utrum radix Binomium esse possit, cujus una pars sit rationalis. Id quod innotescit subducendo quadrata partium à se invicem, & ex reliquo extrahendo radicem, nempe cubicam si ex dato binomio $\sqrt{1}$ sit extrahenda; aut surdesolidam, si $\sqrt{1}$ sit extrahenda, & sic de cæteris. Quod ita in posterum, ubi radix aliqua extrahi debet, intelligendum est, licet expressè non dicatur. Etenim si radix hæc numerus rationalis non fuerit, certò constat, radicem quæ sitam parte rationali carere. Sed cum binomium adhuc esse possit,

fit, cujus utraque pars sit irrationalis: hinc ad eam extrahendam datum binomium per differentiam quadratorum partium erit multiplicandum, si de radice cubica extrahenda quaestio fuerit; aut per quadratum hujus differentiae, si de $\sqrt{\textcircled{1}}$; aut per ejusdem cubum, si de $\sqrt{\textcircled{2}}$; aut per ipsius surdesolidum, si de $\sqrt{\textcircled{3}}$ quaeratur, atque ita de cæteris. Quâ ratione aliud semper binomium habebitur, in quo radix differentiae quadratorum partium erit differentia quadratorum partium prioris binomii. Vt ad extrahendam radicem cubicam ex $25 + \sqrt{968}$, subduco primum 625, quadratum ex 25, à 968, & remanent 343, cujus numeri radix cubica est 7, numerus nimirum rationalis. Id quod arguit, radicem, modò ex dato binomio extrahi possit, fore binomiam, cujus una pars futura sit rationalis. Similiter ad extrahendam $\sqrt{\textcircled{1}}$ ex $22 + \sqrt{486}$, oportet 484, quadratum à 22, subducere ex 486, & ex reliquo 2 elicere radicem cubicam. Quoniam verò id fieri non potest, constat radicem cubicam ex $22 + \sqrt{486}$ parte rationali carere: ac propterea $22 + \sqrt{486}$ per 2 multiplicandam esse, ut habeatur binomium $44 + \sqrt{1944}$, in quo radix differentiae quadratorum partium est 2. Sic ad extrahendam radicem sursolidam ex $11 + \sqrt{125}$, quoniam subductis 121 à 125, remanent 4, qui numerus surdesolidus non est: hinc $11 + \sqrt{125}$ multiplicari debet per 16, quadratum ex 4, ut proveniat $176 + \sqrt{32000}$. In quo radix sursolidam differentiae quadratorum partium est 4. Denique ad extrahendam $\sqrt{\textcircled{2}}$ ex $338 + \sqrt{114242}$, in quo differentia quadratorum partium est 2, quoniam hic numerus B-surdesolidus non est: ideo datum binomium multiplicari debet per 8, hoc est, per cubum ex 2, & fit $2704 + \sqrt{7311488}$, in quo $\sqrt{\textcircled{2}}$ differentiae quadratorum partium est 2.

R E G V L A.

Per præcedentem præparationem semper invenitur binomium, cujus una pars, & alterius partis quadratum, nec non radix differentiae quadratorum partium, sunt numeri rationales integri; ex quo $\sqrt{\textcircled{1}}$, aut $\sqrt{\textcircled{2}}$, aut $\sqrt{\textcircled{3}}$, &c. extrahi debet.

In quem finem inveniendus est numerus rationalis radice quaesita paulò major; ita ut differentia non major sit quàm $\frac{1}{2}$. Quod facillè per vulgarem Arithmeticam fieri potest.

Iam

Iam si pars rationalis dati binomii reliquâ parte major fuerit, oportet huic radici rationali addere radicem differentiarum quadratorum partium, divisam per eandem radicem rationalem: eritque semissis maximi integri numeri, in aggregato contenti, pars rationalis radicis quæsitæ. A cuius partis quadrato si auferatur radix differentiarum quadratorum partium, habebitur reliquæ partis quadratum; dummodo radix ex dato binomio extrahi possit. Id quod facillè per multiplicationem hujus inventæ radicis experiri licet, quæ datum binomium, si aliqua ex eo extrahi possit, producere debet.

Verùm, si dati binomii pars rationalis reliquâ parte minor fuerit, oportet à radice rationali, quam ex toto binomio extraximus, subducere radicem differentiarum quadratorum partium, divisam per eandem radicem rationalem: eritque media pars maximi integri numeri in reliquo contenti, pars rationalis, radicis quæsitæ. Ad cuius partis quadratum si addatur radix differentiarum quadratorum partium, habebitur quadratum reliquæ partis; modo radix fuerit binomium. Quod ex multiplicatione (ut supra) manifestum fiet.

Exempli causâ, ad extrahendam radicem cubicam ex $25 + \sqrt{968}$, cognito jam radicem cubicam differentiarum quadratorum partium esse 7, extraho radicem quadratam ex $\sqrt{968}$, quæ est major quàm 31, at minor quàm 32; deinde ad 25, numerum absolutum, addo 31 aut 32, & fit summa 56 aut 57. Ex qua radicem cubicam extraho, quæ quidem minor est quàm 4, at major quàm $3\frac{1}{2}$; ita ut 4 sit numerus quæsitus rationalis, verâ radice paulò major. Postea ex 4 subtraho $\frac{7}{2}$ (hoc est, 7, radicem cubicam differentiarum quadratorum partium, postquam per radicem inventam 4 est divisa), & remanent $2\frac{1}{2}$. Subtraho autem, quoniam numerus absolutus 25 minor est quàm $\sqrt{968}$; si enim esset major addenda fuisset. Maximus verò integer numerus in $2\frac{1}{2}$ contentus, est 2, cuius semissis est 1, pars rationalis, radicis. Cuius quadrato 1, addo 7, $\sqrt{1}$ nempe differentiarum quadratorum partium, & fit summa 8, quadratum alterius partis. Ita ut $1 + \sqrt{8}$ sit $\sqrt{1}$ ex $25 + \sqrt{968}$, nimirum si $\sqrt{1}$ ex eo extrahi possit. Quod ut cognoscatur, oportet per multiplicationem investigare cubum ex $1 + \sqrt{8}$; aut si brevitati consulamus, tantùm ejus partem rationalem: quod fit addendo 1, cubum partis rationalis radicis, ad triplum ejus-

eiusdem partis 1, multiplicatz per 8, quadratum alterius partis. Quod quia cum 25 parte rationali dati binomii convenit, constat, $1 + \sqrt{8}$ esse veram radicem: si verò non conveniret, radicem extrahi non posse, liquidò constaret.

Eodem modo ad extrahendam $\sqrt[3]{\textcircled{1}} \text{ ex } 44 + \sqrt{1944}$: radix cubica differentiz quadratorum partium est 2, & radix quadrata ex 1944 maior quàm 44, at minor quàm 45. Quam addo numero absoluto 44, & fit summa 88 aut 89, cuius $\sqrt[3]{\textcircled{1}}$ maior est quàm 4, & minor quàm $4\frac{1}{2}$. Quapropter subtractâ $\frac{1}{2}$, radice differentiz quadratorum partium, divisâ per radicem rationalem, ex $4\frac{1}{2}$, pro radice rationali assumptâ, remanent $4\frac{1}{4}$. Et fit 2, semissis ex 4, pars rationalis radicis. cuius quadrato 4, si addatur 2, radix differentiz, prodibit 6, quadratum reliquæ partis. Ut patet, addendo 8 ad ter 2, multiplicatum per 6, hoc est, 36; & fit summa 44, pars rationalis binomii dati: adeoque $2 + \sqrt{6}$ radix quæsitâ.

Ad extrahendam $\sqrt[3]{\textcircled{1}} \text{ ex } 176 + \sqrt{32000}$; radix sursolidâ differentiz quadratorum partium est 4; radix autem sursolidâ rationalis ex dato binomio est $3\frac{1}{2}$, unde subductis 4, divisus per $3\frac{1}{2}$, hoc est, $1\frac{1}{2}$, remanebunt $2 + \frac{1}{4}$. Semissis verò ex 2 est 1, cuius quadratum 1 additum ad 4 efficit 5, & fit $1 + \sqrt{5}$, radix sursolidâ quæsitâ ex $176 + \sqrt{32000}$; saltem si aliqua inveniri possit. Id quod totius binomii multiplicatione indagari potest, vel brevius, addendo simul, surdesolidum partis rationalis, radicis; decuplum cubum eiusdem, multiplicatum per quadratum alterius partis; & quintuplum partis rationalis, multiplicatum per quadrato-quadratum eiusdem alterius partis. Nimirum addendo 1, 50, & 125, unde exsurgunt 176. Quod cum parti rationali dati binomii sit æquale, sequitur $1 + \sqrt{5}$ propositi binomii esse veram radicem.

Ad extrahendam $\sqrt[3]{\textcircled{2}} \text{ ex } 2704 + \sqrt{7311488}$; radix B-sur-solidâ differentiz quadratorum partium est 2; radix autem B-sur-solidâ rationalis totius binomii est $3\frac{1}{2}$, cui addo $\frac{1}{2}$ (quoniam hic numerus absolutus maior est), & fit summa $4\frac{1}{4}$: ac proinde 2 radicis pars rationalis. A cuius quadrato 4 subtraho 2, radicem B-sur-solidâ differentiz quadratorum partium, & relinquetur alterius partis quadratum 2. Porro multiplico $2 + \sqrt{2}$ B-sur-solidè, vel brevius, in unam summam colligo; 128, B-sur-solidum ex 2;

D dd

1344.

1344, vices & semel sursolidum ex 2, multiplicatum per quadratum ex $\sqrt{2}$; 1120, trigies & quinquies cubum ex 2, multiplicatum per quadrato-quadratum ex $\sqrt{2}$; & 112, septies 2, multiplicatum per quadrato-cubum ex $\sqrt{2}$, & provenient 2704. Unde manifestum sit, $2 + \sqrt{2}$ esse radicem quæsitam.

Cæterum observandum hic est, postquam datum binomium per numerum aliquem multiplicatum aut divisum fuerit, atque ad aliud reductum, cujus radix jam sit inventa, quòd, ad prioris binomii radicem obtinendam, radicem inventam dividere aut multiplicare oporteat per radicem numeri, per quem binomium multiplicatum fuit aut divisum.

Sic quoniam ad extrahendam $\sqrt{\textcircled{1}}$ ex $\sqrt{242 + 12\frac{1}{2}}$, ipsum per 2 multiplicavimus, & deinde hujus posterioris binomii radicem invenimus esse $1 + \sqrt{8}$; dividendum erit $1 + \sqrt{8}$ per $\sqrt{\textcircled{1}}$ ex 2, & fiet $\sqrt{\textcircled{1}\frac{1}{2}} + \sqrt{\textcircled{6}}$ 128, radix cubica ex $\sqrt{242 + 12\frac{1}{2}}$.

Multiplicavimus $\sqrt{\frac{242}{5}} + \sqrt{\frac{12\frac{1}{2}}{4}}$ per $\sqrt{5}$, & invenimus $\sqrt{242 + 12\frac{1}{2}}$, cujus radix est $\sqrt{\textcircled{1}\frac{1}{2}} + \sqrt{\textcircled{6}}$ 128; quâ divisâ per $\sqrt{\textcircled{6}}$ 5, emerget $\sqrt{\textcircled{6}\frac{1}{30}} + \sqrt{\textcircled{6}\frac{128}{5}}$, pro radice ex $\sqrt{\frac{242}{5}} + \sqrt{\frac{12\frac{1}{2}}{4}}$.

Multiplicatum est $\sqrt{242 + 12\frac{1}{2}}$, primò per $\sqrt{2}$, & deinde per 2; unde fit ut inventa radix cubica $2 + \sqrt{6}$ dividenda sit per $\sqrt{2}$, & prodibit $\sqrt{2} + \sqrt{3}$, pro radice cubica quæsitâ ex $\sqrt{242 + 12\frac{1}{2}}$.

Divisimus $\sqrt{\textcircled{1}}$ 3993 + $\sqrt{\textcircled{6}}$ 17578125 per $\sqrt{\textcircled{1}}$ 3, & multiplicavimus per 16, ad extrahendam $\sqrt{\textcircled{1}}$: quare necesse est inventam radicem $1 + \sqrt{5}$ dividere per $\sqrt{\textcircled{1}}$ 16, & multiplicare per $\sqrt{\textcircled{10}}$ 3, ut habeatur vera radix sursolidâ ex dato binomio.

SEQUITUR DEMONSTRATIO.

IN primis est ostendendum, quòd, si binomium aliquod in se multiplicetur cubicè, proveniat semper aliud binomium, cujus partium quadrata, à se invicem subducta, relinquant cubum differentiz, quadratorum partium radices sive primi binomii. Id quod

quod manifestum fit, supponendo binomium illud designari per $a \sqrt[3]{bc}$, quod in se multiplicatum quadratè producit binomium $aa+bc \sqrt[3]{2a \sqrt[3]{bc}}$, & hoc rursus per $a \sqrt[3]{bc}$, producit binomium $a^3+3abc \sqrt[3]{3aa+bc \sqrt[3]{bc}}$; utpote cubum ex $a \sqrt[3]{bc}$.

Vbi notandum, quòd, licet in binomio plures reperiantur partes, tamen non nisi pro duabus sint habendæ, quarum una, utpote, a^3+3abc , designet numerum rationalem, ut verò $3aa+bc \sqrt[3]{bc}$, numerum irrationalem seu surdum. Deinde constat, partem rationalem a^3+3abc , compositam esse ex cubo partis rationalis radicis, & ex triplo solido, quod fit ex eadem hac parte in quadratum-reliquæ partis radicis: ac denique, si dictarum partium a^3+3abc & $3aa+bc \sqrt[3]{bc}$ quadrata $a^6+6a^4bc+9aabbcc$ & $b^6c^3+6aabbcc+9a^4bc$ à se invicem auferantur, relinqui $a^6=3a^4bc+3aabbcc-b^6c^3$, cubum ex $aa=bc$, differentia quadratorum partium radicis.

In numeris. Esto $a \propto 2, \sqrt[3]{bc} \propto \sqrt[3]{6}$. Hinc multiplicato binomio $2+\sqrt[3]{6}$ in se cubicè, fit binomium $44+\sqrt[3]{1944}$: in quo partium quadrata, 1936 & 1944, à se invicem subducta, relinquunt 8, cubum differentie quadratorum partium.

Deinde ostendendum, binomium multiplicatum per differentiam quadratorum partium producere semper aliud binomium, in quo differentia quadratorum partium sit numerus cubicus.

Quod patet si multiplicetur binomium $a \sqrt[3]{bc}$, per $aa=bc$, differentiam quadratorum partium. Exsurgit enim binomium $a^3=abc \sqrt[3]{a^4bc}=2aabbcc+b^6c^3$: cujus partium quadrata, $a^6=2a^4bc+aabbcc$ & $a^4bc=2aabbcc+b^6c^3$ à se invicem subducta, relinquunt $a^6=3a^4bc+3aabbcc-b^6c^3$, numerum cubicum, cujus radix cubica $aa=bc$, est, ut supra, differentia quadratorum partium prioris binomii $a \sqrt[3]{bc}$.

In numeris. Sit $a \propto 22$, & $\sqrt[3]{bc} \propto \sqrt[3]{486}$. Vnde multiplicato binomio $22+\sqrt[3]{486}$ per differentiam quadratorum partium 2, prodibit binomium $44+\sqrt[3]{1944}$. in quo differentia quadratorum partium est 8, utpote cubus differentie 2, quæ est inter 484 & 486, partium quadrata prioris binomii $22+\sqrt[3]{486}$.

Quibus expositis, ad extrahendam $\sqrt[3]{1}$ ex binomio $20+\sqrt[3]{392}$, in quo pars rationalis 20 est major reliquâ parte $\sqrt[3]{392}$:

D d d

cogi-

Signum
significat
differentiam inter
duas plu-
resve
quantita-
tes, cum
non expri-
mitur aut
cognosci-
tur, penes
quas sit
excessus.

cogitetur $a^3 + 3abc$ esse 20, & $3aa + bc\sqrt{bc}$ esse $\sqrt{392}$, ita ut
 $+a^3 + 3aa + 3abc + bc\sqrt{bc}$ designet datum binomium $20 + \sqrt{392}$, &
 radix ejus cubica $a + \sqrt{bc}$ ipsam radicem querendam, cujus ma-
 jor pars sit a , & minor \sqrt{bc} . Tum operare secundum regulam.

$$20 + \sqrt{392}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ \text{subt. } \left\{ \begin{array}{l} 400 \\ 392 \end{array} \right\} \text{ quadrata partium à se invicem.} \end{array}$$

$$\text{reliq. } 8,$$

2 radix cubica reliqui, sive $aa - bc$.

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 2 \end{array}$$

Adde ad 20, partem rationalem binomii

— 19, præter propter valorem partis irrationalis.

& fit 39, valor dati binomii in rationalibus, circiter. utpote à vero unitate non discedens, quippe qui inter 39 & 40 consistit. Vnde radix cubica fit major quam 3 & minor quam $3\frac{1}{2}$, ita ut $3\frac{1}{2}$ radicem veram non supra $\frac{1}{2}$ excedat. Sumatur autem quasi esset vera, & æqualis $a + \sqrt{bc}$.

Et divid. 2, hoc est, $aa - bc$,

per $3\frac{1}{2}$, hoc est, $a + \sqrt{bc}$:

& fit $\frac{2}{3}$, sive $a - \sqrt{bc}$.

add. $3\frac{1}{2}$, hoc est, $a + \sqrt{bc}$,

& fit summa $4\frac{1}{3}$, sive 2 a, duplum partis rationalis, radicia supponendo $3\frac{1}{2}$ esse veram radicem. Sed cum $3\frac{1}{2}$ sit major radice verâ; ita tamen, ut differentia non sit supra $\frac{1}{2}$, fit, ut $4\frac{1}{3}$ quoque duplo partis rationalis major existat, & differentia minor quam 1. sicut inferius ostensuri sumus. Vnde cum eadem pars sit numerus rationalis integer, sequitur duplum ejus fore 4, utpote maximum integrum numerum in $4\frac{1}{3}$ contentum, adeoque ipsam dictam partem fore 2. Quâ inventâ, facile est reliquam invenire. Etenim, si à 4, quadrato ejusdem partis, subducatur 2, radix cubica differentiarum quadratorum partium dati binomii, relinquetur 2, quadratum alterius partis: Ita ut radix inventa sit $2 + \sqrt{2}$.

Vbi notandum, operationem hanc sufficere ad investigandam radicem, cum constet illam binomium esse; sed quando id incertum fuerit, explorari poterit per multiplicationem inventi binomii in se cubice, aut etiam brevius per sequentem operationem.

Divid. 40, hoc est, $2a^3 + 6abc$

per 4, hoc est, $2a$.

& fit quotiens 10, sive $aa + 3bc$.

Cui addatur ter 2, seu 6, hoc est, $3aa - 3bc$.

& provenit 16, sive $4aa$: quod est quadratum superioris 4, nimirum duplum partis rationalis inventæ 2. Vnde radix binomia erit, & duplum ejusdem partis 4: adeoque $2 + \sqrt{2}$ radix quæsitæ.

Vel etiam hoc modo:

Ad 8, hoc est, a^3

add. 12, hoc est, $3abc$:

& provenit 20, sive $a^3 + 3abc$. quod cum sit pars rationalis dati binomii: sequitur $2 + \sqrt{2}$ esse radicem quæsitam.

Omnino ut supra fuit expositum.

Similiter, ad extrahendam $\sqrt[3]{44 + \sqrt{1944}}$, in quo pars rationalis 44 est minor reliquâ parte $\sqrt{1944}$; cogitetur (ut supra)

$+ 3abc$ esse 44, & $\frac{3aa}{+6c} \sqrt{bc}$ esse $\sqrt{1944}$, ita ut $\frac{a^3}{+3abc} + \frac{3aa}{+6c} \sqrt{bc}$ designet datum binomium $44 + \sqrt{1944}$, & illius radix cubica $a + \sqrt{bc}$ hujus radicem quærendam, cujus a sit minor pars, & \sqrt{bc} major. Tum operare secundum regulam.

$$44 + \sqrt{1944}$$

$$\text{subt. } \left\{ \begin{array}{l} 1944 \\ 1936 \end{array} \right\} \text{ quadrata partium à se invicem.}$$

$$\text{reliq. } \frac{8}{2}$$

2, radix cubica reliqui, sive $bc - aa$.

$\frac{3}{18} \frac{4}{4}$ Adde ad 44 partem rationalem binomii
 $\frac{4}{4} \frac{4}{4} - - 44$, præter propter valorem partis irrationalis:
 & fit 88, valor binomii dati in rationalibus, circiter.
 quippe qui à vero unitate non absit, cum inter 88 & 89 consistat.
 Radix autem ejus cubica est major quàm $4\frac{1}{2}$ & minor quàm $4\frac{2}{3}$;
 D d d 3 ita

ita ut $4\frac{1}{2}$ sit major radice verâ, excessu minore quàm $\frac{1}{2}$. Assumatur autem ut vera, & æqualis $a + \sqrt{bc}$.

Et divid. 2, hoc est, $bc - aa$,

per $4\frac{1}{2}$, hoc est, $\sqrt{bc + a}$:

& sit quotiens $\frac{1}{2}$, sive $\sqrt{bc - a}$.

subtr. $\left\{ \begin{array}{l} \text{ex } 4\frac{1}{2}, \text{ hoc est, } \sqrt{bc + a}, \\ \frac{1}{2}, \text{ hoc est, } \sqrt{bc - a}: \end{array} \right.$

& relinquitur $4\frac{1}{2}$, sive $2a$, duplum partis rationalis radice, videlicet supponendo $4\frac{1}{2}$ esse veram radicem. Sed cum major sit, fit ut etiam $4\frac{1}{2}$ excedat idem duplum, differentiâ minore quàm 1; sicut mox ostendemus. Vnde cum eadem pars sit numerus integer rationalis: sequitur duplum ejusdem partis fore 4, utpote maximum integrum numerum in $4 + \frac{1}{2}$ comprehensum: adeoque ipsam partem esse 2. Quâ inventâ, facile est reliquam partem invenire. Etenim si ad 4, quadratum dictæ partis, addatur 2, radix cubica differentię quadratorum partium binomii dati, fit summa 6, quadratum alterius partis: ita ut radix inventa sit $2 + \sqrt{6}$.

Vbi (ut supra) notandum, non opus esse ut ulteriùs operemur, postquam constat radicem extrahi posse, hoc est, ipsam binomium esse: quandoquidem eo casu radix inventa sit quæsitâ. Illud autem si ignoretur, dignosci poterit multiplicando radicem inventam in se cubicę, aut etiam brevius, hoc modo:

Divid. 88, hoc est, $2a^3 + 6abc$,

per 4, hoc est, $2a$:

& sit quotiens 22, sive $aa + 3bc$.

Subtr. ter 2, sive 6, hoc est, $3bc - 3aa$:

& relinquitur 16, sive $4aa$, quod est quadratum præcedentis 4. nimirum duplę partis rationalis inventę 2. Id quod monstrat, duplum ejusdem partis esse 4, adeoque radicem quæsitam binomium esse, videlicet $2 + \sqrt{6}$. quemadmodum modo inventa fuit.

Volentiam sic:

Ad 8, hoc est, a^3

add. 36, hoc est, $3abc$:


& provenit 44, sive $a^3 + 3abc$. quod cum sit pars rationalis dati binomii: sequitur $2 + \sqrt{6}$ esse radicem quæsitam.

Vt

Vt supra expositum fuit.

Quibus explicatis, demonstrandum nunc est, quod superius polliciti sumus.

In quem finem, pro radice cubica rationali inventa, veram, ut dictum est, superante, scribatur m ; at pro vera, quam in allatis exemplis per $a + \sqrt{bc}$ designavimus, brevitatis causâ scribatur v ; similiterque pro $a - \sqrt{bc}$, differentiâ quadratorum partium radicis, scribatur d . Hinc, cum d divisa per m dat $\frac{d}{m}$, quæ in primo exemplo ipsi m est addita, & in secundo exemplo ab m ablata; ostendendum est, differentiam, quâ $m + \frac{d}{m}$ excedit $v + \frac{d}{v}$, quod duplum partis rationalis, antea $2a$ nominatum, & quâ $m - \frac{d}{m}$ excedit $v - \frac{d}{v}$, quod similiter duplum partis rationalis, superius $2a$ nominatum, designat, unitate non esse majorem. Quod facile erit, si tantum ostendatur excessum ipsius $\frac{d}{v}$ supra $\frac{d}{m}$ minorem esse excessu ipsius m supra v . hoc modo:



Esto $AB \propto v$, supra quam describatur quadratum $ABCD$, quod majus erit quàm d , quippe quæ tantum differentiam designat, quæ est igitur quadrata partium ipsius v , cujus quadratum earundem partium quadratis unâ cum duplo sub partibus rectangulo est æquale. Hinc si supponatur rectangulum $ABEF \propto d$, erit $AF \propto \frac{d}{v}$.

Tum assumptâ $AG \propto m$, ita ut BG non superet $\frac{d}{v}$, factoque rectangulo $AGHI \propto d$, hoc est, æquali rectangulo $ABEF$: erit $AI \propto \frac{d}{m}$; nec non rectangulum $IKEF$ æquale rectangulo $KBGH$. Atque adeò cum IK sit major quàm KB , erit IF minor quam BG , hoc est, excessus ipsius $\frac{d}{v}$ supra $\frac{d}{m}$ minor erit excessu ipsius m supra v . Quod erat demonstrandum.

Eadem est ratio cum dati binomii partes per signum — disjunctun-

guntur. Si enim, exempli causâ, proponatur binomium $20 - \sqrt[3]{392}$. oportet tantum signum — transmutare in signum +, atque ut supra ex $20 + \sqrt[3]{392}$ radicem cubicam extrahere, quæ est $2 + \sqrt[3]{2}$, & sit $2 - \sqrt[3]{2}$ radix cubica ex $20 - \sqrt[3]{392}$. Quemadmodum liquet ex iis, quæ superius sunt ostensa. Et sic de aliis.

Cæterum, quæ hîc de radice cubica ostensa sunt, applicari quoque possunt ad ea, quæ ad reliquarum radicum extractionem sunt allata: cum eadem ubique sit demonstrandi ratio, idemque processus; ita ut plura hac de re afferre non sit opus. Tantum sciendum, modum, quo hæc regula inventa fuit, ad plures alias regulas, in Arithmetica hætenus incognitas, inveniendas inservire posse. Qui quidem in eo consistit, ut, dum in aliqua quæstione ignoratur ratio inveniendi verum numerum, quem integrum esse certò constiterit, quæratur numerus fractus unitate verum non superans: eritque maximus integer numerus, in eo contentus, is qui quæritur.

F I N I S.



Celeberrimo, Amicissimoque Viro,
D. FRANCISCO à SCHOOTEN
IOHANNES HVDDE
S. P. D.

Clarissime Vir,



T copiam Tibi faciam rogas, prolixam illam de Reductione Equationum epistolam, sive libellum mavis, ut & alteram illam, quæ meam de Maximis & Minimis Methodum continet, Commentariis tuis in D. Cartesii Geometriam annectendi edendique. Certè, cum id non modo postules, sed etiam serid, ut faciam, mihi author sis, in illam opinionem, sive imaginationem potius devenio, aliquid illis, tuo saltem iudicio, contineri, quod laboribus in lucem edendi respondere queat; quippe cum continuo dies noctesque cogitationes tuæ circa illa, quæ aliquo commodo humanum genus beare possint, versentur occupenturque, nec unquam, vel levissimo indicio, deprehendere potuerim, Te, secus ac Batarum deceat, aliud clausum in pectore premere, aliud verò linguâ promere, in animum inducere nequaquam potui. Te, eo tantum temporis articulo, quo has posceres, mihi que ut facerem author esses, à consuetâ tibi & regiâ viâ deflexisse. Præterea amicitie nostræ, nec hodie, nec heri natæ, vinculum, tuusque candor singularis, mihi satis superque, Te nequaquam hoc ab animo tuo impetraturum fuisse, testatum faciunt. Quare, si hac in re Tibi oblectarer, commissi erroris fortasse insimularer. Non pauca tamen obstant, quo minus assensum planè præbeam. Non enim Te latet, me multâ temporis egestate, quod tunc aliis studiis

Ecc

de-

destināram, hæc non ita ad normam exigere potuisse, quam illa quidem, quæ publico usui viritum legenda tendendaque permittuntur, quasi suo quodam jure postulant: cum non tantum benevolorum amicorum, sed etiam vitiligatorum, acerbiorumque inimicorum, quorum si non in præsens, in posterum fortasse copia suppetere possit, judicium subire debeant. At fortè inquires, quod non sub libelli, sed epistolarum, ad Te datarum, nomine, in lacem proditura sint, idque iis temporibus datarum, quibus aliis studiis animum applicassem, ideoque nullo merito accuratam illam diligentiam, summamque curam, omniumque probationes desiderari posse. Sed quid cause est, quin paulo diutius expectem, illaque, quibusdam præterea additis, sub libelli nomine, accuratius elaborata publici juris faciam? maxime cum libellum quendam, (quibusdam studiis ex voto ad finem perductis,) de Natura, Reductione, Determinatione, Resolutione, atque Inventione Aërationum prælo subicere proposuerim, (nisi fontica quædam causa denuo cursum meum remoretur,) cujus maximam jam partem, quod materiam spectat, si pauca quædam excipias, in numerato habeo, adeo ut non nisi in ordinem redigendi labor & quasi forma desideretur. Cum enim in animo habeam, illum ita accurare, ut à quolibet, qui modo ab ovo, quod dicitur, rem ipsam ordiri, & per numeros gradusque procedere, nec uno impetu montis verticem superare cupit, intelligi & in usum transferri possit; certè multò magis, procul omni dubio, utilitate suā, quam hæc epistola, quæ non nisi partem continent, eamque ita, ut dictum est, scriptam, se publico commendaret. Sed jam mihi responsum tuam audire videor: Quid obstat, Huddeni, quominus utriusque nos participes facias?

Nam bene conveniunt unaque in sede morantur.
Sed quid utilitatis imperfectior ille, & quasi abortivus
fœtus.

fœtus, tum allaturus est? Nullum equidem, fortasse, in-
 quies, ubi consummator se conspiciendum præbuerit, sed
 jam quidem quândiu ille intra penetralia Vestæ latet,
 cum experiëntiâ in omnibus pæne scientiis compertum sit,
 illos, qui earum amore tenentur, vel quibus res curæ &
 cordi est, eamque quàm penitissimè, & quàm maximè fieri
 potest, circumspicere rimari & penetrare cupiunt, raro
 quid amplius, quàm rudi Minervâ delineatam, aut ma-
 nuductionem ad eam requirant, vel nudam modo, omni-
 bus demonstrationibus, quasi supervacaneis ornamentis,
 neglectis, veritatem expetant: Ita namque partim ma-
 gis ad intimam rerum medullam ingenio suo penetrare
 illis datur, cum ex parte iis quoque investigandi labor
 incumbat: partim majore voluptate persunduntur, at-
 que adeo multo aptiores ad aliarum rerum veritatem in-
 apicum producendam evadunt. Cum etiam id experien-
 tia doceat, eos, nec ferè alterius generis homines, ali-
 quid, quod communem captum superet, & cornicum quasi
 oculos configat, elaboratum dare posse. Vnde illud con-
 fecti videtur, scientiarum amatoribus satis superque di-
 ctum, nec mihi fas licitumque esse, illud subducere aut
 invidere iis, quibus, si non aliis, aliquo modo satisfacere
 queat, quibus addere posses: alios, licet multis in locis,
 ejus, quod dicitur, veritatem demonstrationibus sulci-
 tam, & ad unguem elaboratam, (quod variis in locis,
 levi tantum brachio attigi,) non reperturi sint, nihilo-
 minus multas regulas ad usum, ejus respectu non paucæ
 ad amissum factæ sunt, transferre posse. Atque ita jam
 causam meam contra me ipsum egisse videor, ut vix muti-
 revel hiscere adversus ea, quæ dixi, mihi licitum videri
 possit, si in Lectores, quales esse decet, incidere mihi
 contingat: sed cum maxima hominum pars ad propen-
 deat, ut ante de re aliqua, quam illam clare & distinctè
 perceperit, judicium ferat, remque potius in deter o-

rem, quam meliorem partem interpretetur, atque eorum
 judicium sit periculi plenum, si circa res ver setur, quæ
 non exactè scriptæ, dilucidè explicatæ, demonstrationi-
 bus subnixæ sunt; eoque magis si illæ paucis verbis in-
 dicatæ fuerint, ipsaque res ita sit comparata, ut non nisi
 difficulter paucis verbis ita se comprehendi sinat, quin
 alicubi aliquid, quod dubiam, variamque interpreta-
 tionem suscipere possit, irrepat, seque immisceat: Cum-
 que multo maxima pars eorum quæ epistolis meis conti-
 nentur talia sint, demonstrationibusque destituta, ver-
 bisque paucis, uti jam dictum, indicatæ, cum Tibi hoc
 plusquam abundè sufficeret; Satis mihi vel hoc solum,
 causæ videtur, epistolarum editioni, nulla ex parte suf-
 fragari. Pone verò me majori felicitate quam cuiquam
 sperare fas sit, hac in parte uti, measque literas non nisi
 in genuinorum veritatis amatorum, qui nihil, exceptâ
 veritate, investigant, manus incidere, neque meos Le-
 ctiores tales esse, qui, ubi ad dubium verbum, quasi sco-
 pulum, offenderint, veritati consonâ significatione insu-
 per habitâ, eam magis quæ falsitatis aliquid secum tra-
 hit, veluti obtorto collo arripiunt, tanquam in sinu gau-
 dentes, & castellanos nescio quos triumphos ducentes,
 quasi verò jam repererint aliquid, quo suspectam autoris
 inventionem reddant, ejusque apud alios existimationem
 elevent, ut ipsi ed majores videantur, atque ita vel alte-
 rius nominis, se fieri possit, ruinâ gradum sibi ad glorio-
 lam, licet inanem, faciant: Pone inquam

Omnia jam fieri, fieri quæ posse negamus,
 Tamen adhuc plura obstant: nam, cum non tantum typo-
 graphicæ emendationis molestiam, satis sæpe tediosam,
 Te devoraturum, sed & illa, quæ vernaculâ linguâ à me
 scripta sunt, Latio Te donaturum, liberaliter, qui tuus
 est mos, obtuleris, videor mihi satis graviter in publica
 commoda peccaturus, nisi repulsam seras. Nonne enim
 tempus.

tempus illud, quod operæ illi impendere necesse habebis, nec id modicum, tum propter rite in Latinum sermonem convertendi, tum propter recte, ubi prælo subjecta fuerint, corrigendi molestiam, melioribus curis impendere, bonasque horas melius collocare posses? nisi enim me experientia docuisset, quid non possis, ubi penitus cogitationes tuas in rem aliquam defixeris, quamque multis in rebus, quarum ego sum conscius, optatum Tibi exitum consequutus fueris, facilius assensum præberem. Ne igitur impræsentiarum ægrè feras, quod is audire nolim, qui, cum tempori tuo non contemnendam partem suffuratus fuerit, meliora, quæ aliouin inuenires, publico invidisse videri possit. Atque adeo omnes hæ rationes eo me impellerent, ut, nisi à mea consuetudine aborreret, amicis aliquid denegare, jam sine omni dubio repulsam ferres. Quid ergo in re dubia consilii? Si edendi copiam faciam, haud leviter peccabo; sin id recusem, optimo meorum amicorum præter consuetudinem refragabor. sed in omnes partes mentem versando, tandem videor mihi Gordio huic nodo gladium reperisse, & rationem, quæ anceps malum effugere queam. Nimirum: nec assentior, nec repugno editioni epistolarum, sed totum hoc, quicquid est, Tibi plane trado & committo, ut id, quod optimum Tibi videbitur, probes & sequaris, ubi rationum mearum momenta non præoccupato, sed libero ac provido animo perpendeas, libaverisque. Vale, Vir Amicissime, & me, quod facis, amare perge.

Datum Amstelædami ipfis
Calendis Aprilis 1658.

IOHANNIS HVDDENII
EPISTOLA PRIMA
DE
REDVCTIONE
ÆQVATIONVM.

Clarissimo, Præstantissimoque Viro,

D. FRANCISCO SCHOTENIO

IOHANNES HVDDE

S. P. D.

D Oleo, Vir Amicissime, quodd dubia valetudine & negotiis impeditus amicæ petitioni tuæ, de iis latius deducendis, quæ de Reductione Equationum ad Amicum quempiam ante aliquot annos breviter perscripseram, hactenus satisfacere nequiverim. Impræsentiarum ergo aliquid temporis (quamvis parum eo abundem) decedam, ut promissa, si non in totum, ex parte saltem exsolvam, ne vel nimis longa te offendant mora, vel nomen malum apud te audiam, quamvis non videaris immeritò mihi crimen illud impingere posse, sed tamen velim memor sis Belgici adagii: Die noch wat betaalt, wil noch betalen, en is van de quaatste slagh niet.

Quod igitur ad *Reductionem Equationum* attinet, eam duobus modis considero, vel quatenus æquatio *absolutè* considerari potest, vel *relative* in quantum scilicet illam ad aliquod Problema, è quo originem duxit, referre licet.

Primò verò eam *absolutè* considerabo, omissa vulgari Reductione, quæ per additionem, subtractionem, multiplicationem, divisionem & extractionem procedit: ponamque tantùm Reductionum Regulas quasdam, quarum plurimas non ita pridem inveni, easque exemplis, ut mentem meam meliùs percipias, illustrabo, relictis earum demonstrationibus, tum quodd maxima earum pars sit perquàm inventu facilis, tum, quod rei caput

caput est, quoddam hominis foret otio suo abutentis, eas tibi (cui, quicquid in Mathesi inaccessum aliis videtur, perspectum est,) transmittere.

Et ut distinctius meos conceptus exprimam, primo restringam meas Regulas ad eas æquationes, in quibus una tantum incognita quantitas reperitur, quam semper nominabo x ; & in quibus Primus Terminus (Primum Terminum eum dico, in quo x plurimarum est dimensionum; Secundum, ubi x est unâ dimensione minor, & sic porro) non est multiplicatus aut divisus per aliquam cognitam quantitatem, atque semper affectus signo $+$: Quia non tantum hoc pacto omnes æquationes considerare consuevimus, sed etiam quia nullo, aut parvo admodum labore, ut cuilibet notum est, ad talem formam, si eam non habeant, redigi possunt.

SEQUENTES NOVEN REGVLÆ SE EXTENDVNT
AD OMNEM ÆQVATIONEM, SIVE IN EA
IRRATIONALES QVANTITATES ET FRA-
CTIONES, SIVE NVLLÆ INVENIANTVR.

I. REGVLA.

Si in æquatione literali una vel plures literæ seu quantitates cognitæ supponantur $\infty 0$, atque eo *ultimus Terminus non evanescat*, neque æquatio, quæ hinc resultat, reducibilis sit, certum est neque Propositam æquationem reducibilem fore; at verò si *ultimus Terminus evanescat*, atque etiam inde Resultans æquatio non existat reducibilis, æquatio Proposita ad pauciores dimensiones quàm ista resultans reduci non poterit.

Exem-

Exemplum, ubi ultimus Terminus non evanescit.

Sic in æquatione $x^3 - 3axx + 2bbx - 3a^3 \propto 0$, si suppo-

$$\begin{array}{r} -b \quad +ab \quad -b^3 \\ +4aa \quad -5aab \\ -4bba \end{array}$$

natur $a \propto 0$, resultabit, inde $x^3 - bxx + 2bbx - b^3 \propto 0$. Quia autem hæc æquatio reducibilis non est, certum est neque Propositam reducibilem fore.

Exemplum, ubi ultimus Terminus evanescit.

Si in æquatione $x^6 - 6abx^4 + 6c^3x^3 + 6a^3bxx - 12aac^3x + 12c^5d \propto 0$

$$\begin{array}{r} -3aa + ccd \quad -6abcc \quad -12abb^3c^3 \\ -bba \quad +6aab^3 \end{array}$$

supponantur d & $a \propto 0$, resultat inde $x^3 + 6c^3 \propto 0$. Quia verò hæc æquatio trium dimensionum reduci nequit, argumentum est neque Propositam ad pauciores dimensiones quàm ad tres, reducibilem fore.

Sic etiam supponendo d & $b \propto 0$, vel tantum $c \propto 0$, orientur hæc duæ æquationes

$$x^5 - 3aa x^3 + 6c^3xx - 12aac^3 \propto 0.$$

$$\begin{array}{l} x^5 - 6abx^3 - bba xx + 6a^3bx + 6aab^3 \propto 0. \\ -3aa \end{array}$$

Quæ si reduci non poterunt, denotabunt Propositam æquationem, ad pauciores dimensiones quàm ad 5, reduci non posse.

Dico, illam non ad pauciores dimensiones reducibilem fore, quippe aliquando contingere potest, ut Proposita æquatio ad eundem dimensionum numerum sit reducibilis. quemadmodum contingit in hac $x^4 - 4ax^3 + 4aaxx + 2b^3x - 4ab^3 \propto 0$, supponendo $a \propto 0$: exsurgit enim $x^3 + 2b^3 \propto 0$, quæ non potest reduci, & tamen æquatio Proposita est reducibilis per $x - 2a \propto 0$.

II. REGVLA.

Si in æquatione literali pro una, vel pluribus, vel omnibus literis seu quantitatibus cognitis, supponan-

Fff

tur

tur numeri, vel aliæ quantitates ad libitum, atque eo *ultimus Terminus non evanescat*, neque æquatio, sive numeralis, sive literalis, quæ hinc resultat, reducibilis sit, certum est, neque Propositam æquationem reducibilem fore; si verò *ultimus Terminus evanescat*, atque etiam inde Resultans æquatio non existat reducibilis, æquatio Proposita ad pauciores dimensiones, quàm ista Resultans, reduci non poterit.

Exempla, ubi ultimus Terminus non evanescit.

$$\begin{array}{r} 1. \text{ Si in hac æquatione } x^3 - 2axx + 3bbx - 3a^3 \infty 0 \text{ sup-} \\ \quad - b \quad + 3ab \quad - 3b^3 \\ \quad \quad \quad + 4aa \quad - 6aab \\ \quad \quad \quad \quad \quad + 9abb \end{array}$$

ponatur $a \infty 1$, & $b \infty 1$, resultabit inde æquatio numeralis $x^3 - 3xx + 10x - 1 \infty 0$. Quæ, quoniam non est reducibilis, indicabit, neque Propositam æquationem reducibilem esse.

$$\begin{array}{r} 2. \text{ Sic etiam, si habeamus hanc } x^5 - 4aabbx - 10a^3b \infty 0, \\ \quad \quad \quad - \frac{3a^3bb}{a-b} - \frac{3b^3aa}{a-b} \end{array}$$

atque supponamus $4aabb \infty \frac{3a^3bb}{a-b}$, seu $b \infty \frac{1}{4}a$, exsurget inde $x^5 - 2\frac{3}{4}a^4 \infty 0$. Quia verò hæc æquatio reduci non potest, certum est, neque Propositam reducibilem fore.

3. Non secus, si in æquatione $x^5 - 8a^3xx + 4ca^3x - 2a^3cd \infty 0$
 $\quad \quad \quad - 2aac \quad + acd$
 supponatur $-8a^3 - 2aac \infty 0$, seu $c \infty -4a$; ac $4ca^3 + ac^2cd \infty 0$,
 seu $d \infty -\frac{4aa}{c}$, fiet inde $x^5 + 8a^4 \infty 0$. Quoniam verò hæc æquatio non reducibilis existit, certum est, &c.

4. Eodem modo se res habet in æquationibus, ubi quantitates Irrationales reperiuntur: nam, exempli gratiâ, si detur hæc æquatio $x^5 + xx\sqrt{\frac{1}{4}aa+bb} + a^3b\sqrt{C.\frac{1}{4}a^3+\frac{1}{17}abb} \infty 0$, supponendo $\frac{1}{4}aa+bb \infty 0$, seu $bb \infty -\frac{1}{4}aa$, resultabit $x^5 + a^3b\sqrt{C.\frac{3}{17}a^3} \infty 0$. quæ, quoniam reduci non potest, certum est, &c.

Exem-

Exempla, ubi æquatio Resultans pauciores quàm Proposita dimensiones habet.

$$1. \text{ Si habeatur } x^4 + 4cx^3 + 4ccxx - 4bbcx + b^4 \propto 0, \text{ ac}$$

$$\quad \quad \quad -dd \quad \quad \quad -bbdd$$

$$\quad \quad \quad -2bb$$

supponatur $c \propto 1, b \propto 1, d \propto 1$, resultabit inde æquatio numerica $x^4 + 4xx + 1x - 4 \propto 0$. Quia verò hæc æquatio trium dimensionum non existit reducibilis, etiam æquatio Proposita ad pauciores dimensiones quàm ad tres reduci non poterit.

$$2. \text{ Si proponatur } x^3 - 4ab\sqrt{xx+aa-bb} + 3axx + 4bx - ab \propto 0,$$

$$\quad \quad \quad + bb\sqrt{3aa+bb}$$

& supponatur $aa-bb \propto 0$, seu $a \propto b$, resultabit $x^3 + 3axx + a^2 \propto 0$. quæ etiam non poterit reduci, ideoque indicabit Propositam æquationem ad pauciores quàm ad tres dimensiones reduci non posse.

Dico non ad pauciores dimensiones illam reducibilem fore, quippe aliquando contingere potest, ut Proposita æquatio ad eundem dimensionum numerum sit reducibilis. Quod etiam in 1^{ma} Regula locum habuit, ibique explicatum est. Sed si roges, quot ego dimensiones 2^{do} huic exemplo adscribam? respondeo, me tot dimensiones cuilibet æquationi adscribere, quot ejus incognita quantitas ad summum dimensiones habet, dempto omni signo radicali, quod illam incognitam quantitatem includit: ideoque illud 2^{do} exemplum habiturum 6 dimensiones, postquam signum radicale ante quantitatem incognitam, nempe $\sqrt{xx+aa-bb}$, ablatum fuerit.

NOTÆ duæ in hanc I & II Regulam.

I. Notandum est, utramque hanc Regulam non tantum magnum habere usum in inquirendo, utrum æquatio aliqua literalis reducibilis sit, verum etiam eodem modo inquirei posse:

1^{mo}. Num æquatio illa vel etiam quantitas quævis composita, per aliam æquationem vel quantitatem, quæ rationalis sit, dividi possit.

2^{do}. Num admittat radicem quadratam, cubicam, vel aliam.

FFF 2

3^{to}.

3^{to}. Num duæ vel plures æquationes, vel quantitates dictæ, admittant communem aliquem divisorem.

Nam, si non admittant *divisorem rationalem, vel radicem aliquam, vel communem divisorem*, illud plerumque, monstratam jam inveniundo viam, vel uno intuitu, vel saltem admodum faciliè, innotescet; præsertim in æquationibus vel quantitatibus valde compositis, atque ex multis diversis literis constantibus, quod sæpenumero incundo aliam viam valde difficile inventu esset, magnumque & laborem & industriam requireret. Hæc enim Methodus tantum exigit, ut æquationes, vel quantitates dictæ, determinentur (supponendo unam vel plures literas nihilo, vel unitati, vel numero, vel quantitati, ad libitum sumendis, æquales,) ad alias, quas aliunde scimus non admittere reductionem, vel rationalem divisorem, vel radicem aliquam, vel communem divisorem. Quod omne, exemplis explicare, supervacuum erit, quemadmodum etiam omnem ejus methodi usum enumerare, quem satis insignem esse jam patuit; ac vel eo nomine, quod ipsa nec fractiones, nec irrationales quantitates moretur, non raro magnum adfert compendium.

Denique, si æquationes, vel quantitates compositæ, admittant *reductionem, vel divisorem rationalem, vel aliquam radicem, vel communem divisorem*, possunt etiam illa omnia in multis casibus hæc Methodo satis compendiosè inveniri. sed hæc non sunt hujus loci, posthac fortassis aliquid de iis indicabo.

II. Quid velim per æquationem ex *Proposita Resultantem*, necessarium videtur, ut paulò clariùs exponam: maxime quia id etiam insequentibus Regulis, ubi litera aliqua ∞ o supponitur, usum suum habebit. Quando enim una pluresve literæ vel quantitates ∞ o sumuntur, liquet, omnes quantitates, ex multiplicatione harum per alias productas, etiam æquales nihilo fieri; ideoque in Proposita æquatione necessariò evanescere. quemadmodum in allatis exemplis quoque est videre. Adcò ut in æquationibus, quæ literales fractiones non includunt, pateat, quid per æquationem Resultantem intelligam. Sed si literales fractiones dantur, tunc quidem faciliè, nisi quis probe animum advertat, error committi posset. Etenim fractionis numeratore ∞ o existente, tollenda est ista fractio ex Proposita æquatione; at denominatorè ∞ o existente, oportet terminos omnes æquationis primùm per ejusmodi deno-

denominatores multiplicare. Quo peracto, erit æquatio hæc, in quâ scilicet nulla amplius reperitur fractio literalis, cujus denominator est $\infty 0$, & in qua conditiones omnes assumptæ, sive suppositiones, sunt adimpletæ, illa, quam ex Proposita resultare dico.

Exempla.

ÆQUATIONES PROPOSITÆ.

ÆQUATIONES RESULTANTES.

$$xx - \frac{c}{a}x + cc \infty 0. \text{ supponatur } c \infty 0$$

$$+ b - aa$$

$$- \frac{ccb}{a}$$

$$+ ab^2$$

$$a \infty 0$$

$$xx + bx - aa \infty 0$$

$$+ ab$$

$$- ccx - ccb \infty 0, \text{ seu } x + b \infty 0.$$

$$xx - cx + \frac{c^2}{2a} \infty 0.$$

$$c \infty 0$$

$$xx + ax \infty 0, \text{ seu } x + a \infty 0$$

$$+ a - \frac{1}{2}cc$$

$$+ \frac{ac}{a+b} - \frac{cca}{2a+2b}$$

$$a \infty 0$$

$$- \frac{ccx}{2} + \frac{c^2}{2} \infty 0, \text{ seu } x - c \infty 0.$$

$$- \frac{cc}{2a}$$

$$x^2 + \frac{2ac - ab}{3a - b}xx + \frac{ccb^2}{3aa - ab}x + \frac{b^3a}{a+b} \infty 0,$$

$$\text{suppositâ } 3a - b \infty 0:$$

$$\text{habebitur } 2ac - ab \text{ in } xx, + \frac{ccb^2}{a}x \infty 0, \text{ seu } + 2acx + \frac{ccb^2}{a} \infty 0.$$

$$- ab$$

Vnde, suppositione $3a \infty b$ adimplētâ, resultat

$$+ 2acx + 27aac \infty 0.$$

$$- 3aa$$

Nec tantum hoc observandum in æquationibus, sed etiam in quantitatibus compositis, quarum communis mensura, vel divisor, vel radix petitur. Ut, exempli gratiâ, si inquirere velis, num \sqrt{Q} extrahi possit ex $cc - 2cd + dd + \frac{b^2}{cc - 2cd + dd} + 2bb$, & in cum finem supposuisses $cc - 2cd + dd \infty 0$: retinendum esset b^2 , non autem $2bb$. Si enim $2bb$ retineres, concludendum foret,

Fff 3

meam

meam sequendo methodum, quod $\sqrt{Qexcc-2cd+dd+}$
 $\frac{cc-2cd+dd}{bb} + 2bb$ extrahi non posset, quæ tamen est
 $c-d + \frac{bb}{c-d}$.

SEQUENTES 3, 4, ET 5 REGVLÆ SE EXTENDVNT
 AD OMNES ÆQVATIONES, QVÆ EX MVLTIP-
 LICATIONE DVARVM ALIARVM PROD-
 VCI POSSVNT, IN QVARVM VNA ALIQA LI-
 TERA INCLVDITVR, QVÆ IN ALTERA NON
 CONTINETVR.

III. REGVLA,

*Quæ modum docet reducendi omnem æquationem, quæ
 produci potest ex multiplicatione duarum aliarum, qua-
 rum una literam aliquam comprehendit, quæ in altera
 non continetur; Et quæ litera non habet eundem dimen-
 sionum numerum in diversis Terminis.*

Suppono omnes Propositæ æquationis quantitates,
 in quibus eadem litera reperitur, quæque simul sic divi-
 di possunt, ut litera illa evanescat, $\infty 0$. Atque hoc in
 singulis literis instituo, verum uno tantummodo. Quippe
 id interdum variis modis fieri potest, quo casu illi præ
 cæteris eligendi veniunt, qui facillimas æquationes
 subministrant, vel quibus omnium brevissimè ad quæ-
 situm pervenire licet. Et, si Proposita æquatio ex dua-
 bus ejusmodi dictis æquationibus produci poterit,
 etiam per aliquam harum fictarum æquationum, in
 quibus dictæ literæ sunt sublata, divisibilis erit.

1^{um} genus exemplorum, in quibus Propositæ æqua-
 tiones nec numerales nec literales fractiones continent.

1. Proponatur hæc æquatio

$$\begin{aligned} x^4 - 6ax^3 + 4bcxx - 16abcx + 16bbca \infty 0. \\ + 4ac - 16aac + 48aab \\ + 16aa - 8aab + 32a^3c \\ + 4ab - 16a^3 \end{aligned}$$

Primò

Primò itaque periculum faciam in litera a , supponendo
 $-16a^3x + 32a^3c \infty 0$. Quæ sunt omnes quantitates per a^3 di-
 visibiles, quæ in Proposita æquatione inveniuntur, & in quibus
 factâ divisione litera a evanescit: oritur enim $-16x + 32c \infty 0$,
 seu, dividendo per -16 , $x - 2c \infty 0$.

Iam tento, num Proposita æquatio dividi queat per $x - 2c \infty 0$.
 Nam si per hanc dividi non possit, uti & si hæc $x - 2c \infty 0$ ab omni
 fractione non libera fuisse, (quod huic quidem primo exemplorum ge-
 neri est proprium) ad aliam literam transiissem. (Quamvis enim
 aliæ adhuc quantitates in æquatione reperiantur, in quibus a con-
 tinetur, quæque omnes per aliam quàm a^3 dividi possunt, sic ut li-
 tera a ubique evanescat, utpote supponendo

$$+16aaxx - 16aacx + 48aabc \infty 0, \text{ ut \&}$$

$$- 8aab$$

$$- 6ax^3 + 4acxx - 16abcx + 16bbca \infty 0;$$

$$+ 4ab$$

tamen id uno modo in hac Regula tentasse sufficit.) Hinc cum Pro-
 posita æquatio per $x - 2c \infty 0$ divisibilis non sit, transeo ad aliam
 literam, puta b . Quoniam autem hîc una tantum quantitas exi-
 stit, in qua bb reperitur, nempe $16bbca$, idcirco & hanc transeo,
 quandoquidem per $16bbca$ nullus valor ipsius x obtineri potest,
 & considero literam c , ponendo

$$4bcxx - 16abcx + 16bbca \infty 0. \text{ Hæc igitur cum absque}$$

$$4ac - 16aac + 48aabc$$

$$+ 32a^3c$$

fractione dividatur per $4bc + 4a^6$, ac oriatur $xx - 4ax + 4ab \infty 0$:
 $+ 8aa$

inquirendum ulteriùs restat, an Proposita æquatio dividi possit
 per $xx - 4ax + 4ab \infty 0$. inveniturque divisionem fieri posse.
 $+ 8aa$

Dixi in Regula, quòd sufficiat, rem singulis literis uno tantum modo
 tentasse, & quòd illi modi præ caterii eligendi veniant, qui facilissimas æ-
 quationes subministrant, vel quibus omnium brevissimè ad quasitum
 pervenire licet. Sic enim breviorẽ viam ingressus essem, si quanti-
 tates sumpsissem, in quibus a ubique unam tantum dimensionem
 habet. Nam quoniam tunc obtineo $-6ax^3 + 4acxx + 4abxx -$
 $16abcx + 16bbca \infty 0$, primo intuitu apparet, cum 4 per 6 dividi
 nequeat, quòd hæc quantitates non sine fractione dividi possint.

2. Eo-

416 IOHANNIS HVDDENII EPIST. I.

2. Eodem modo, ad reducendam hanc æquationem

$$\begin{array}{r} x^3 - 3cxx + abx - 2aab \infty 0 : \\ - 2a \quad + 6ac \quad + 3abb \\ + 3b \quad - 9bc \end{array}$$

quia quantitas $-2aab$ in eâ sola reperitur, in qua a duas habet dimensiones; & quantitas $+3abb$ sola, in qua b duas dimensiones habet: idcirco transeo ad literam c , obtineoque

$$-3cxx + 6acx \infty 0 \text{ seu } -3cx + 6ac \infty 0. \text{ Id quod divisum}$$

$$\text{per } -3c, \text{ dat } x - 2a \infty 0. \text{ Cujus ope Proposita æquatio dividi}$$

potest. Quod, si aliter evenisset, postquam jam periculum in omnibus factum esset literis, indicio fuisset, æquationem Propositam ex duabus ejusmodi aliis, quales supra determinavi, produci non posse.

3. Similiter examinaturus hanc æquationem

$$\begin{array}{r} x^3 + bxx + 2b\sqrt{ab+3bb}in x - 6bb\sqrt{ab+3bb} \infty 0, \\ - \sqrt{ab+3bb} \quad + 18b \end{array}$$

exordiens à litera a , invenio æquationem $-\sqrt{ab+3bb}in x, + 2b\sqrt{ab+3bb}in x, - 6bb\sqrt{ab+3bb} \infty 0$. Quam divido per $-\sqrt{ab+3bb}$, & evanescit a , obtineoque hanc $xx - 2bx + 6bb \infty 0$; per quam Proposita dividi potest. Quòd si verò hæc divisio non fieri potuisset, progrediendum fuisset ad literam b . Quia autem liquet per b , secundum singulas etiam suas dimensiones considerata, non posse aliquem ipsius x valorem inveniri: conclusissem, ut ante, æquationem Propositam ex duabus ejusmodi aliis, quales supra determinavi, produci non posse.

4. Nec aliter se res habet in hac æquatione

$$\begin{array}{r} x^3 - xx\sqrt{xx+aa} - 2cxx + 2cx\sqrt{xx+aa} - 6acx - a\sqrt{3cc+aa}in\sqrt{xx+aa} \infty 0. \\ + 2a \quad + ax\sqrt{xx+aa} - 3aax \quad + 3aa\sqrt{3cc+aa} \\ + ax\sqrt{3cc+aa} \end{array}$$

Nam primò video literam a negligi posse, quia sola $-3aax$ reperitur, nec ulla alia, quæ per a sic dividi possit, ut ipsa a prorsus evanescat. Transeo itaque ad literam c , supponendo

$$-2cxx + 2cx\sqrt{xx+aa} - 6acx \infty 0 \text{ seu } -2cx + 2c\sqrt{xx+aa} - 6ac \infty 0,$$

& fit, dividendo ubique per $-2c, x - \sqrt{xx+aa} + 3a \infty 0$. Cujus ope

ope Propositam æquationem dividere licet. Quæ si per hanc dividi non potuisset, quia jam res singulis literis tentata esset, conclusissem, ut prius, Propositam æquationem, &c.

2^{um} genus exemplorum, in quibus Proposita æquationes fractiones continent.

Inter hæc & præcedentia exempla, nulla alia differentia respectu operationis existit, quàm quòd Ficta æquatio, per quam divisio Propositæ tentatur, non necessariò, sicut ibi, ab omni fractione libera esse debeat. Quocirca unicùm exemplum in medium adduxisse suffecerit.

$$\begin{array}{r} \text{Proponatur æquatio } x^3 + \frac{1bb}{a+c}xx + \frac{bba}{a+c}x - \frac{1}{2}a^3 \propto 0. \\ \begin{array}{r} + 2b \\ + \frac{1}{2}aa \\ - cc \\ + ab \end{array} \quad \begin{array}{r} + \frac{1}{2}acc \\ + 2abb \\ - 2cbb \\ + 2aab \\ - 2bcc \end{array} \end{array}$$

Transcoliteram *a*, propter quantitatem $-\frac{1}{2}a^3$, quoniam *a* nusquam amplius 3 dimensionum reperitur. Hinc transiens ad *b*, invenio $2bxx + abx + 2aab - 2ccb \propto 0$, seu dividens ubique per $2b$, $xx + \frac{1}{2}ax + aa \propto 0$, per quam Proposita dividi po-

test. Quòd si verò hæc divisio fieri non potuisset, conclusissem; cum tantum per literam *c* adhuc explorandum foret, atque hæc ipsa *c* non magis quàm litera *a*, sicut ex quantitate $-2ccb$ manifestum est, ad rem quidquam faciat; æquationem Propositam ex duabus ejusmodi aliis, quales supra determinavi, produci non posse.

Ordo verò, quem in hac inquisitione, an nimirum Proposita æquatio per hujusmodi Fictas divisibilis sit, observo, talis est: Primùm inquiri, an nullæ aliæ quantitates, in quibus hæc ablata litera reperitur, in Proposita æquatione existant. Si enim plures reperiantur, tum ipsas omnes, quæ ita per illam dividi possunt, ut ea ubique evanescat, in unam summam colligo. (ut in hoc exemplo, quantitates omnes in quibus *b* duas dimensiones habet.) Quo peracto, si quotiens non idem sit cum præcedenti, per quod divisio examinatur, concludo, hanc divisionem fieri non posse.

Ggg

posse.

posse. Denique, si nullæ ampliùs in Proposita æquatione supersint quantitates, in quibus dicta litera reperitur, divido ultimò per illam Fictam æquationem omnes reliquas quantitates, in quibus litera illa non reperitur; quæque simul per dictam Fictam divisibiles sunt futuræ, si quidem Proposita æquatio per eam divisibilis existat.

$$Vt 2bxx + abx + 2aab - 2bcc \infty \text{div. per } +2b, \text{ fit } xx + \frac{1}{2}ax + aa \infty, \\ -cc$$

$$\text{itemq; } \frac{2bb}{a+c}xx + \frac{bba}{a+c}x + 2abb \infty \text{div. per } +\frac{2bb}{a+c}, \text{ fit } xx + \frac{1}{2}ax + aa \infty. \\ -2cbb \quad -cc$$

Si igitur hoc quotiens cum præcedenti non convenisset, etiam Proposita æquatio per $xx + \frac{1}{2}ax + aa \infty$ divisibilis non fuisset.

-cc

Quoniam autem conveniunt, & nullæ ampliùs quantitates in Proposita æquatione supersunt, in quibus litera *b* reperitur, inquiri tandem, num omnes reliquæ etiam per $xx + \frac{1}{2}ax + aa \infty$

-cc

dividi possint. Hinc cum reliquæ quantitates, in quibus *b* non reperitur, sint $x^3 + \frac{1}{2}aax - \frac{1}{2}a^3$, ipsæque per $xx + \frac{1}{2}ax + aa$

$$-cc + \frac{1}{2}acc$$

-cc

dividi queant, ac oriatur $x - \frac{1}{2}a$; idcirco & Proposita æquatio per $xx + \frac{1}{2}ax + aa \infty$ dividi poterit. Quæ aliàs, ut manife-

-cc

stum est, per illam non divisibilis fuisset, si ultima hæc divisio fieri non potuisset; Quotiens verò est $x - \frac{1}{2}a + \frac{2bb}{a+c} + 2b \infty$.

I V. R E G V L A,

Quæ modum docet reducendi omnem Æquationem, quæ produci potest ex multiplicatione duarum aliarum, quarum una literam aliquam comprehendit, quæ in altera non continetur; quæque litera in aliquo termino tot dimensiones habet, quot in nullo alio.

Suppono omnes Propositæ æquationis quantitates, in quibus eadem litera reperitur, quæque simul sic divi-

di

di possunt, ut illa *litera* evanescat, $\infty 0$. Atque hoc in *singulis literis* facio, verum *non uno duntaxat modo*, sicut in præcedenti 3^{ta} Regula, sed *modis omnibus, quibus id fieri potest*. Et si Proposita Æquatio ex duabus ejusmodi dictis æquationibus produci poterit, erit etiam divisibilis per aliquam harum Fictarum Æquationum, in quibus dictæ *literæ* sunt sublata.

Quoniam autem hæc Regula omnino eadem faciendæ præscribit, quæ præcedens 3^{ta}; hoc tantum excepto, quod illic in *singulis diversis literis duntaxat uno modo*, uti dictum est, hic *modis omnibus* sit tentandum; sufficit uno exemplo rem declarare.

Proponatur itaque hæc æquatio

$$\begin{aligned} x^4 - ax^3 + \frac{1}{2}aaxx - \frac{1}{4}aabbx - \frac{1}{4}aabb\infty 0. \\ - \frac{1}{2}b^2 + \frac{1}{2}ab - \frac{1}{4}abb - \frac{1}{4}ab^2 \\ - \frac{1}{4}bb^2 \end{aligned}$$

Exordiens à *litera a*, prout unam habet dimensionem, obtineo $-ax^3 + \frac{1}{2}abxx - \frac{1}{4}abbx - \frac{1}{4}ab^2\infty 0$, seu $-x^3 + \frac{1}{2}bxx - \frac{1}{4}bbx - \frac{1}{4}b^2\infty 0$. Cujus ope Proposita æquatio dividi nequit (quod ipsum in hoc exemplo vel hinc, apparet, quod hic ultimus terminus $-\frac{1}{4}b^2$, ultimum terminum Propositæ æquationis non absque literalis fractione dividat). Iam, non quidem ad aliam *literam* transeo, quemadmodum in præcedenti Regula, sed tamdiu considerabo eandem *a*, quamdiu adhuc aliæ quantitates in æquatione extant, in quibus illa plurium aut pauciorum dimensionum reperitur. Atque ideo cum ipsa *a* hic adhuc 2 dimensionum reperitur, suppono similiter quantitates omnes, in quibus 2 dimensiones habet, $\infty 0$: nimirum, $\frac{1}{2}aaxx - \frac{1}{4}aabbx - \frac{1}{4}aabb\infty 0$, seu $xx - \frac{1}{2}bx - \frac{1}{4}bb\infty 0$, quæ Propositam æquationem dividere potest. Quod si secus evenisset, ad aliam *literam* transiissem, quandoquidem omnes quantitates, in quibus *a* continetur, solummodo dividi possunt per *a*, vel *aa*. Quocirca factò periculo in *singulis literis*, & omnibus modis, si comperiat, divisionem æquationis Propositæ per nullam Fictarum succedere, certum est, neque Propositam æquationem, ex duabus ejusmodi aliis, quales supra determinavi, produci posse.

V. REGULA,

Quæ modum docet reducendi omnem æquationem, quæ produci potest ex multiplicatione duarum aliarum, quarum una literam aliquam comprehendit, quæ in altera non continetur.

Supponatur aliqua litera $\infty 0$; investigeturque num æquatio, quæ hinc resultat, habeat cum Proposita communem divisorem. Si non habeat, supponatur iterum alia litera $\infty 0$, investigeturque, num ista Resultans habeat communem divisorem: atque sic porro, donec aut communis reperiatur divisor, aut nulla amplius litera supersit, quæ non supposita sit $\infty 0$. Et si non inveniatur communis divisor, signum erit, æquationem Propositam, ex multiplicatione duarum aliarum, quarum una literam aliquam comprehendit, quæ in altera non continetur, produci non posse.

Ex. gratiâ, si proponatur hæc æquatio

$$\begin{array}{r} x^5 + 4abx^3 + 30b^2xx + 34ab^3x + 20ab^4 \infty 0, \\ + bb - 10ab \cdot b + 7a^2 + 10a^2b \\ + \frac{a^3}{bb} - \frac{2a^3}{b}. \end{array}$$

supponaturque litera $a \infty 0$; resultabit inde $x^5 + bbx^3 + 30bbbxx \infty 0$, quæ cum Proposita communem habet divisorem, nempe $xx - 3bx + 10bb \infty 0$. Quod, si aliter evenisset, aliam literam, nimirum b , posuissem $\infty 0$. & si inde Resultans æquatio etiam non habuisset communem divisorem, conclusissem æquationem Propositam, quoniam tantum duas istas a & b diversas habet literas, non resultare posse ex multiplicatione duarum aliarum, &c.

Res eodem modo se habet in æquationibus, quæ irrationales quantitates includunt, ita ut non opus sit alia exempla adungere.

SEQUENTES 6^{ta}, 7^{ma}, ET 8^{ta} REGVLÆ SE EXTENDVNT AD OMNES ÆQVATIONES, QVÆ EX MVLTIPPLICATIONE DVARVM ALIARVM PRODVCİ POSSVNT, IN QVARVM VNA İRRATIONALIS QVANTITAS İNCLVDİTVR, QVÆ İN ALTERA NON CONTİNETVR.

VI. REGVLA,

Quæ modum docet reducendi omnem æquationem, quæ produci potest ex multiplicatione duarum aliarum, quarum una irrationalem aliquam quantitatem comprehendit, quæ in altera non continetur; quæque quantitas non eundem dimensionum numerum in diversis Terminis habet.

Suppono, &c.

VII. REGVLA,

Quæ modum docet reducendi omnem æquationem, quæ produci potest ex multiplicatione duarum aliarum, quarum una irrationalem aliquam quantitatem comprehendit, quæ in altera non continetur; quæque quantitas in aliquo Terminò tot habet dimensiones, quot in nullo alio.

Suppono, &c.

VIII. REGVLA,

Quæ modum docet reducendi omnem æquationem, quæ produci potest ex multiplicatione duarum aliarum, quarum una irrationalem aliquam quantitatem comprehendit, quæ in altera non continetur.

Supponatur, &c.

Quoniam inter hanc 6^{am} & 3^{iam} Regulam, & inter 7^{am} & 4^{am}, nec non inter 8^{am} & 5^{am} haud magna disparitas existit, & tantum pro litera poni debet irrationalis quantitas; crunt hæ Regulæ

le per illas jam explicatæ. Si enim pro unaquaque diversa quantitate irrationali duntaxat diversam litteram concipias aut ponas, evadent hæc cum illis planè eadem. Atque ideo hæc verba in 6^{ta} Regula: *quæque quantitas æquè multarum dimensionum in diversis terminis non existit; & hæc in 7^{ma}: quæque quantitas in aliquo termino talem dimensionum numerum habet, qualem in nullo alio; itemque quid sit quantitas alia irrationalis, nullâ explicatione indigent.*

Et Corollarii loco hîc annotari posset, hanc 8^{vam} Regulam etiam comprehendere Reductionem omnis æquationis, quæ produci potest ex multiplicatione duarum aliarum, quarum una est rationalis, hoc est, in qua nullum est signum radicale, & altera irrationalis.

Quia verò hæc 5^{ta} & 8^{ta} Regula præsupponunt inventionem communis duarum æquationum divisoris, adjungam hîc, quo ego utor,

Modum, inveniendi maximum, duarum (vel plurium) sive æquationum sive quantitatum, divisorem communem.

Proponatur, exempli causâ, inveniendus maximus communis divisor duarum sequentium æquationum vel quantitatum, (considero enim quantitates haud secus atque æquationes, supponendo sc. illas $\infty 0$: cum suppositio hæc, ad inveniendum earum communem divisorem, nullum errorem inferre possit.)

$d^4c - acdd + 2abc - 2abcd \infty 0$, & $d^4c - bbcd + caabb - caadd \infty 0$.
Primò itaque inquiri, num aliqua littera vel numerus reperiatur, cujus ope singuli utriusque æquationis termini dividi queant. Hoc enim si contingat, oportet prius ejusmodi divisionem instituere, ut hîc per litteram c , fiuntque

$$d^4 - add + 2aab - 2abd \infty 0, \text{ \& } d^4 - bbdd + aabb - aadd \infty 0.$$

Deinde ad libitum sumatur aliqua littera, quæ in utraque harum æquationum reperiatur, ut d , a , vel b . Atque considerando ipsam, puta d , tanquam incognitam quantitatem, redigatur utraque in ordinem, habebiturque

$$\begin{array}{ll} 1^{\text{ma}} \text{Æquatio} & 2^{\text{da}} \text{Æquatio} \\ d^3 - add - 2abd + 2aab \infty 0. & d^4 - bbdd + aabb - aadd \infty 0. \\ & -aa \end{array}$$

Porro valor ipsius d^3 , per 1^{am} æquationem inventus, substituitur

tuatur ubique in locum ipsius d^3 secundæ æquationis: invenieturque

$$d^4 \propto ad^3 + 2abdd - 2aabd \propto bbd, + aadd - aabb$$

seu

$$aadd + 2aabd - 2a^3b$$

$$- 2aabd + 2abdd$$

Hoc est, $aabb - 2a^3b + 2abdd - bbd \propto 0$

$$\& dd \propto \frac{2a^3b - aabb}{2ab - bb} \text{ seu } aa; \& d \propto a, \text{ seu } d - a \propto 0.$$

Sijam hujus dd valor substituatur in ipsius locum in 1^{ma} æquatione, habebitur $aad - a^3 - 2abd + 2aab \propto 0$.

Denique substituatur ipsius d valor a in ejus locum in hac ultima, obtinebitur $a^3 - a^3 - 2aab + 2aab \propto 0$.

In hac igitur cum termini omnes se mutuò destruant, indicio est tam æquationem $d^3 - add - 2abd + 2aab \propto 0$ quàm

$$d^4 - bbd^3 + aabb \propto 0 \text{ esse divisibilem per } d - a \propto 0, \&$$

$-aa$
 d — autriusque maximum communem divisorem existere. Atque adeò, cum duæ Propositæ æquationes (vel quantitates) priùs per c sint divisæ, manifestum est earundem maximum communem divisorem fore $d - a$ in c , seu $dc - ac$.

Quòd si autem aliam literam quàm d ceu incognitam quantitatem consideremus, licebit similiter illius ope eòdem semper divisores invenire. Exempli gratiâ, si a ut incognita quantitas consideretur, obtinebitur pro

<p>1^{ma} Æq.</p> $aa - da + \frac{d^3}{2b} \propto 0.$ $- \frac{dd}{2b}$	<p>2^{da} Æq.</p> $aa - \frac{bbdd + d^3}{bb - dd} \propto 0.$ <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin: 5px 0;"/> <p>vel $aa - dd \propto 0$, seu $aa \propto dd$ vel $a - d \propto 0$, seu $a \propto d$.</p>
---	---

Subrogetur jam dd valor ipsius aa , per 2^{dam} æquationem inventus, in locum aa primæ æquationis, & invenietur pro ipsa

$$dd - da + \frac{d^3}{2b} \propto 0.$$

$$- \frac{dd}{2b}$$

Denuo

Denuo in hac ultima in locum ipsius a subrogetur ejus valor d ,
obtrinebitur $dd - dd + \frac{d^3}{2b} \infty 0$.

$$- \frac{ddd}{2b}$$

In hac igitur cum rursus termini omnes se mutuò tollant, argumentum est, utramque æquationem, ut ante, &c.

Eadem est ratio, quæcunque tandem litera pro incognita quantitate sumatur.

Si verò accidisset, ut nec per substitutionem valoris ipsius d^3 , nec ipsius dd , nec denique ipsius d , termini omnes se mutuò destruxissent, argumentum fuisset, quòd duæ illæ æquationes
 $d^3 - add - 2abd + 2aab \infty 0$, & $d^3 - bdd + aab \infty 0$

$$- aa$$

nullum communem divisorem habuissent, & quòd duarum Propositionarum æquationum, quæ priùs per c fuerunt divisæ, nullus communis divisor præter c extitisset. Excepto tantùm, ubi divisio fieri potest per ejusmodi quantitates, quæ simul possunt fieri $\infty 0$, atque in causa esse, quòd valor ejus literæ, quæ tanquam incognita quantitas consideratur, per istam æquationem inveniri non possit.

Exempli gratiâ, si in Propositionis æquationibus literam b , ut incognitam quantitatem considerassem, obtinuisssem

$$b \infty \frac{\text{pro } 1^{\text{ma}}}{\frac{d^3 - add}{2ad - 2aa}} \text{ seu } \frac{dd}{2a}, \text{ \& } b \infty \frac{\text{pro } 2^{\text{da}}}{\frac{d^3 - add}{dd - aa}} \text{ seu } dd$$

$$\text{vel } b \infty d.$$

Vbi videmus, valores ipsius b , nempe $\frac{dd}{2a} \infty d$, se invicem non tollere, ideoque concludendum esset, has duas æquationes non habere communem divisorem, si nempe ejusmodi quantitates non reperirentur, quæ, dum $\infty 0$ ponuntur, efficiunt, ut valor ipsius b inveniri nequeat. Quemadmodum si ponatur $d - a \infty 0$, non poterit valor ipsius b per 1^{am} æquationem inveniri: quippe tum d^3 erit ∞add .

Priusquam itaque concludatur, non dari duarum siue æquationum siue quantitatum communem aliquem divisorem: 1^{mo} observandum venit, num ejusmodi quantitates in æquatione reperiuntur, quæ in causa esse possunt, quòd valor incognitæ literæ, seu

seu instar incognitæ consideratæ, per istam æquationem inveniri nequeat. 2^{do} si reperiantur, num utramque æquationem dividant. quemadmodum in hoc exemplo, ubi reperitur $d - a \infty 0$, cujus ope utraque æquatio dividitur, quod, subrogando a in locum d , uno intuitu videre est. At verò si aliter evenisset, conclusissem, non dari, &c.

Vnum adhuc exemplum adjungam.

Proponamus inveniendum esse maximum communem divisorem harum duarum æquationum sive quantitatum

1^{ma} Æq.

2^{da} Æq.

$$12a^4 + 11a^3x + x^4 - 4ax^3 - 20a^3x \infty 0, \text{ \& } 12a^3x - 3ax^3 + 24a^4 - 16a^3x + x^4 \infty 0.$$

Quoniam autem hæ non divisibiles sunt per aliquam literam nec per numerum, considero literam aliquam, ad libitum sumendam, tanquam incognitam quantitatem, puta x , atque operationem porro instituo, ut sequitur

$$\begin{array}{r} \text{per } 1^{\text{ma}} \text{ invenitur } x^4 \infty 4ax^3 - 11a^3xx + 20a^3x - 12a^4 \\ \text{add.} \quad \quad \quad - 3ax^3 + 12a^3xx - 16a^3x + 24a^4 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{fit pro } 2^{\text{da}} \text{ æquatione} \quad ax^3 + a^3xx + 4a^3x + 12a^4 \infty 0 \\ \text{div. per } a. \quad \quad \quad x^3 \infty ax - 4ax - 12a^3 \end{array}$$

Substituatur jam hîc valor ipsius x^3 in ejus locum in alterutra æquatione, utpote primâ (quamvis autem in hoc exemplo parum interfit, potest tamen in multis casibus magnum esse discrimen, tunc enim oportet, brevitatis causâ, eligere eam, per quam operatio facillimè procedit; quemadmodum vulgò, cum duæ sunt, dimensionibus differentes, ea, quæ pauciores habet, eligenda venit), obtinebiturque $xx \infty ax - 6aa$.

Substituatur rursus hîc valor ipsius xx ubique in ejus locum in una præcedentium æquationum, sumendo, brevitatis causâ, præcedentem 3 dimensionum, inveniatur

2^{da} Æq.

$$\begin{array}{r} x^3 \infty axx - 6aax \text{ seu } \left. \begin{array}{l} + aax - 6a^3 \\ - 6aax \end{array} \right\} \infty 0 \\ + aax \infty \quad \quad \quad + aax - 6a^3 \\ + 4aax + 12a^3 \infty \quad \quad + 4aax + 12a^3 \end{array}$$

In qua videmus terminos omnes se invicem tollere, quod arguit, hæcæ Propositæ æquationes sive quantitates divisibiles esse

Hh h

per

per $xx - ax + 6aa$; quæ ideo maximus est earum communis divisor.

Porro manifestum est, si quis omnes duarum vel plurium sive *Æquationum sive Quantitatum communes divisores* invenire velit, tantum inveniendos esse *divisores omnes Maximi earum communis divisoris*.

Præterea etiam liquet, non tantum in multis casibus, per 1^{am} & 2^{am} Regulam (uti annotatum est) uno intuitu videri posse, duas *Æquationes* vel *Quantitates* non habere communem aliquem divisorem; verum etiam *Regulas omnes*, de *Reductione æquationum agentes*, ad inveniendos omnes ipsarum communes divisores inservire posse.

IX. REGULA,

Quæ modum docet reducendi omnem æquationem, sive literalem, sive numeralem, quæ per aliam, cujus solummodo unus terminus datus est, dividi potest.

Ostendam hoc in uno aut altero tantum exemplo, quoniam generalis modus ex iis deprehendi satis poterit.

Proponatur itaque æquatio $x^6 - 4x^4 + 4x^3 + 1\frac{1}{2}xx - 7x - 300$, deturque illam dividi posse per aliam duarum dimensionum, cujus ultimus Terminus sit -2 . Esto autem illa $xx + 7x - 200$, seu, $xx - 7x + 2$. Hunc valorem ipsius xx ubique substituo in ejus locum, aliamque æquationem loco Propositæ obtineo, in qua x tantum unius dimensionis reperitur: nimirum, $y^4 + 4y^3 + 10yy + 14\frac{1}{2}y + 5$ in x , $-2y^4 - 8yy - 16y - 1600$, quemadmodum ex sequenti operatione videre est.

$xx - 00$

$$\begin{array}{r}
 \frac{xx \infty - yx + 2}{\text{ergo } x^4 \infty yyxx - 4yx + 4 \text{ seu } - y^3x + 2yy} \\
 \frac{-4yx + 4}{x^5 \infty - y^3xx + 2yyx} \text{ seu } + y^4x - 2y^3 \\
 \frac{-4yx + 4x}{+ 2yyx} \\
 \frac{-4x^4 \infty}{+ 4yx - 8y} \\
 \frac{+ 4x^3 \infty - 4yx + 8x \text{ seu } + 4y^3x - 16}{+ 16yx - 8yy} \\
 \frac{+ 1\frac{1}{2}xx \infty}{- 7x - 3 \infty} \text{ seu } + 4yyx - 8y \\
 \frac{- 7x - 3 \infty}{- 1\frac{1}{2}y + 3} \\
 \frac{- 7x - 3}{- 7x - 3} \\
 \text{summa } + y^4x - 2y^3 \\
 + 4y^3 - 8yy \infty 0. \\
 + 10yy - 16y \\
 + 14\frac{1}{2}y - 16 \\
 + 5
 \end{array}$$

Deinde confidero unumquemque terminum separatim æquationis hujus deductæ $\infty 0$, & cum hîc duo tantum sint termini, habebô inde hæc duas æquationes

$$\begin{array}{l}
 \text{I.} \\
 y^4 + 4y^3 + 10yy + 14\frac{1}{2}y + 5 \infty 0, \& - 2y^3 - 8yy - 16y - 16 \infty 0 \\
 \text{II.} \\
 \text{seu } y^3 + 4yy + 8y + 8 \infty 0.
 \end{array}$$

Quarum quidem æquationum, si juxta præcedentem methodum quæratûr maximus communis divisor, inveniatur pro ipsâ $y + 2 \infty 0$; ita ut Proposita æquatio, cum y sit $\infty - 2$, divisibilis sit per $xx - 2x - 2 \infty 0$.

Eodem modo, proponatur hæc æquatio

$$x^4 - 2ax^3 + 2aaxx - 2a^3x + a^4 \infty 0, \text{ deturque ipsam dividi}$$

— cc

posse per æquationem duarum dimensionum, cujus ultimus terminus sit $+aa$. Esto autem æquatio illa $xx + yx + aa \infty 0$, adeoque $xx \infty - yx - aa$. Hinc, subrogato hoc valore in locum xx , obtinebitur loco Propositæ æquationis alia, in qua x unius tantum crit dimensionis, nempe $-y^3x - aayy \infty 0$.

$$\begin{array}{r}
 - 2ayy - 2a^3y \\
 + ccy + aacc \\
 \text{Hhh 2}
 \end{array}$$

Cujus

428 IOHANNIS HÜDDENII EPIST. I.

Cujus si unusquisque separatus terminus rursus consideretur, habebimus has duas æquationes

I.

$$-y^3 - 2a^2y + cc y \infty 0, \text{ \& } -a^2y - 2a^3y + aacc \infty 0.$$

seu

II.

$$-yy - 2ay + cc \infty 0 \quad -yy - 2ay + cc \infty 0.$$

Cum igitur harum communis mensura seu divisor sit $-yy - 2ay + cc \infty 0$, quero hinc valorem ipsius y : invenioque $y \infty -a \sqrt[3]{aa + cc}$, ac proinde æquationem Propositam esse divisibilem per $xx - a \sqrt[3]{aa + cc}$ in x , $+aa \infty 0$.

Similiter, si detur, hanc æquationem

$$x^5 + bbyx^3 + 3abbxx^2 + 2ab^2 \infty 0 \text{ esse divisibilem per aliam}$$

$$+aa - 2a^3$$

3 dimensionum, cujus tertius terminus sit $+2aax$: pono pro ipsa $x^3 + yxx + 2aax + z \infty 0$, seu $x^3 - yxx - 2aax - z$. Quo valore ubique in locum x^3 in Proposita æquatione subrogato, obtinebitur

$$-z \quad xx + yzx + aaz \infty 0.$$

$$+ 3aay + 2a^2 - yyz$$

$$-y^3 - 2a^2yy - bby$$

$$-bbz - 2aabb + 2ab^2$$

$$+ 3abb$$

$$- 2a^3$$

Quoniam autem hæc æquatio 3 habet separatos terminos, habebuntur inde hæc 3 æquationes

1^{ma}

$$-z + 3aay - y^3 - bby + 3abb - 2a^3 \infty 0,$$

2^{da}

3^{tia}

$$yz + 2a^2 - 2a^2y - 2aabb \infty 0, aaz - yyz - bbz + 2ab^2 \infty 0.$$

Hinc per 1^{am} sublatâ z , quæ est $\infty 3aay - y^3 - bby + 3abb - 2a^3$, invenietur pro 2^d: $-y^4 + aayy + 3abb - 2aabb \infty 0$,

$$-bb - 2a^3$$

$$+ 2a^2$$

$$\text{\& pro 3^{ta}: } +y^5 - 4aay^3 + 2a^3yy + 3a^4y + 5a^5bb \infty 0.$$

$$+ 2bb - 3abb - 4aabb - 2a^5$$

$$+ b^4 - ab^2$$

Quarum duarum maxima communis mensura per superiorem me-

methodum est $y - a \infty 0$, ideoque $y \infty a$; cumque z sit $\infty 3 a a y - y^3 - b b y + 3 a b b - 2 a^3$, erit inde z etiam $\infty + 2 a b b$. Æquatio autem, per quam Proposita dividi potest, posita erat $x^3 + y x x + 2 a a x + z \infty 0$. Quocirca si in hac subrogentur valores quantitatum incognitarum y & z , invenietur pro ipsa $x^3 + a x x + 2 a a x + 2 a b b \infty 0$.

Atque ita de aliis omnibus Propositis æquationibus, siue rationalibus siue irrationalibus, & vel aliquam vel nullam fractionem habentibus; atque etiam siue ultimus Terminus, siue aliquis alius, quem libuerit, æquationis, per quam Proposita dividi queunt, datus fuerit, siue alicui quantitati (ut in his exemplis), siue nihilo æqualis sit; cujus quidem generis nullum exemplum affero, cum operatio haudquaquam diversa existat. Id tantum addam, hæc omnia etiam ex comparatione terminorum duarum ejusdem formæ æquationum inveniri posse.

10^{ma}, ET 11^{ma} REGVLÆ SE EXTENDVNT AD OMNEM ÆQVATIONEM, SIVE IN EA IRRATIONALES QUANTITATES ET FRACTIONES, SIVE NULLÆ REPERIANTVR, EXCEPTIS TANTVM ILLIS ÆQVATIONIBVS, IN QVIBVS SIGNA RADICALIA SVNT, QVÆ INCOGNITAM QVANTITATEM INCLVDVNT.

Cum autem hæc duæ Regulæ Methodum requirant, qua omnia signa radicalia, quæ incognitam quantitatem includunt, si in æquatione Proposita talia fortè fuerint, primùm tollantur; sequentes verò Regulæ, quibus omnia signa sine discrimine primùm auferantur: præmittam

Modum tollendi signa radicalia ex qualibet æquatione Proposita.

Proponatur, verbi gratiâ, æquatio $n \infty e + g + h + k + m$, &c. in qua 1^o: quælibet litera quantitatem designet, signo radicali $\sqrt{\quad}$ affectam. Multiplicetur utraque pars quadratè, & evanescet signum quantitatis n . Quoniam autem reliquæ literæ e, g, h, k, m , &c. aut unam aut duas dimensiones habebunt, signumque radicale, in quantum duas habent, evanescet; manifestum est, ob-

H h h 3

tineri

tineri posse æquationem, in qua æquatur aliis terminis, in quibus non comprehenditur. Quæ æquatio si rursus eodem modo in se ducatur quadratæ, evanescet pariter signum radicale ipsius e ; & quoniam in hac ultima æquatione tunc reliquæ literæ habebunt aut 1, aut 2, aut 3, aut 4 dimensiones, ac ipsæ in quantum ex paribus dimensionibus constant nullum signum radicale habent, & quantum ex imparibus constant ratione tollendi signi radicalis solummodo considerandæ sunt tanquam unâ duntaxat dimensionis constantes, cum duæ signo radicali semper carent: manifestum est rursus inveniri posse æquationem, in qua g sit æqualis aliquot terminis, in quibus g non comprehenditur. Quæ æquatione denuo quadratâ, sublatum item erit signum radicale ipsius g . Atque ita facile est intelligere, quâlibet quadratione unum signum radicale tolli.

Majoris perspicuitatis ergo addatur sequens operatio, existente $n \propto e + g + h + k$, ubi quadrando utramque partem æquationis prodit æquatio $nn \propto ee + gg + hh + kk + 2eg + 2eh + 2ek + 2gh + 2gk + 2hk$. Brevitatis autem causâ, pro $\frac{nn - ee - gg - hh - kk}{2}$ scribatur pp ; cum hæc quantitates signo radicali careant; & sit $pp \propto eg + eh + ek + gh + gk + hk$, sive $e \propto \frac{pp - gh - gk - hk}{g + h + k}$. Vnde quadrando rursus utramque partem invenitur:

$$ee \propto \frac{p^4 + gghh + ggkk + hhhh - 2ppgh - 2ppgk - 2pphk + 2gghk + 2ghhk + 2ghkk}{gg + hh + kk + 2gh + 2gk + 2hk},$$

seu

$$p^4 + gghh + ggkk + hhhh - 2ppgh - 2ppgk - 2pphk + 2gghk + 2ghhk + 2ghkk - gg - hh - kk - 2gh - 2gk - 2hk \text{ in } ee \propto 0.$$

Supponatur, ut ante, brevitatis causâ,

$$p^4 + gghh + ggkk + hhhh - gg - hh - kk \text{ in } ee \propto q^4$$

$$+ 2kk - 2pp - 2ee \propto rr$$

$$+ 2hh - 2pp - 2ee \propto ss$$

$$+ 2gg - 2pp - 2ee \propto tt,$$

crit-

critque $q^4 + rrgb + ffgk + tthk \propto 0$

$$\frac{q^4 + tthk}{rrb + ffk} \propto -g$$

$$\frac{q^4 + t^4 h h k k + 2 q^4 t t h k}{r^4 h h + f^4 k k + 2 r r f f h k} \propto g g$$

$$q^8 + r^4 h h k k + 2 q^4 t t h k - r^4 h h - f^4 k k - 2 r r f f h k \text{ in } g g \propto 0.$$

Supponatur rursus, brevitatis causâ,

$$q^8 + r^4 h h k k - r^4 h h g g - f^4 k k g g \propto v^8,$$

$$\& 2 q^4 t t - 2 r r f f g g \propto w^8:$$

$$\text{fictque } v^8 + w^8 h k \propto 0$$

$$\frac{v^8 \propto -w^8 h k}{v^8 \propto -w^8 h k}$$

& invenitur $v^{16} \propto w^{12} h h k k$. Quæ æquatio ab omnibus signis radicalibus liberata est.

Deinde ponatur unaquæque litera æquationis superioris $\propto e + g + h$, &c. designare quantitatem signo radicali \sqrt{C} . affectam. In hac igitur si loco quadratæ multiplicationis utraque pars multiplicetur cubicè, evanescet signum radicale ipsius n , & unaquæque reliquarum literarum, e, g, h , &c. acquirere 1, 2, aut 3 dimensiones. In quantum autem tres dimensiones habent, in tantum carent etiam signo radicali, adè ut hâc ratione obtineri queat æquatio, in qua e non nisi 1 aut 2 dimensiones habere potest. Quocirca multiplicando omnes hosce terminos per e , obtinebitur æquatio, in qua e præter 1, 2, & 3 dimensiones habere nequit. In quantum autem 3 habet, in tantum quoque signum radicale, uti dictum est, evanescit; ac proinde ipsa e in hac æquatione etiam non nisi 1 & 2 dimensiones retinere poterit. Hinc si ope hujus æquationis quæratu valor ipsius ee , isque in locum ee præcedentis substituat, obtinebitur æquatio in qua e unam tantum dimensionem habebit, atque ideo inveniri poterit e æqualis aliquot terminis, in quibus ipsa non comprehenditur. Quæ æquatio, si deinde cubetur, dabit aliam, in qua similiter signum radicale ipsius e prorsus evanescet. vel potest rursus per e multiplicari, & valor ee de novo inveniri, qui iterum, ut antea, positus loco ee , habes valorem ipsius e alio adhuc modo; ideoque duo hi valores invicem comparati, æquationem dabunt, in quâ $\sqrt{x^{30}}$ ipsius

ipſius e non reperies. Atque ſic omnia alia ſigna radicalia ex æquatione tolli poſſunt; quod facillimè perſpicitur, ſi tantum adverſamus, quòd, verbi gratiâ, $g, gg, g^2, g^3, g^4, g^5, g^6, g^7, g^8, g^9, g^{10}, g^{11}, g^{12}, g^{13}, g^{14}, &c.$ ſolummodo habendæ ſint pro g, gg , cum g^3 ſignum radicale deponat. Quæ ut magis perſpicua evadant, ſequentem operationem adſcribere viſum fuit.

$$\text{Sit ex. gr.} \quad \frac{n \infty e + g}{n^3 \infty e^3 + 3 e e g + 3 e g g + g^3}$$

Eſto jam, brevitatis cauſâ, $n^3 - e^3 - g^3 \infty f^3$, quoniam ipſæ Aſymmetriâ carent, fietque $f^3 \infty 3 e e g + 3 e g g$.

$$\frac{f^3 e \infty 3 e^2 g + 3 e e g g}{\& \frac{f^3 e - 3 e^2 g}{g} \infty 3 e e g.}$$

Invento valore ipſius $3 e e g$ in ejus locum in æquatione præcedente ſubrogato, habebitur:

$$\begin{aligned} f^3 &\infty \frac{f^3 e - 3 e^2 g}{g} + 3 e g g \\ \frac{f^3 g \infty f^3 e - 3 e^2 g + 3 e g^3}{f^3 g + 3 e^2 g \infty f^3 e + 3 e g^3} \\ \frac{f^3 g + 3 e^2 g}{f^3 + 3 g^3} &\infty e. \end{aligned}$$

Denique ponatur, brevitatis cauſâ, $f^3 + 3 e^3 \infty p^3$, & $f^3 + 3 g^3 \infty q^3$, cum ſingularæ ſigna radicale deponant, critque $\frac{p^3 g}{q^3} \infty e$

& $\frac{p^3 g^2}{q^3} \infty e^2$. Quæ æquatio ab Aſymmetria libera eſt. Vel hoc modo: multiplicetur $\frac{p^3 g}{q^3} \infty e$ per e , erit $\frac{p^3 g e}{q^3} \infty e e$; & quoniam inventa eſt $f^3 \infty 3 g e e + 3 g g e$, ſeu, $\frac{f^3 - 3 g g e}{3 g} \infty e e$

$$\begin{aligned} \text{erit } \frac{p^3 g e}{q^3} &\infty \frac{f^3 - 3 g g e}{3 g} \\ \& \frac{3 g g p^3}{q^3} &\infty q^3 f^3 - 3 q^3 g g e \\ \text{ergo } e &\infty \frac{q^3 f^3}{3 g g p^3 + 3 q^3 g g} \infty \frac{p^3 g}{q^3} \end{aligned}$$

& $q^6 f^3 \infty 3 g^3 p^6 + 3 g^3 p^3 q^3$. Quæ æquatio itidem ab omni ſigno radicali libera eſt.

Pari

Pariratione tolli quoque possunt signa quævis altiora, siue illa ejusdem, siue diversæ dimensionis sint. Sed notandum est, quòd signa hæc, siue ipsa cognitis, siue incognitis quantitibus præfigantur, per hunc modum semper quidem tolli possint, sed cum tæpissime non esse brevissimum, quando scilicet signa radicalia ad quantitates cognitas pertinent; quemadmodum pag. 75 Geometriæ cernere licet, ubi constat, quædam signa tolli posse multiplicando radicem æquationis per certam aliquam quantitatem, quo opere ipsa in aliam æquationem transmutatur, æquæ multis dimensionibus habentem.

Dantur præterea adhuc alia compendia, quorum supra allatum exemplum specimen erit: hæc enim æquatio $f^3 \propto 3gee + 3gge$ divisa per n ab una parte, & per $e + g$ (quæ æqualis est n), ab altera parte, dat $\frac{f^3}{n} \propto 3ge$, cujus partes cubicè multiplicatæ dabunt $\frac{f^9}{n^3} \propto 27g^3e^3$, æquationem, in qua nullum signum radicale invenitur: Sed quoniam proposui tantummodo hic generalem modum indicare, quo semper omnia signa radicalia tolli queant, & non compendia, quibus in multis casibus facilius eo pervenire posses, monstrare; ideo huic rei finem imponam, & ad Regulas Reductionum revertar.

X. REGVLA.

Quæ modum docet reducendi omnem æquationem, siue literalem siue numeralem, cujus incognita quantitas, (vel alia litera, quæ tanquam incognita considerari potest) duos vel plures æquales habet valores.

Primò si in Proposita æquatione duæ æquales radices existant, multiplico eam per Arithmeticam Progressionem pro libitu assumptam: nimirum, 1^{um} terminum æquationis per 1^{um} terminum progressionis, 2^{dum} terminum æquationis per 2^{dum} terminum progressionis, & sic deinceps; & Productum, quod inde fit, erit $\propto 0$. Deinde, cum sic duas habeam æquationes,

Iii

quæ-

quæro, per Methodum superius explicatam, maximum earum communem divisorem; atque hujus ope æquationem Propositam toties divido, quoties id fieri potest.

Exempli gratiâ, proponatur hæc æquatio $x^3 - 4xx + 5x - 200$, in qua duæ sunt æquales radices. Multiplico ergo ipsam per Arithmeticam Progressionem qualemcunque, hoc est, cujus incrementum vel decrementum sit vel 1, vel 2, vel 3, vel alius quilibet numerus; & cujus primus terminus sit vel 0, vel +, vel — quam 0: Ita ut semper ejus ope talis terminus æquationis tolli possit, qualem quis voluerit, collocando tantum sub eo 0.

Vt si, exempli causâ, ultimum ejus terminum auferre velim, multiplicatio fieri potest ipsius $x^3 - 4xx + 5x - 200$ per hanc progressionem

$$\begin{array}{r} 3. \quad 2. \quad 1. \quad 0 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{fiatque } 3x^3 - 8xx + 5x - 200.$$

Maxima autem communis divisor hujus & Propositæ æquationis est $x - 100$, per quam Proposita bis dividi potest; ita ut ejusdem radices sint 1, 1, & 2.

Sic si cupiam 1^{um} æquationis terminum auferre, multiplicatio institui potest ipsius $x^3 - 4xx + 5x - 200$ per hanc progressionem

$$\begin{array}{r} 0. \quad 1. \quad 2. \quad 3. \\ \hline \end{array}$$

$$\text{& fit } * - 4xx + 10x - 600.$$

Cujus quidem ac Propositæ æquationis maximus communis divisor, ut antea, est $x - 100$.

Similiter si 2^{um} terminum tollere lubeat, multiplicatio fieri potest, hoc pacto:

$$\begin{array}{r} x^3 - 4xx + 5x - 200 \\ + 1. \quad 0. \quad - 1. \quad - 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\text{& prodibit } x^3 - 5x + 400.$$

Cujus item & Propositæ maximus communis divisor est $x - 100$.

Vbi notandum, non necessarium esse, semper uti Progressione cujus excessus sit 1, quanquam ea communiter sit optima.

Cæterum notandum, inter omnes has diversas operationes, quamvis eundem communem divisorem maximum exhibeant, tamen alias aliis sæpe esse præferendas, quandoquidem unius termini destructione sæpenumero multò facilius ad finem pervenitur, quam

quàm alterius. Neque etiam tenemur hunc divisorem immediate ex Proposita æquatione & aliqua huiusmodi Progressione genita investigare: cum duæ ex his eligi possint, quarum beneficio cum invenire liceat. Vt sumendo, verbi gratiâ, $3xx - 8x + 500$ & $-4xx + 10x - 600$, vel $3xx - 8x + 500$ & $x^3 - 5x + 400$, vel $-4xx + 10x - 600$ & $x^3 - 5x + 400$. Et sæpe etiam longè compendiosius est, duò huiusmodi producta sibi eligere, ac deinde illorum communem divisorem quærere, quàm uti uno aliquo producto & æquatione Proposita. Quæ quidem omnia usus hujus Regulæ abundè docebit.

Quemadmodum autem in hoc exemplo, ita in quovis alio Proposito procedo: cum perinde sit, sive æquatio numerica, sive literalis fuerit, & sive fractiones aut surdas quantitates includat, sive non; modò incognita quantitas inter surdas non contineatur: ita ut superfluum sit plura exempla hac de re afferre. Quocirca ad alteram hujus Regulæ partem transio.

2^{da}. Si in Proposita æquatione 3 æquales radices fuerint, multiplico illam per Arithmeticam Progressionem, ut antea; eritque Productum 00 : Hoc Productum rursus multiplico per Arithmeticam Progressionem; eritque hoc secundum Productum etiam 00 . Si æquatio Proposita 4 radices æquales habeat, ter multiplico; si 5, quater; & ita semper obtinebuntur tot æquationes, quot radices æquales in æquatione Proposita continentur.

Exempli gratiâ, detur hæc æquatio $x^4 - 6xx + 8x - 300$, habens 3 æquales radices.

Primò multiplico eam per 0. 1. 2. 3. 4.
 & fit $-12xx + 24x - 1200$.

Hoc productum iterum multiplico per 0. 1. 2.
 & provenit $24x - 2400$.

eritque communis divisor $x - 100$,

Ita ut Proposita æquatio habeat has 4 radices 1, 1, 1, & -3 . Et sic de aliis omnibus.

Dividendo jam per $z d d y^3$ & transferendo v ad alteram partem, obtinebitur $\frac{zy^3}{dd} - \frac{byy}{dd} - \frac{cy}{d} + \frac{2bc}{d} + \frac{bcc}{yy} - \frac{bbcc}{y^3} \propto v$.

$$+ \frac{bbv}{dd}$$

$$+ y$$

3^{um} autem exemplum ejusdem est naturæ cum 1^{mo}.

Vbi patet, in omnibus hisce exemplis Quæsitum ex sola Producta æquatione uno intuitu inveniri, y enim cognita est, atque v , quæ erat incognita ac sola quærebatur, jam etiam innotuit.

At verò sæpe etiam accidit, ut Quæsitum ex sola hac Producta æquatione inveniri nequeat; quemadmodum contingit si valorem quantitatis incognitæ s investigare velimus. Quippe tunc valor ipsius v in prima æquatione in ejus locum subrogandus est, vel potius in alia æquatione, per aliam Progressionem productâ, cujus beneficio ex illa prima terminus aliquis pro lubitu (excepto eo, qui per 1^{am} Progressionem est sublatus) tolli potest.

Exempli gratiâ, in 1^{mo} exemplo multiplicatum fuit per $z, 1, 0$, ac inde inventum $v \propto y - \frac{ry}{q} + \frac{1}{2}r$; Iam si multiplicetur

$$yy + \frac{qr - 2qv}{q - r} y + \frac{qvv - qss}{q - r} \propto 0$$

$$\text{per } +1, \quad 0, \quad -1:$$

$$\text{obtinetur } yy \quad * \quad \frac{-qvv + qss}{q - r} \propto 0$$

mult. per $q - r$.

$$\text{div. per } q. \quad \frac{qyy - ryy}{q} * \frac{-qvv + qss}{q} \propto 0$$

$$ss \propto -yy + \frac{ryy}{q} + vv$$

$$\text{fit } s \propto \sqrt{-yy + \frac{ryy}{q} + vv}$$

Quocirca si in hac æquatione in locum v subrogetur ejus valor, innotescet inde etiam quantitas s .

Eodem modo, multiplicando in 2^{do} exemplo per hanc Progressionem $3, 2, 1, 0, -1, -2, -3$, inveniri potest valor quantitatis s . Vbi si similiter in locum v , ejus valor substituitur, quantitas s inde innotescet.

Quod si verò contingat, æquationem, per quam v quæritur, esse talem, ut valor ipsius v per eandem æquationem solam sine

438 IOHANNIS HVDDENII EPIST. I.

ipsius, inclusionem obtineri non possit; quemadmodum hic valor ipsius, absque inclusione ipsius, ex producta æquatione inveniri nequit; potest tamen semper, quocunque etiam dimensiones quælibet incognita quantitas habeat, tandem inveniri æquatio (operando haud secus ac si illarum communis divisor, ut supra ostensum fuit, quæreretur), in qua duntaxat una incognita quantitas includitur, cujus radices deinceps sunt inveniendæ.

Exempli gratiâ, si habeatur hæc æquatio

$$y^4 - 6zzyy - 12z^3y + 9z^4 = 0, \\ -944zz$$

in qua y & z sint incognitæ, & y ad 2 æquales radices determinari debeat: operationem instituo, ut sequitur.

$$y^4 - 6zzyy - 12z^3y + 9z^4 = 0 \\ -944zz$$

$$\begin{array}{r} \text{Mult. per } 0, 1, 2, 3, 4 \\ \text{fit} \quad -12zzyy - 36z^3y + 36z^4 = 0 \\ -3644zz \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{div. per } 12zz. \quad -yy - 3zy + 3zz = 0 \\ -344 \\ yy - 3zy + 3zz. \\ -344 \end{array}$$

Similiter multiplicetur Proposita

$$y^4 - 6zzyy - 12z^3y + 9z^4 = 0 \\ -944zz$$

$$\begin{array}{r} \text{per } 4, 3, 2, 1, 0 \\ \text{fit } 4y^4 - 12zzyy - 12z^3y = 0 \end{array}$$

$$\text{div. per } 4y. \quad y^3 - 3zz y - 3z^3 = 0.$$

Substituendo jam valorem ipsius yy , supra inventum, in ejus locum, habebitur

$$\begin{array}{r} y^3 - 3zyy + 3zzy \text{ seu } + 9zz y - 9z^3 \\ - 344y \quad + 3zz y + 944z \\ - 344y \\ - 3zz y - 3z^3 = 0 \quad . \quad . \quad - 3zz y - 3z^3 \\ \text{summa} \quad + 9zz y - 12z^3 = 0 \\ - 344y + 944z \\ y = \frac{4z^3 - 344z}{3zz - 44} \end{array}$$

Quo-

Quocirca substituendo rursus hunc valorem ubique in locum y in hac æquatione $yy \infty - 3zy + 3xz$, exurget inde alia æqua-
 $- 3aa$

tio, in quâ nulla incognita præterquam sola z reperitur, quæque per eam porro inveniri potest.

Denique, quicquid hic de duabus æqualibus radicibus dixi, eodem etiam modo de 3 aut pluribus æqualibus est intelligendum. Si enim æquatio habeatur, quæ omnes conditiones Problematis includat, exceptâ hac solâ, quod incognita quantitas, vel quæ ut incognita consideratur, ad 3 vel plures æquales radices adhuc sit determinanda: oportet ipsam primum multiplicare per Arithmetica Progressionem, & hoc productum rursus eodem modo, & sic deinceps, donec totidem æquationes habeantur, quot æquales radices. ut supra dictum atque explicatum fuit. Quo peracto, tantum æquationes eodem modo resolvendæ sunt, ut in superiori exemplo ostensum est, donec una tandem obtineatur æquatio, in qua non nisi una incognita quantitas reperitur. Et demum notandum, infinita Problemata, quæ multis planè artificiosa ac ingeniosa dicuntur, ad talem æquationem, in qua solummodo una huiusmodi determinatio adhuc implenda est, quàm facillimè reduci & deinde per hanc Methodum solvi posse.

XI. REGULA,

Quæ modum docet reducendi omnes æquationes, sive literales, sive numerales, quæ produci possunt ex multiplicatione duarum aliarum, in quarum alterutra unus pluresve termini deficiunt.

Brevitatis causâ, quantitatem cognitam 2^{di} termini, adfectam suis signis $+$ & $-$, vocabop; 3^{ui} q ; 4^{ti} r ; 5^{ti} s ; atque sic deinceps: & $-p$, $-q$, $-s$, &c. easdem quantitates designabunt, sed contrariis signis adfectas.

Ex.gr.in hac æquatione $x^4 - 2ax^3 - 4bbxx + 6abbx - 4a^4xoo$,
 $+ 3b$ $+ 2aab$
 erit $-2a + 3b \infty p$; $-4bb \infty q$; $+ 6abb + 2aab \infty r$; $-4a^4 \infty s$;
 & $+ 2a - 3b \infty -p$; $+ 4bb \infty -q$; &c.

1^{ma} Pars.

Si aliqua æquatio , 6 aut pauciores dimensiones habens , produci possit ex multiplicatione duarum aliarum, quarum altera sit unius dimensionis, altera verò uno pluribusve terminis careat ; erit ejus Formula aliqua ex sequentibus , & poterit dividi vel per unamquamque æquationem sibi adjunctam, vel per aliquam earum.

Per *unamquamque* , ubi hæ æquationes seu Divisores copulantur per voculam & ; per *aliquam* verò, ubi disjunguntur per voculam vel.

$$x^1, pxx, qx, r \infty 0 \dots \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x+\frac{r}{q} \infty 0.$$

$$x^4, p x^3, qxx, rx, s \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x+\frac{s}{r} \infty 0.$$

$$x^4, p x^3, *, rx, s \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x+\frac{s}{r} \infty 0.$$

$$x^4, p x^3, qxx, *, s \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x \sqrt{-\frac{s}{q}} \infty 0.$$

$$x^4, *, qxx, rx, s \infty 0 \text{ per } x+\frac{s}{r} \infty 0, \text{ vel } x \sqrt{-q} \infty 0.$$

$$x^1, p x^4, q x^3, rxx, sx, t \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x+\frac{t}{s} \infty 0, \\ \text{vel } x+\frac{1}{2}p \sqrt{\frac{1}{2}pp-q} \infty 0.$$

$$x^1, p x^4, q x^3, *, sx, t \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x+\frac{t}{s} \infty 0.$$

$$x^1, p x^4, *, rxx, sx, t \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x+\frac{t}{s} \infty 0.$$

$$x^1, p x^4, q x^3, rxx, *, t \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x \sqrt{-\frac{t}{r}} \infty 0$$

$$x^1, *, q x^3, rxx, sx, t \infty 0 \text{ per } x+\frac{t}{s} \infty 0, \text{ vel } x \sqrt{-q} \infty 0.$$

$$x^1, p x^4, *, *, sx, t \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x+\frac{t}{s} \infty 0.$$

$$x^1, p x^4, *, rxx, *, t \infty 0 \text{ per } x+p \infty 0, \text{ vel } x \sqrt{-\frac{t}{r}} \infty 0.$$

x⁵;

$$x^5, *, q x^3, *, s x, t \infty 0 \quad \text{per } x + \frac{t}{s} \infty 0, \mathcal{E} x \mathcal{R} \sqrt{-q} \infty 0.$$

$$x^5, p x^4, q x^3, *, *, t \infty 0 \quad \text{per } x + p \infty 0, \mathcal{E} x + \sqrt{C. \frac{t}{q}} \infty 0.$$

$$x^5, *, *, r x x, s x, t \infty 0 \quad \text{per } x + \frac{t}{s} \infty 0, \mathcal{E} x + \sqrt{C. r} \infty 0.$$

$$x^5, *, q x^3, r x x, *, t \infty 0 \quad \text{per } x \mathcal{R} \sqrt{-q} \infty 0, \mathcal{E} x \mathcal{R} \sqrt{-\frac{t}{r}} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, q x^4, r x^3, s x x, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x + \frac{v}{t} \infty 0,$$

$$\text{vel } x + \frac{1}{2} p \mathcal{R} \sqrt{\frac{1}{4} p p - q} \infty 0,$$

$$\text{vel } x + \frac{t}{2} \mathcal{R} \sqrt{\frac{t t}{4} - \frac{v}{t}} \infty 0,$$

$$x^6, p x^5, q x^4, *, s x x, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x + \frac{v}{t} \infty 0,$$

$$\text{vel } x + \frac{1}{2} p \mathcal{R} \sqrt{\frac{1}{4} p p - q} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, q x^4, r x^3, *, s x, v \infty 0 \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x + \frac{v}{s} \infty 0,$$

$$\text{vel } x + \frac{1}{2} p \mathcal{R} \sqrt{\frac{1}{4} p p - q} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, q x^4, r x^3, s x x, *, v \infty 0 \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x \mathcal{R} \sqrt{-\frac{v}{s}} \infty 0,$$

$$\text{vel } x + \frac{1}{2} p \mathcal{R} \sqrt{\frac{1}{4} p p - q} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, q x^4, *, *, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x + \frac{v}{t} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, q x^4, *, s x x, *, v \infty 0 \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x \mathcal{R} \sqrt{-\frac{v}{s}} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, q x^4, r x^3, *, *, v \infty 0 \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel per utram-} \\ \text{que harum duarum}$$

$$x + \sqrt{C. \frac{v}{r}} \infty 0,$$

$$x + \frac{1}{2} p \mathcal{R} \sqrt{\frac{1}{4} p p - q} \infty 0.$$

$$x^6, *, q x^4, r x^3, s x x, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x + \frac{v}{t} \infty 0, \text{vel } x \mathcal{R} \sqrt{-q} \infty 0,$$

$$\text{vel } x + \frac{t}{2} \mathcal{R} \sqrt{\frac{t t}{4} - \frac{v}{t}} \infty 0.$$

$$x^6, *, q x^4, r x^3, *, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x + \frac{v}{t} \infty 0, \text{vel } x \mathcal{R} \sqrt{-q} \infty 0.$$

$$x^6, *, q x^4, r x^3, s x x, *, v \infty 0 \quad \text{per } x \mathcal{R} \sqrt{-q} \infty 0, \text{vel } x \mathcal{R}$$

$$\sqrt{-\frac{v}{s}} \infty 0.$$

Kkk

x⁶,

$$x^6, *, *, r x^3, s x x, t x, v \infty \quad \text{per } x + \frac{v}{t} \infty 0, \text{vel } x + \sqrt{C.r} \infty 0.$$

$$x^6, p x^i, *, r x^3, s x x, *, v \infty \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x \text{ g } \sqrt{-\frac{v}{t}} \infty 0.$$

$$x^6, p x^i, *, r x^3, s x x, t x, v \infty \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x + \frac{v}{t} \infty 0, \\ \text{vel } x + \frac{t}{2f} \text{ g } \sqrt{\frac{11}{4ff} - \frac{v}{t}} \infty 0.$$

$$x^6, *, q x^4, *, s x x, t x, v \infty \quad \text{per } x + \frac{v}{t} \infty 0, \text{vel } x \text{ g } \sqrt{-q} \infty 0.$$

$$x^6, p x^i, *, *, s x x, t x, v \infty \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x + \frac{v}{t} \infty 0.$$

$$x^6, p x^i, *, r x^3, *, t x, v \infty \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{vel } x + \frac{v}{t} \infty 0.$$

$$x^6, p x^i, q x^4, *, *, *, v \infty \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{g } x - \frac{v}{p} \infty 0 +$$

$$\text{g } x \text{ g } \sqrt{-\frac{v}{ppq}} \infty 0,$$

$$\text{g } x \text{ g } \sqrt{v - \frac{v}{q}} \infty 0.$$

$$x^6, *, q x^4, r x^3, *, *, v \infty \quad \text{per } x \text{ g } \sqrt{-q} \infty 0, \text{g } x - \frac{v}{q} \infty 0,$$

$$\text{g } x + \sqrt{C. \frac{v}{t}} \infty 0.$$

$$x^6, *, *, r x^3, s x x, *, v \infty \quad \text{per } x - \frac{r}{v} \infty 0, \text{g } x \text{ g } \sqrt{-\frac{v}{t}} \infty 0,$$

$$\text{g } x + \sqrt{C.r} \infty 0.$$

$$x^6, *, *, *, s x x, t x, v \infty \quad \text{per } x + \frac{v}{t} \infty 0, \text{g } x - \frac{11}{v} \infty 0,$$

$$\text{g } x \text{ g } \frac{t}{v} \sqrt{-s} \infty 0,$$

$$\text{g } x - \sqrt{C. \frac{11}{v}} \infty 0,$$

$$\text{g } x \text{ g } \sqrt{v - s} \infty 0.$$

$$x^6, p x^i, *, r x^3, *, *, v \infty \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{g } x + \sqrt{C. \frac{v}{t}} \infty 0,$$

$$\text{g } x + \frac{v}{ppr} \infty 0.$$

$$x^6, *, q x^4, *, s x x, *, v \infty \quad \text{per } x \text{ g } \sqrt{-q} \infty 0, \text{g } x \text{ g } \sqrt{-\frac{v}{t}} \infty 0.$$

$$x^6, *, *, r x^3, *, t x, v \infty \quad \text{per } x + \frac{v}{t} \infty 0, \text{g } x + \sqrt{C.r} \infty 0.$$

$$x^6, p x^i, *, *, s x x, *, v \infty \quad \text{per } x + p \infty 0, \text{g } x \text{ g } \sqrt{-\frac{v}{t}} \infty 0.$$

x⁶,

$$x^6, *, q x^4, *, *, t x, v \infty 0 \text{ per } x + \frac{v}{t} \infty 0, \text{ } \mathcal{C} x \text{ } \mathcal{R} \sqrt{-q} \infty 0.$$

$$x^6, p x^4, *, *, *, t x, v \infty 0 \text{ per } x + p \infty 0, \text{ } \mathcal{C} x + \frac{v}{t} \infty 0.$$

2^a Pars.

Si aliqua æquatio, 6 aut pauciores dimensiones habens, produci possit ex multiplicatione duarum aliarum, quarum altera sit duarum vel plurium dimensionum, ac duorum tantum terminorum; erit ejus Formula aliqua ex sequentibus, & poterit dividi per unamquamque æquationem sibi adjunctam.

1^{mo}. Per $xx \text{ } \mathcal{R} \text{ quantitate aliquâ cognitâ } \infty 0.$

$$x^3, p x x, q x, r \infty 0 \text{ per } xx + q \infty 0, (\mathcal{C} x + p \infty 0.)$$

$$x^4, p x^3, q x x, r x, s \infty 0 \text{ per } xx + \frac{r}{p} \infty 0, \mathcal{C} xx + \frac{1}{2} q \text{ } \mathcal{R} \sqrt{\frac{1}{4} q q - s} \infty 0.$$

$$x^4, p x^3, *, r x, s \infty 0 \text{ per } xx + \frac{r}{p} \infty 0, \mathcal{C} xx \text{ } \mathcal{R} \sqrt{-s} \infty 0.$$

$$x^4, *, q x x, *, s \infty 0 \text{ per } xx + \frac{1}{2} q + \sqrt{\frac{1}{4} q q - s} \infty 0, \mathcal{C} xx + \frac{1}{2} q - \sqrt{\frac{1}{4} q q - s} \infty 0.$$

$$x^4, *, *, *, s \infty 0 \text{ per } xx + \sqrt{-s} \infty 0, \mathcal{C} xx - \sqrt{-s} \infty 0.$$

$$x^5, p x^4, q x^3, r x x, s x, t \infty 0 \text{ per } xx + \frac{1}{2} q \text{ } \mathcal{R} \sqrt{\frac{1}{4} q q - s} \infty 0, \mathcal{C} xx + \frac{r}{2p} \text{ } \mathcal{R} \sqrt{\frac{rr}{4pp} - \frac{1}{p}} \infty 0.$$

$$x^5, p x^4, q x^3, r x x, *, t \infty 0 \text{ per } xx + q \infty 0, \mathcal{C} xx + \frac{r}{2p} \text{ } \mathcal{R} \sqrt{\frac{rr}{4pp} - \frac{1}{p}} \infty 0.$$

$$x^5, p x^4, q x^3, *, *, t \infty 0 \text{ per } xx + q \infty 0, \mathcal{C} xx \text{ } \mathcal{R} \sqrt{-\frac{1}{p}} \infty 0.$$

$$x^5, *, q x^3, r x x, *, t \infty 0 \text{ per } xx + q \infty 0, \mathcal{C} xx + \frac{1}{v} \infty 0.$$

$$x^5, *, *, r x x, s x, t \infty 0 \text{ per } xx + \frac{1}{r} \infty 0, \mathcal{C} xx \text{ } \mathcal{R} \sqrt{-s} \infty 0.$$

K k k 2

x⁵,

$$x^i, *, q x^i, r x x, s x, t \infty \circ \text{ per } x x + \frac{t}{r} \infty \circ, \text{ } \mathcal{C} x x + \frac{1}{2} q \mathcal{C}$$

$$x^i, p x^i, *, *, s x, t \infty \circ \text{ per } x x \mathcal{C} \sqrt{\frac{1}{2} q q - s} \infty \circ, \text{ } \mathcal{C} x x \mathcal{C} \sqrt{-\frac{t}{p}} \infty \circ.$$

$$x^i, p x^i, *, r x x, s x, t \infty \circ \text{ per } x x \mathcal{C} \sqrt{-s} \infty \circ, \text{ } \mathcal{C} x x + \frac{r}{2p} \mathcal{C} \sqrt{\frac{rr}{4pp} - \frac{t}{p}} \infty \circ.$$

$$x^i, p x^i, q x^i, *, s x, t \infty \circ \text{ per } x x \mathcal{C} \sqrt{-\frac{t}{p}} \infty \circ, \text{ } \mathcal{C} x x + \frac{1}{2} q \mathcal{C} \sqrt{\frac{1}{2} q q - s} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, q x^i, r x^i, s x x, t x, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{r}{2p} \mathcal{C} \sqrt{\frac{rr}{4pp} - \frac{t}{p}} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, *, r x^i, s x x, t x, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{r}{2p} \mathcal{C} \sqrt{\frac{rr}{4pp} - \frac{t}{p}} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, q x^i, r x^i, *, t x, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{r}{2p} \mathcal{C} \sqrt{\frac{rr}{4pp} - \frac{t}{p}} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, *, r x^i, *, t x, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{r}{2p} \mathcal{C} \sqrt{\frac{rr}{4pp} - \frac{t}{p}} \infty \circ, \text{ } \mathcal{C} x x + \sqrt{C.v} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, *, r x^i, s x x, *, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{r}{p} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, q x^i, r x^i, *, *, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{r}{p} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, q x^i, r x^i, s x x, *, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{r}{p} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, *, r x^i, *, *, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{r}{p} \infty \circ, \text{ } \mathcal{C} x x + \sqrt{C.v} \infty \circ.$$

$$x^6, *, q x^i, r x^i, s x x, t x, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{t}{r} \infty \circ.$$

$$x^6, *, *, r x^i, s x x, t x, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{t}{r} \infty \circ.$$

$$x^6, *, q x^i, r x^i, *, t x, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{t}{r} \infty \circ.$$

$$x^6, *, *, r x^i, *, t x, v \infty \circ \text{ per } x x + \frac{t}{r} \infty \circ, \text{ } \mathcal{C} x x + \sqrt{C.v} \infty \circ.$$

$$x^6, p x^i, q x^i, *, s x x, t x, v \infty \circ \text{ per } x x \mathcal{C} \sqrt{-\frac{t}{p}} \infty \circ.$$

x⁵,

$$x^6, p x^5, q x^4, *, *, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x x \text{ } \& \sqrt{-\frac{t}{p}} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, *, *, s x x, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x x \text{ } \& \sqrt{-\frac{t}{p}} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, *, *, *, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x x \text{ } \& \sqrt{-\frac{t}{p}} \infty 0, \text{ } \& x x + \sqrt{C. v} \infty 0.$$

$$x^6, *, q x^4, *, s x x, *, v \infty 0 \quad \text{per } x x + y \infty 0, \text{ existente } y^3 - q y y + s y - v \infty 0.$$

$$x^6, *, *, *, s x x, *, v \infty 0 \quad \text{per } x x + y \infty 0, \text{ existente } y^3 x + s y - v \infty 0.$$

$$x^6, *, q x^4, *, *, *, v \infty 0 \quad \text{per } x x + y \infty 0, \text{ existente } y^3 - q y y^* - v \infty 0.$$

$$x^6, *, *, *, *, *, v \infty 0 \quad \text{per } x x + \sqrt{C. v} \infty 0.$$

2^{da}. Per x^3 & quantitate aliquâ cognitâ $\infty 0$.

$$x^4, p x^3, *, r x, s \infty 0 \quad \text{per } x^3 + r \infty 0, \text{ } \& x^3 + \frac{s}{p} \infty 0 (\text{ } \& x + p \infty 0)$$

$$x^5, p x^4, q x^3, r x x, s x, t \infty 0 \quad \text{per } x^3 + r \infty 0, x^3 + \frac{s}{p} \infty 0, \text{ } \& x^3 + \frac{t}{q} \infty 0.$$

$$x^5, *, q x^3, r x x, *, s \infty 0 \quad \text{per } x^3 + r \infty 0, \text{ } \& x^3 + \frac{s}{q} \infty 0, \\ (\text{ } \& x x + q \infty 0)$$

$$x^6, p x^5, q x^4, r x^3, s x x, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x^3 + \frac{s}{p} \infty 0, x^3 + \frac{t}{q} \infty 0, \\ \text{ } \& x^3 + \frac{1}{2} r \text{ } \& \sqrt{\frac{1}{4} r r - v} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, q x^4, *, s x x, t x, v \infty 0 \quad \text{per } x^3 + \frac{s}{p} \infty 0, x^3 + \frac{t}{q} \infty 0, \\ \text{ } \& x^3 \text{ } \& \sqrt{-v} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, *, *, s x x, *, v \infty 0 \quad \text{per } x^3 + \frac{s}{p} \infty 0, \text{ } \& x^3 \text{ } \& \sqrt{-v} \infty 0.$$

$$x^6, p x^5, *, r x^3, s x x, *, v \infty 0 \quad \text{per } x^3 + \frac{s}{p} \infty 0, \text{ } \& x^3 + \frac{1}{2} r \\ \text{ } \& \sqrt{\frac{1}{4} r r - v} \infty 0.$$

Kkk 3

$x^6,$

$$x^6, *, q x^4, *, *, t x, v \infty \quad \text{per } x^3 + \frac{t}{q} \infty \infty, \mathfrak{E} x^3 \mathfrak{E} \sqrt{-v \infty \infty}.$$

$$x^6, *, q x^4, r x^3, *, t x, v \infty \quad \text{per } x^3 + \frac{r}{q} \infty \infty, \mathfrak{E} x^3 + \frac{t}{q} r \mathfrak{E} \\ \sqrt{\frac{1}{4} r r - v \infty \infty}.$$

$$x^6, *, *, r x^3, *, *, v \infty \quad \text{per } x^3 + \frac{1}{2} r + \sqrt{\frac{1}{4} r r - v \infty \infty}, \\ \mathfrak{E} x^3 + \frac{1}{2} r - \sqrt{\frac{1}{4} r r - v \infty \infty}.$$

$$x^6, *, *, *, *, *, v \infty \quad \text{per } x^3 + \sqrt{-v \infty \infty}, \mathfrak{E} x^3 - \sqrt{-v \infty \infty}.$$

3^{to}. Per x^4 \mathfrak{E} quantitate aliquâ cognitâ $\infty \infty$.

$$x^5, p x^4, *, *, t x, t \infty \infty \quad \text{per } x^4 + t \infty \infty, \mathfrak{E} x^4 + \frac{t}{p} \infty \infty, \\ (\mathfrak{E} x + p \infty \infty.)$$

$$x^6, p x^4, q x^4, *, t x x, t x, v \infty \quad \text{per } x^4 + t \infty \infty, x^4 + \frac{t}{p} \mathfrak{E} x^4 \\ + \frac{v}{q} \infty \infty.$$

$$x^6, *, q x^4, *, t x x, *, v \infty \quad \text{per } x^4 + t \infty \infty, \mathfrak{E} x^4 + \frac{v}{q} \infty \infty \\ (\mathfrak{E} x x + q \infty \infty.)$$

4^{to}. Per x^5 \mathfrak{E} quantitate aliquâ cognitâ $\infty \infty$.

$$x^6, p x^5, *, *, *, t x, v \infty \quad \text{per } x^5 + t \infty \infty, \mathfrak{E} x^5 + \frac{v}{p} \infty \infty, \\ (\mathfrak{E} x + p \infty \infty.)$$

3^{ta} Pars.

Si aliqua æquatio 5 dimensionum produci possit ex multiplicatione duarum aliarum, quarum altera habeat duas dimensiones, & nullum terminum $\infty \infty$; altera verò aliquem terminum $\infty \infty$; erit ejus Formula aliqua ex sequentibus, & poterit dividi vel per unamquamque æquationem sibi adjunctam, vel per aliquam earum.

Per unamquamque, ubi vocula \mathfrak{E} ; per aliquam, ubi vel invenitur: ut antea.

Quan-

Quantitatem cognitam 2^{di} termini æquationum sequentium
 quadratarum, adfectam suis signis + & —, brevitatis cau-
 sâ, vocabo y, & ultimum terminum z.

$$x^4, p x^4, q x^3, r x x, s x, t \infty 0 \quad \text{per } x x + p x + \frac{1}{2} q - \frac{r}{2 p} \sqrt{\frac{1}{2} q - \frac{r}{2 p} \square^t + \frac{t}{p} \infty 0,}$$

$$\text{vel per } x x, + \frac{1}{2} p + \frac{t}{2 f} \sqrt{\frac{1}{2} p + \frac{t}{2 f} \square^t - q}$$

$$\text{in } x, + \frac{y^t}{s} \infty 0,$$

$$\text{vel per } x^3 + r \infty 0.$$

$$x^4, p x^4, *, r x x, s x, t \infty 0 \quad \text{per } x x + p x - \frac{r}{2 p} \sqrt{\frac{r r}{4 p p} + \frac{t}{p} \infty 0,}$$

$$\text{vel per } x x, + p + \frac{t}{s} \text{ in } x, + \frac{y^t}{s} \infty 0.$$

$$x^4, p x^4, q x^3, *, s x, t \infty 0 \quad \text{per } x x + p x + \frac{1}{2} q \sqrt{\frac{1}{2} q q + \frac{t}{p} \infty 0,}$$

$$\text{vel per } x x + \frac{3}{2} x + \frac{1}{2} q \sqrt{\frac{1}{2} q q + t \infty 0.}$$

$$x^4, p x^4, *, *, s x, t \infty 0 \quad \text{per } x x + p x \sqrt{\frac{t}{p} \infty 0,}$$

$$\text{vel per utramque } \begin{cases} x x, + p + \frac{t}{s} \text{ in } x, + \frac{y^t}{s} \infty 0, \\ \text{harum duarum } \begin{cases} x x, \sqrt{\frac{t}{s}} \sqrt{s} \text{ in } x, \sqrt{s} \infty 0. \end{cases} \end{cases}$$

$$x^4, p x^4, q x^3, r x x, *, t \infty 0 \quad \text{per } x x + p x + \frac{1}{2} q - \frac{r}{2 p} \sqrt{\frac{1}{2} q - \frac{r}{2 p} \square^t + \frac{t}{p} \infty 0,}$$

$$\text{per } x x + p x + \frac{t}{2 r} \sqrt{\frac{r r}{4 r r} - \frac{p p t}{r} \infty 0.}$$

$$x^4, p x^4, *, r x x, *, t \infty 0 \quad \text{per } x x + p x + \frac{1}{2} p p \sqrt{\frac{1}{2} p p + p r \infty 0,}$$

$$\text{per } x x + p x + \sqrt{C. p t \infty 0,}$$

$$\text{per } x x + p x - \frac{r}{2 p} \sqrt{\frac{r r}{4 p p} + \frac{t}{p} \infty 0.}$$

$$x^4, p x^4, q x^3, *, *, t \infty 0 \quad \text{per } x x + p x + p p \infty 0,$$

$$\text{per } x x + p x + \frac{1}{2} q \sqrt{\frac{1}{2} q q + \frac{t}{p} \infty 0.}$$

$$x^4, p x^4, *, *, *, t \infty 0 \quad \text{per } x x + p x + p p \infty 0,$$

$$\text{per } x x + p x \sqrt{\frac{t}{p} \infty 0.}$$

$$x^4, *, q x^3, r x x, s x, t \infty 0 \quad \text{per } x x, + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{11}{4 f} - q} \text{ in } x, + \frac{y^t}{s} \infty 0.$$

x⁴,

$$x^6, *, *, sxx, sx, t \infty 0 \quad \text{per } xx + \frac{t}{s}x + \frac{tt}{ss} \infty 0.$$

$$x^6, *, q, x^3, *, sxx, t \infty 0 \quad \text{per } xx + \frac{zs}{t}x + \frac{1}{2}q\sqrt{\frac{1}{2}qq + s} \infty 0,$$

$$\mathcal{E} \text{ per } xx, \sqrt{\frac{t}{z}} \text{ in } x, + \frac{1}{2}q\sqrt{\frac{1}{2}qq + s} \infty 0,$$

$$\mathcal{E} \text{ per } xx, + \frac{1}{2f}\sqrt{\frac{tt}{4ff} - q} \text{ in } x, + \frac{7}{2}t \infty 0,$$

$$\mathcal{E} \text{ per } xx + x\sqrt{C. \frac{ss}{t}} + \sqrt{C. \frac{tt}{s}} \infty 0.$$

$$x^6, *, *, *, sx, t \infty 0 \quad \text{per } xx, \sqrt{\frac{s}{t}} \sqrt{s} \text{ in } x, \sqrt{s} \infty 0,$$

$$\mathcal{E} \text{ per } xx, \sqrt{\sqrt{s}} \text{ in } x, \sqrt{s} \infty 0,$$

$$\mathcal{E} \text{ per } xx + \frac{t}{s}x + \frac{tt}{ss} \infty 0,$$

$$\mathcal{E} \text{ per } xx, + \sqrt{C. \frac{ss}{t}} \text{ in } x, + \sqrt{C. \frac{tt}{s}} \infty 0,$$

$$\mathcal{E} \text{ per } xx, + \sqrt{\beta. t} \text{ in } x, + \frac{tt}{ss} \infty 0.$$

Ad 1^{am} & 3^{iam} Partem annotandum venit, si non constet an Proposita æquatio ex duabus aliis, requisitas conditiones habentibus, produci possit, quòd id facillimo negotio ut plurimum experiri liceat: quotiescunque enim divisores, qui per voculam \mathcal{E} capulantur, inter se non secundum omnes terminos conveniant, concludendum est, Propositam æquationem ita produci non posse, adeò ut eo in casu divisio irrita foret. Exempli gratiâ, si Proponatur æquatio $x^6, *, *, *, -xx\sqrt{3} - 2\frac{1}{2}x + 10\frac{1}{2} \infty 0$, quæ hujus est formulæ $x^6, *, *, *, sxx, sx, v \infty 0$, ea divisibilis erit secundum 1^{am} Partem, per $x + \frac{v}{s} \infty 0$, & per $x\sqrt{\sqrt{-s}} \infty 0$; & per $x\sqrt{\frac{t}{s}}\sqrt{-s} \infty 0$; & per $x - \sqrt{C. \frac{ss}{v}} \infty 0$; & per $x - \frac{ss}{v^2} \infty 0$, si produci possit *ex multiplicatione duarum aliarum*,

quarum altera sit unius dimensionis, altera verò uno pluribusve terminis careat. Ut autem sciatur, utrum hoc fieri queat, non opus est id divisione per aliquem ex divisoribus explorare, cum hîc duo divisores reperiantur inter se non convenientes: nimirum,

$x + \frac{v}{s} \infty 0$, & $x\sqrt{\sqrt{-s}} \infty 0$, nam $\frac{v}{s}$ rationalem, & $\sqrt{\sqrt{-s}}$ irrationalẽ numerum designat. Atque cum indivisibilitas etiam sæpe

sæpe uno intuitu ex variis signis constet, ut, ex. gr. si loco $\sqrt{3}$ habuissimus $+\sqrt{3}$, quo casu \sqrt{Q} ex $-s$ extrahi non potuisset; Poterimus interdum operosas aliquot multiplicationes & divisiones, quæ alioquin essent faciendæ, insuper habere. Majoris perspicuitatis gratiâ alterum exemplum addam. Divisores æquationis $x^5, *, *, *, s, x, t \infty 0$ sunt, secundum 3^{iam} Partem, $xx \cdot \sqrt[5]{s}$ in x , $\sqrt[5]{s} \infty 0$; $xx \cdot \sqrt[5]{s}$ in x , $\sqrt[5]{s} \infty 0$; $xx + \frac{t}{s} x + \frac{tt}{ss} \infty 0$; $xx + \sqrt[5]{C} \cdot \frac{ss}{t}$ in $x + \sqrt[5]{C} \cdot \frac{tt}{s} \infty 0$; & $xx + \sqrt[5]{\beta} \cdot t$ in $x + \frac{tt}{ss} \infty 0$: si jam comperiatur $\sqrt[5]{\frac{s}{t}}$ non esse $\infty \sqrt[5]{s}$, vel $\infty \frac{t}{s}$ vel $\infty \sqrt[5]{C} \cdot \frac{ss}{t}$, vel $\infty \sqrt[5]{\beta} \cdot t$, quæ sunt quantitates cognitæ 2^{di} termini; vel ultimos terminos $\sqrt[5]{s}$, & $+\frac{tt}{ss}$, &c. non inter se convenire; indicio esset æquationem Propositam produci non posse ex multiplicatione duarum aliarum, quarum altera habet duas dimensiones, & nullum terminum $\infty 0$, altera verò aliquem terminum $\infty 0$.

4^a Pars.

Si æquatio aliqua 6 dimensionum produci possit ex multiplicatione duarum aliarum, quarum altera habeat duas dimensiones, & nullum terminum $\infty 0$; altera verò unum, pluresve terminos $\infty 0$; erit ea divisibilis per $xx + yx + z \infty 0$, cujus y & z valores per sequentes æquationes ac sequenti modo sunt inveniendi.

Æquationem Propositam, siue in ea aliquis terminus deficiat, siue non, sic designabo: $x^6 + p x^5 + q x^4 + r x^3 + s x x + t x + v \infty 0$; ubi p denotat quantitatem cognitam 2^{di} termini, vel 0, si is deficiat; q quantitatem cognitam 3^{iam} termini, vel 0, si is deficit; r 4^{ti} termini, &c.

$$A \quad z z - 2 q z + p p q \infty \quad z z - \frac{1}{p} z + 2 v \infty \quad y \infty p$$

$$\begin{array}{r} -p p \quad -r p \quad -f \\ + \frac{r}{p} \quad + f \quad + r p \\ \hline - \frac{1}{p} \quad - p p q \\ \hline 2 \quad \frac{r}{p} + p p \end{array}$$

$$B \quad y^3 - p y y + q y - r \infty \quad y y - \frac{q^2}{v} y + \frac{14}{v^2} \infty \quad z \infty \frac{y^2}{i}$$

$$\begin{array}{r} - \frac{2 v}{i} + \frac{p^2 y}{i} \quad - p + \frac{r^2}{v} \\ \hline + \frac{r 11}{v v} \\ - \frac{p f}{v} \\ \hline 2 \end{array}$$

$$C \quad y^4 - \frac{q}{p} y^3 + 3 y y - \frac{f}{p} y + \frac{1}{p} \infty \quad y^4 - \frac{1}{f} y^3 + p p y y - 2 p q y + q q \infty$$

$$\begin{array}{r} - 2 p + p p - 2 p q + q q \quad - 2 p + \frac{1}{f} \quad - \frac{1}{f} \quad - \frac{y q}{f} \\ \hline - \frac{q q}{p} - \frac{1}{p} \quad + 2 q + \frac{v p}{f} \\ + r \\ - \frac{1}{f} y^3 + \frac{1}{f} y y - \frac{1}{f} y - \frac{y q}{f} \infty \quad z \infty - p y + y y + q \\ + \frac{q}{p} - q \quad + \frac{y p}{f} - \frac{1}{p} \\ + \frac{f}{p} + \frac{y q}{p} \\ + \frac{q q}{p} \\ - r \end{array}$$

$$D \quad + q y^3 + f y - 1 \infty \quad + f y^4 - 1 y^3 + 2 q f y y - 1 q y + q q f \infty$$

$$\begin{array}{r} + q q + r q \quad - v q \\ z \infty y y + q \\ \begin{array}{ccc} e & f & g \\ y \infty p & y \infty p & y \infty \frac{1}{f} \\ z \infty q & z \infty q - \frac{r}{p} \infty \frac{y p}{i} & z \infty \frac{y^2}{f} \end{array} \end{array}$$

Qua-

Quando nulli termini in æquatione Propofita funt $\infty 0$,
illa dividi poterit per aliquam harum A, B, C, e, f, g.

Quando est $p \infty 0$... per aliquam harum B, D, g

q	—	—	—	A, B, C, f, g
r	—	—	—	A, B, C
f	—	—	—	A, B, C, e, f
t	—	—	—	A, C, e
p, q	—	—	—	B, D, g
p, r	—	—	—	B, D
p, f	—	—	—	B, D
p, t	—	—	—	D
q, r	—	—	—	A, B, C
q, f	—	—	—	A, B, C, f
q, t	—	—	—	A, C
r, f	—	—	—	A, B, C
r, t	—	—	—	A, C
f, t	—	—	—	A, C, e
p, q, r	—	—	—	B, D
p, q, f	—	—	—	B
p, r, f	—	—	—	B, D
p, r, t	—	—	—	D
q, r, f	—	—	—	A, B, C
q, r, t	—	—	—	A, C
q, f, t	—	—	—	A
r, f, t	—	—	—	A, C
p, q, r, f	—	—	—	B
p, q, f, t	—	erit $y^{***} + r y^{**} + v \infty 0$, & $z \infty y y$		
q, r, f, t	—	—	—	A
p, q, r, f, t	—	erit $y^{*****} + v \infty 0$, & $z \infty y y$.		

1. Pro A, vel B, vel C assumere licet, vel unam æquationum juxta positarum, quam libuerit, quærendo ejus tantum ope valorem ipsius y , vel z ; vel duas eandem quantitatem incognitam habentes, quærendoque, ut superius ostensum est, earum communem divisorem, qui, aut unius, aut plurium futurus est dimensionum. si unius, habebitur quæsitus valor ipsius y vel z ; si plurium, eundem ex hoc communi divisore investigare oportet.

2. Si primò per capitales sive majusculas A, B, C, D explorare velimus, reliquæ e, f, g, non sunt necessariae; sed non vice versâ.

Exempligratiâ, proponatur

$$x^6 + 2x^5 - 3x^4 + 7x^3 - 3xx - 13x - 5 \infty 0.$$

$\begin{matrix} p & q & r & f & t & v \end{matrix}$

Cum nullus terminus hîc deficiat, examinanda est æquatio per A, B, C, e, f, g. & quidem per omnes, si à minusculis g, f, e incipiamus, si autem à capitalibus, erunt minusculæ insuper habendæ. Incipiamus igitur à capitalibus, ac primùm ab A, pro qua itaque sumere licet æquationem $z - 2qz + ppq \infty 0$,

$$\begin{array}{r} -pp \quad -rp \\ + \frac{r}{p} \quad + f \\ \hline - \frac{t}{p} \\ \hline 2 \end{array}$$

vel $z - \frac{t}{p}z + 2v \infty 0$, vel utramque.

$$\begin{array}{r} -f \\ +rp \\ -ppq \\ \hline \frac{r}{p} + pp \end{array}$$

Si primam sumamus, obtinebitur pro ipsa (quoniam $p \infty z$, $q \infty -3$, $r \infty 7$, $f \infty -3$, $t \infty -13$, & $v \infty -5$) $2z + 5\frac{1}{2}z - 22\frac{1}{2} \infty 0$; sin alteram, obtinebitur $7\frac{1}{2}z + 35\frac{1}{2}z - 10 \infty 0$, quarum communis divisor est $z + 5 \infty 0$. Quoniam autem

$7 \infty p$

$y \infty p \infty 2$, dividendum est per $xx + yx + z \infty 000x + 2x - 500$, invenieturque pro quotiente $x^4 + 2xx + 3x + 100$. Et manifestum est, nos etiam alterutra tantum duarum illarum æquationum uti potuisse. Facilior itaque via eligenda erit: non enim semper illa per communem divisorem brevior est, neque semper longior; verum hanc habet prærogativam, quæ sanè non parva est, quòd inutiles radices abscondat. Quemadmodum sequenti exemplo clariùs patebit.

Esto æquatio Proposita $x^6 + 2x^4 + 3x^3 - 3xx - 5x - 100$. Quoniam hic p est $\infty 0$, reductio tentanda erit per B, D, g. Incipiendo à B, invenietur pro $1^{\text{ma}} y^3 - pyy + qy - r \infty 0$,

$$- \frac{2v}{1} + \frac{p}{1}$$

hæc æquatio $y^3 - 7y - 300$; & pro $2^{\text{da}} y - \frac{q}{v}y + \frac{r}{v} \infty 0$,

$$- p + \frac{r}{v}$$

$$+ \frac{r}{vv}$$

$$- \frac{r}{v^3}$$

2

hæc $yy + 230y - 30500$: est enim in hoc exemplo $q \infty - 2$, $r \infty 3$, $f \infty - 3$, $t \infty - 5$, & $v \infty - 1$. Vnde, querendo eorum communem divisorem, comperietur nullum dari, ac proinde divisionem per B fieri non posse. Hinc transeo ad D, ubi pro 1^{ma} æquatione $qy^3 + fy - 100$ invenio $-2y^3 + 1y - 100$,

$$+ 99 + 19$$

& pro 2^{da} $fy^4 - 1y^3 + 2qfyy - 1qy + qqf \infty 0$ invenio

$$- vq$$

$- 3y^4 + 5y^3 + 12yy - 10y - 1400$. Quarum æquationum divisor communis est $y + 100$; adeoque $200yy + q \infty - 1$; ita ut divisio sit facienda per $xx + yx + z \infty 000xx - 1x - 1$, eritque quotiens $x^4 + 1x^3 + 4x + 100$.

Vbi notandum, modum hunc querendi communem divisorem in altioribus præsertim æquationibus permagni esse usus, non autem tanti usus, cum æquationes, quarum divisor communis investigandus est, solummodo sunt 2 dimensionum, aut etiam trium, quoniam tum divisores faciles sunt inventu. Ut in

æquatione superiori $-2y^3 + 1y - 1 \infty 0$, ubi protinus appareat y esse $\infty - 1$, adeoque si ipsa dividatur per $y + 1 \infty 0$, obtinebitur $-2yy + 2y - 1 \infty 0$. Cujus radices quoniam sunt impossibiles, solum superest $y \infty - 1$; adeo ut divisio æquationis Propositæ tentanda sit per $xx - 1x - 1 \infty 0$.

Sic & si habeatur æquatio $x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 2x^3 + 2xx + 1x + 1 \infty 0$, comperietur ejus divisionem fieri posse beneficio æquationum juxta B, ubi pro una invenitur $2yy - 5y + 3 \infty 0$, & pro altera $y^3 - 4yy + 5y - 2 \infty 0$, & pro communi divisore $y - 1 \infty 0$.

Et quoniam z est $\infty \frac{y}{r} \infty 1$, erit $xx + yx + z \infty 0$, $xx + 1x + 1 \infty 0$. Per quam igitur si Proposita æquatio dividatur, fiet pro quotiente $x^4 + 1x^3 + 1xx^* + 1 \infty 0$.

Si autem detur æquatio $x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 1xx + 14x + 2 \infty 0$, in qua r est 0 , oportet ipsam examinare per A, B, & C. Incipiendo autem ab A, loco æquationis $zz - 2qz + ppq \infty 0$

$$\begin{array}{r} -pp \quad -rp \\ + \frac{r}{p} \quad + f \\ \hline - \frac{1}{p} \\ 2 \end{array}$$

invenitur $zz - 4z + 1 \infty 0$; & loco æquationis $zz - \frac{1}{p}z + 2v \infty 0$

$$\begin{array}{r} -f \\ +rp \\ -ppq \\ \hline \frac{r}{p} + pp \end{array}$$

invenitur eadem $zz - 4z + 1 \infty 0$. Ex qua, quia utriusque communis divisor est, radices invenire oportet, quæ sunt $z \infty 2 + \sqrt{3}$, & $z \infty 2 - \sqrt{3}$. Vnde cum y sit ∞p , hoc est, 2 , pro $xx + yx + z \infty 0$ obtinebuntur hæc duæ $xx + 2x + 2 + \sqrt{3} \infty 0$, & $xx + 2x + 2 - \sqrt{3} \infty 0$. Per quas igitur si Proposita æquatio divisa fuerit, comperietur ipsam produci posse multiplicatione harum trium $xx + 2x + 2 + \sqrt{3} \infty 0$, $xx + 2x + 2 - \sqrt{3} \infty 0$, & $xx - 2x + 2 \infty 0$.

5^a Pars.

5^a Pars.

Si æquatio aliqua 6 dimensionum produci possit multiplicatione duarum aliarum, quæ singulæ 3 dimensiones habeant, in quarum alterutra unus pluresve termini sint $\infty 0$; erit ipsa divisibilis vel per æquationem tantum 2 terminorum, juxta 2^{am} partem, vel per æquationem $x^3 + yxx + zx + w \infty 0$, in qua tantum alterutra vel y vel z est $\infty 0$; quarumque $y, z, \& w$ valores inveniuntur per sequentes æquationes.

Æquationem Propositam, sive in ea aliquis terminus deficiat, sive non, sic designabo: $x^6 + px^5 + qx^4 + rx^3 + sx^2 + tx + v \infty 0$; ubi p denotat quantitatem cognitam 2^{di} termini, vel 0, si is deficiat; q quantitatem cognitam 3^{ti} termini, vel 0, si is deficiat; r quarti termini, &c.

$$\begin{aligned} A \quad & 2z^3 - 3qzz - rpx - sq \infty 0 + qqzz + 4sqz - 4ff \infty 0 \quad w \infty \frac{+xz - qx}{p} \\ & + pp \quad + 2f + tp \quad + p^4 \quad - 3pqr - 4ppv \\ & \quad + qq \quad - 4f \quad - 2ppf + 4pf \\ & \quad + 2pr + 2ip \quad + sqq \\ & \quad - q^3 \quad - p^3q \quad y \infty 0. \\ & \quad - rp^3 \quad - sqpp \\ & \quad + qqpp + ip^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B \quad & y^4 - \frac{q^2}{v}y^3 + \frac{pq^2}{v}yy - \frac{f^2}{v}y - qq \infty 0 \quad y^4 - 2py^3 + qyy - ry + pr \infty 0 \\ & - p \quad + qp - \frac{f^2}{v} \quad + \frac{2v}{t} \quad + pp - pq - f \\ & \quad - \frac{qq^2}{v} + \frac{rfg}{v} \quad - \frac{3pv}{t} + \frac{2qv}{t} - \frac{pqv}{t} \\ & \quad \quad \quad + \frac{ppv}{t} \\ & \quad \quad \quad w \infty \frac{t}{q - py + yy} \\ & \quad \quad \quad z \infty 0. \end{aligned}$$

$$C \quad 2z - qz + f \infty 0 \quad ww - rw + v \infty 0 \quad y \infty 0.$$

$$D \quad yy - py + q \infty 0 \quad ww - rw + v \infty 0 \quad z \infty 0.$$

$$e \quad z \infty q \quad w \infty \frac{f}{p} \quad y \infty 0.$$

$$f \quad y \infty p \quad w \infty \frac{t}{q} \quad z \infty 0.$$

Quan-

Quando nulli termini in æquatione Proposita sunt
 $\propto 0$, illa dividi poterit per aliquam harum A, B, e, f.

Quando est $p \propto 0$... per aliquam harum C, B

q	—	—	—	A, B
r	—	—	—	A, B, e, f.
f	—	—	—	A, B
t	—	—	—	A, D
p, q	—	—	—	C, B
p, r	—	—	—	C, B
p, f	—	—	—	B
p, t	—	—	—	C, D
q, r	—	—	—	A, B
q, f	—	—	—	A, B
q, t	—	—	—	A
r, f	—	—	—	A, B
r, t	—	—	—	A, D
f, t	—	—	—	A, D
p, q, r	—	—	—	C, B
p, q, f	—	—	—	B
p, q, t	—	—	—	C
p, r, f	—	—	—	B
p, r, t	—	—	—	C, D
p, f, t	—	—	—	D
q, r, f	—	—	—	A, B
q, r, t	—	—	—	A
q, f, t	—	—	—	A
r, f, t	—	—	—	A, D
p, q, r, f	—	—	—	B
q, r, f, t	—	—	—	A

1. Pro A vel B assumere licet vel unam æquationum
 juxta positarum, quam libuerit, quærendo ejus tan-
 tum ope valorem ipsius y , vel z ; vel duas, eandem in-
 cogni-

cognitam quantitatem habentes, quærendoque per earum communem divisorem valores ipsius y vel z eodem modo quo in Parte 4^{ta} dictum est.

2. Si primò per capitales A, B, C, D, examen fiat, tum examen per reliquas e & f superfluum habendum est, sed non vice versà.

Exempli gratiâ, proponatur hæc æquatio

$$x^6 + 1x^5 + 4x^4 + 8x^3 + 5xx + 11x + 600.$$

Quoniam nulli termini defunt, Reductio erit tentanda per A, B, e, f; incipiendoque à minusculis, ac primùm ab e, habebitur $z \infty q \infty 4$, & $w \infty \frac{f}{p} \infty 5$, adeoque præ $x^3 + yxx + zx + w \infty 0$, fiet $x^3 + 4x + 5 \infty 0$. Cum verò Proposita æquatio per hanc dividi nequeat, transeo ad f, obtineoque $y \infty p \infty 1$;

$w \infty \frac{f}{q} \infty \frac{1}{4}$; $z \infty 0$; & in locum $x^3 + yxx + zx + w \infty 0$ obtineo $x^3 + 1xx + \frac{1}{4} \infty 0$. Et cum Proposita per hanc quoque non divisibilis existat, transeo ad A, & pro $2z^3 - 3qzz - rpx - sq \infty 0$

$$+ pp + 2f + p$$

obtineo $2z^3 - 11zz + 18z - 9 \infty 0$, cujus radices sunt $+3$, $+1$, & $+1\frac{1}{2}$. Quia autem omnes hæc radices sunt rationales, ac æquatio Proposita fractis numeris caret, non poterit nobis hæc ultima radix inservire. Vnde explorandum tantùm restat per $z \infty 3$, & $z \infty 1$. Sumendo autem $z \infty 1$, reperitur divisionem fieri non posse, ac idcirco si sumatur $z \infty 3$, fiet $w \infty \frac{f+3z-qz}{p} \infty 2$.

Quoniam verò y est $\infty 0$, pro $x^3 + yxx + zx + w \infty 0$ obtinebitur $x^3 + 3x + 2 \infty 0$, per quam si divisio Propositæ tentetur, comperietur ipsam fieri posse, atque oriri $x^3 + 1xx + 1x + 3 \infty 0$. Sed loco 1^{mæ} æquationis juxta A sumere potuissimus 2^{dæ}, unâ dimensionem depressoire, pro qua obtinuissimus $13zz - 60z + 63 \infty 0$. Quæ unâ tantùm radicem rationalem absolutam admittit, quæ, ut supra, est $+3$.

Et notandum, quòd, inventis duabus æquationibus, (quæ semper, si per communem divisorem Quæsitum obtinere velimus, inveniri debent;) quæri potest radix alterutrius æquationis, si nempe ea facilis sit inventu, atque explorari, num & altera æqua-

M m m

tio

tio dictam radicem admittat: Quo sæpe nonnihil laboris abscindi potest.

Priusquam huic XI Regulæ finem imponam, adjungam, quòd, eodem modo, quo hæ Regulæ inventæ sunt, & reliquæ altiorum æquationum inveniri possint; uti & multæ, ne dicam infinitæ aliz ad æquationes 6, & pauciorum dimensionum, quarum aliquot ex facilioribus indicare volui, prætermittens nonnullas, non quidem admodum difficiles, sed quæ determinationem aliquam involvebant. Vt in 1^{ma} Parte, ubi æquationi $x^6, p x^5, q x^4, * f x x, t x, v \infty$, loco divisoris $x + \frac{1}{2} p \sqrt{\frac{1}{2} p p - q \infty}$, adjungere potuissim divisorem $x - \frac{v - q f}{p f - 1} \infty$: quem, cum determinationem invol-

vat, (siquidem $x + 3 \infty$, divisor æquationis $x^6 + 5 x^5 + 6 x^4 + 5 x x + 25 x + 30 \infty$, per illum inveniri nequit:) omitendum duxi, præferendo ei alterum $x + \frac{1}{2} p \sqrt{\frac{1}{2} p p - q \infty}$; qui determinationi nulli obnoxius est.

Denique, usus hujus XI Regulæ se longè lateque extendit, quod nemo facile negaverit, qui modò viderit, non necesse esse, vel fractiones, vel cognitæ quantitates surdas priùs ex æquatione tolli; & quot modis una eademque æquatio, præsertim valde composita, & multarum dimensionum, ex multiplicatione duarum aliarum produci queat; tumque inter omnes illas ex quibus produci possit, tantùm unam requiri, in qua unus pluresve termini deficient, ut Reductio per has Regulas inveniat.

SEQUENTES 12, 13, 14, 15 REGVLÆ SE EXTENDUNT AD ÆQUATIONES, IN QUIBUS NEC SIGNA RADICALIA, NEC LITERALES FRACTIONES INVENIUNTUR.

XII. REGULA.

Si in æquatione Proposita reperiatur litera cognita, *quæ in ultimo Terminò non contineatur*; si illa non nisi semel in æquatione extet, vel semel tantùm reperiatur secundùm eundem dimensionum numerum, (ut in Æquatione $x - 2 a x^3 + a a x x - 2 a b b x + a a b b \infty$,

$$\begin{array}{r} - 2 c \quad + b b \quad - 2 a c c \\ \quad \quad + 4 a c \\ \quad \quad - d d \end{array}$$

in

in qua d semel duntaxat reperitur, duas habens dimensiones) æquatio semper indivisibilis erit per x , aut xx , &c. + vel — quantitate quâvis cognita atque rationali.

XIII. REGULA.

Si pluries in æquatione Proposita reperiatur litera cognita, *que in ultimo termino non contineatur*; si illa ubique, eodem signo + vel — sit adfecta, ac per incognitam quantitatem, impares ubique aut ubique pares dimensiones habentem, multiplicata: æquatio illa semper indivisibilis erit per x + vel —, vel per xx , x^3 , &c. — quantitate quâvis cognita atque rationali. ut hæc Æquatio $x^4 + 4cx^3 - ddx^2 + 4bbcx + b^2 \propto 0$, in
 $-2bbd$

quâ c bis tantum reperitur adfecta signo +, ac multiplicata per x unius & trium dimensionum. aut hæc $x^6 - ax^5 + cfx^4 - c^3x^3 - c^4xx - ddcx + c^3d^3 \propto 0$,
 $+b - dd - add + ddf + d^3bb$

ubi a ter invenitur adfecta ubique signo —; aut b bis signo +; ac ducta utraque in x , ubique habentem dimensiones impares: aut in quâ etiam f bis reperitur adfecta signo +, ac ducta in x , ubique pares dimensiones habentem.

XIV. REGULA.

Si in æquatione Proposita reperiatur litera cognita, *que in nullo alio quàm in ultimo termino contineatur*; si ejus dimensionum numerus sit minor numero dimensionum incognitæ quantitatis, ad summum considerato, (ut in hac $x^6 - bbx^4 + b^3c^2xx + bcd^4 \propto 0$, in qua
 $-bbcc + 2bd^5$

Mmm 2

d tan-

d tantum in ultimo termino continetur, habens ad summum 5, & x plures, nimirum 6 dimensiones) certum est illam æquationem per $x +$ vel $-$ quantitate quavis rationali atque cognita esse indivisibilem; Si ejus dimensionum numerus sit minor semisse numeri dimensionum incognitæ quantitatis, ad summum considerati, (ut in eodem exemplo, si loco ultimi termini $b c d^4 + 2 b d^5$ ponatur $b c^3 d d + 2 b^5 d$) certum est illam æquationem per $x x +$ vel $-$ quantitate quavis rationali atque cognita indivisibilem existere. Si ejus dimensionum numerus sit minor triente numeri dimensionum incognitæ quantitatis, ad summum considerati, certum est illam æquationem per $x^3 +$ vel $-$ &c. non posse dividi. atque ita porro in infinitum.

XV. R E G V L A.

Si in æquatione Proposita litera cognita reperitur, quæ in ultimo termino non continetur, atque ea divisibilis sit per $x, x x, x^3$, &c. + vel $-$ aliquâ quantitate rationali & cognita; facile erit beneficio alterius æquationis dictum divisorem invenire.

Vt in hac æquatione

$$x^5 - f x^4 + b f x^3 - 16 b c d x x + \frac{1}{2} b b c f x - 8 c c d b b \infty 0 \\ + \frac{1}{2} b c - \frac{1}{2} b c f + \frac{1}{2} b b c c$$

in quâ in ultimo termino non continetur, opus tantum est, ut omnes quantitates, in quibus æquæ multas habet dimensiones nihilo æquales ponantur, atque porro investigetur utriusque, inventæ scilicet atque Propositæ æquationis, communis divisor. Quocirca polito $-f x^4 + b f x^3 - \frac{1}{2} b c f x x + \frac{1}{2} b b c f x \infty 0$, seu $-x^3 + b x x - \frac{1}{2} b c x + \frac{1}{2} b b c \infty 0$, invenitur, secundum Methodum ante descriptam, pro earum communi divisore $x x + \frac{1}{2} b c \infty 0$.

Sic

Sic etiam si proponatur hæc æquatio

$$\begin{array}{r} x^4 - ax^3 + aaxx + c^3x - bc^3 \infty 0 \text{ in qua } a \text{ in ultimo ter-} \\ -b \quad +ab \quad -baa +c^4 \\ +c \quad -ac \quad +aac \end{array}$$

mino non continetur; posito $-ax^3 + abxx \infty 0$, erit $x - b + c \infty 0$.
 $-ac$

Divisio itaque tentanda est per $x - b + c \infty 0$; quoniam nullus præter hunc communis divisor haberi potest. Eundem Divisorem obtinuissimus si quantitates omnes ubi a est duarum dimensionum posuissimus $\infty 0$. Notandum est in his 12, 13, 14 & 15 Regulis, non opus esse, ut literales Fractiones semper prius ex æquationibus auferantur: Nam si contingat, his Fractionibus sublati, literam, de qua ibi agitur, nihilominus tamen in ultimo Termino tantum inveniri, quemadmodum in Regula 14 requiritur: vel illâ ablatione factâ in ultimo Termino non inveniri, quod in tribus aliis requiritur; ablatio talium Fractionum necessaria non est.

SEQUENTES 16, 17, 18, 19 ET 20 REGVLÆ SE
EXTENDVNT AD ÆQVATIONES, VBI NEC
SIGNA RADICALIA, NEC FRACTIONES LI-
TERALES VEL NUMERALES INVENIVN-
TVR.

Hucusque perinde est, an Propositæ æquationis omnia membra, sive terminorum partes separatæ per signum $+$ vel $-$ junctæ eundem habeant dimensionum numerum vel secus: In his sequentibus verò 16, 17, 18, 19, & 20 Regulis considerabo, brevitatis causâ, ejusmodi tantum æquationes, quarum omnia Membra habent eundem numerum dimensionum; potest enim omnis æquatio, hanc conditionem non habens, facili in talem permutari, ut cuique notum est.

Quomodo omnia radicalia signa ex æquatione tolli possint, jam antea ostendi. Quomodo verò omnes Fractiones tolli queant, nihil difficultatis habet, & satis à D^{no} des Cartes monstratum est in Fractionibus numeralibus, quod etiam eodem modo in literalibus locum habet. Sed cum in his Regulis sequentibus divisores rationales ultimi Terminii necessariò sciri debeant, præmittam

Modum inveniendi omnes rationales Divisores ultimi Termini surdis & Fractionibus carentis.

Ultimus Terminus æquationis Propositæ aut ex *uno* aut ex *pluribus Membris* seu quantitibus, per + & - junctis constabit. Si *unius tantum Membri* sit, notum est quâ ratione ipsius divisores inveniantur. Quod si autem ex *pluribus Membris* constiterit, sæpenumero difficile est eos omnes reperire. Hinc ad eos inveniendos, confidero seorsim ultimum Terminum æquationis Propositæ, supponendo ipsum $\infty 0$, atque pro lubitu eligo aliquam ex literis, quam pro incognita quantitate hujus fictæ æquationis habeo, cujus respectu fictam æquationem illam in ordinem redigo.

Exempli gratiâ, ex ultimo Termino hujus æquationis,

$$\begin{array}{r} x^4 - 4ax^3 + 2ccxx - 4accx + c^4 \quad \infty 0 \\ + 7aa \quad - 4aac \quad - 4a^4 \\ + 2ac \quad - 6a^3 \quad + 8a^1c \\ \quad \quad \quad + 2ac^1 \\ \quad \quad \quad + 3aacc \end{array}$$

sumendo literam c pro incognita quantitate, invenio æquationem hanc $c^4 + 2ac^1 + 3aacc + 8a^1c - 4a^4 \infty 0$.

Deinde inquirò per antecedentes vel sequentes Regulas utrum hæc Ficta per aliam rationalem dividi possit; Si enim hoc fieri nequeat, manifestum est ultimum Terminum æquationis Propositæ nullos quoque divisores rationales admittere (nisi unitatem atque ipsum ultimum Terminum integrum inter divisores numerare velimus; sed hi in æquationibus literalibus, ubi omnes quantitates eundem dimensionum numerum habent, nullius usus sunt); Quod si verò dividi possit, oportet rursus eodem modo quærere divisores hujus divisoris & quotientis, atque ita evidens erit, quo pacto omnes rationales æquationes, quæ hanc Fictam

etiam æquationem dividere possunt, inveniri queant, quæ quidem æquationes tunc futuræ sunt quæsitæ diviso- res ultimi Termini æquationis Propositæ.

Per præcedentes autem uti & per sequentes Regulas omnes divisores hujus Fictæ æquationis, non cognitis ejus divisoribus ultimi Termini, ut plurimum facillimo negotio inveniri poterunt, imo perpauca æquationes occurrunt, quarum divisores ultimi Termini non per sequentem 21 Regulam, & dicto modo inveniri possent. Quoniam verò aliquando tales dantur, quarum divisores nec per hanc 21 Reg. nec per aliquam præcedentium obtineri queant; ulterius videndum est, num Fictæ æquationis ultimus Terminus, *unum an plura membra* habeat. Si enim *unum tantum membrum* habuerit, quemadmodum in hoc exemplo, in quo ultimus Terminus est — $4a^4$, notum est quo pacto ejusdem divisores investigare liceat, possuntque deinde eorum ope per sequentes Regulas inveniri æquationes omnes rationales, per quas hæc Ficta divisibilis erit, atque ita habebuntur etiam omnes divisores ultimi Termini æquationis Propositæ, qui requirebantur.

Quod si verò ultimus Terminus Fictæ æquationis *plurium membrorum* fuerit, tum rursus eundem, ut ante, supponerem $\infty 0$, ac iterum agerem, quemadmodum jam dictum est, donec inveniatur æquatio, vel cujus rationales divisores per aliquam præcedentium, si- ve per 21 Regulam facillimè inveniuntur; vel cujus ultimus Terminus tantum *unius membri* existit. & ad alterutrum obtinendum parum temporis requiritur; & alterutro invento, Quæsitum obtineri potest, quoniam tunc per sequentes Regulas inveniri possunt æquationes omnes, ultimam hanc Fictam dividentes; atque ita inventis omnibus divisoribus ultimi Termini proximè antè-

antecedentis Fictæ æquationis possunt denuo per easdem Regulas, ope horum divisorum ultimi Termini, inveniri æquationes omnes, quæ huic proximè antecedentem Fictam dividere queunt, sicque ulterius ascendendo obtinebuntur tandem divisores omnes, quicunque fuerint, ultimi Termini Propositæ æquationis; qui inveniendi proponebantur.

Exempli gratiâ, si proponantur inveniendi divisores omnes ultimi Termini hujus æquationis

$$\begin{array}{rcl}
 x^4 * & -14aa xx + 32aac x + a^4 & \infty 0, \\
 + 4ac & + 4acd & -10aacc \\
 + 2cc & -16add & -2accd \\
 + 4dd & & + 4aadd \\
 + dc & & + 4ac^3 \\
 & & + 4a^3c \\
 & & + dcaa \\
 & & + 24acdd \\
 & & + 4ccdd \\
 & & + 4cd^3 \\
 & & + c^4 \\
 & & + dc^3
 \end{array}$$

nimirum ope Regularum sequentium, æquationes omnes rationales, per quas aliqua Proposita dividi potest, detegentium beneficio divisorum ultimi Termini: suppono ejus ultimum Terminum $\infty 0$, atque unam ex ipsius literis considero ceu incognitam quantitatem, ut puta a , obtineoque æquationem in ordinem redactam,

$$\begin{array}{rcl}
 a^4 + 4ca^3 & -10ccaa & -2ccda + 4ccdd \infty 0. \\
 + 4dd & + 4c^3 & + 4cd^3 \\
 + dc & + 24cdd & + c^4 \\
 & & + dc^3
 \end{array}$$

Quoniam autem hujus ultimus terminus etiam plura membra habet, suppono ipsum rursus, ut ante, $\infty 0$ sumendoque c pro incognita quantitate, obtineo inde hanc æquationem

$$c^4 + dc + 4ddcc + 4d^3c \infty 0.$$

Quæ divisa per c dat $c^3 + dcc + 4ddc + 4d^3 \infty 0$, quæ est æquatio in qua ultimus Terminus $4d^3$ tantum unum Membrum habet.

habet. Constat autem quo pacto divisores hujus ultimi termini inveniantur, qui, postquam cogniti erunt, inservire poterunt, ut eorundem ope per sequentes Regulas quærantur, æquationes omnes rationales, hanc ultimam Fictam $c^3 + dcc + 4ddc + 4d^3 \infty 0$ dividendes, ac proinde etiam æquationes, quæ $c^4 + dc^3 + 4ddc + 4d^3c \infty 0$ dividere possunt, quæ quidem est ultimus Terminus Fictæ æquationis proximè præcedentis

$$\begin{array}{r} a^4 + 4ca^3 - 10ccaa - 2ccda + 4ccdd \infty 0. \\ + 4dd + 4c^3 + 4cd^3 \\ + dc + 24cdd + c^4 \\ + dc^3 \end{array}$$

Inventis verò divisoribus omnibus ultimi hujus æquationis Termini, possunt denuo per easdem Regulas inveniri omnes æquationes rationales hanc ipsam dividendes; quibus cognitis inventum est, quod quærebatur, cum æquatio hæc Ficta ultimus sit Propositæ æquationis Terminus.

Hinc liquet per solam sequentem XVII Regulam semper omnes divisores ultimi Termini inveniri posse: sed, quoniam per præcedentes uti & per reliquas sequentes Regulas sæpe primo intuitu cernitur tales divisores non dari, si non dentur, & ii qui dantur sæpe minori labore inveniuntur, poterunt & hæ Regulæ magno cum fructu adhiberi.

XVI. REGULA.

Quæ modum docet inveniendi omnes æquationes rationales, duos tantum Terminos habentes, quibus æquatio quævis rationalis & Fractione carens, sive literalis sive numeralis sit, dividi possit.

Fiat alia æquatio pro libitu ex duabus aut pluribus quantitatibus, aut etiam terminis Propositæ æquationis; atque juxta hanc suppositionem inveniatur valor ipsius x ; vel sumatur tantum aliquis valor pro x , ut liber. Deinde substituto hoc valore Ficto ipsius x , vel eo quem ex æquatione Ficta invenimus, ubique in locum ipsius x æquationis Propositæ: Si termini se mutuo destruire

N n n

struere

struere reperiantur, erit Proposita æquatio divisibilis per x — hoc Fictio valore $\infty 0$; si autem hi termini se mutuo non destruant, quærantur divisores aggregati horum omnium terminorum (quod quidem aggregatum, ut ab ultimo termino æquationis distinguatur, in posterum vocabo *Terminum Fictum*); atque ab unoquoque divisore unius dimensionis auferatur valor Fictus ipsius x , at ab unoquoque divisore duarum dimensionum auferatur ejusdem valoris quadratum, & sic deinceps. Quo peracto, videndum erit num aliqua horum reliquorum consentiant cum divisoribus ultimi Termini æquationis Propositæ; si enim nulla eorum cum iis consentiant, indicio est æquationem Propositam per aliam duos tantum Terminos habentem, seu per x , aut xx , &c. $+$ vel $-$ quantitate quavis cognita atque rationali non esse divisibilem: Si verò aliqua consentiant, oportet, facto unoquoque consentiente $+$ x earundem dimensionum, $\infty 0$, explorare per quam harum æquationum æquatio Proposita dividi possit; si enim per nullam ipsarum divisibilis sit, erit quoque Proposita per x , aut xx , &c. $+$ vel $-$ quavis quantitate cognita atque rationali indivisibilis. Quæ quidem omnia sequenti exemplo clariora evadent.

Vt ad investigandos divisores, si qui sint, hujus æquationis $x^3 - 21axx - bbx + 20abb \infty 0$, suppono $x^3 \infty 21axx$,
 $+ 20aa$

vel $bbx \infty 20abb$, vel ad libitum quemlibet pro x valorem assumo, ut puta a vel b : sed assumamus $x^3 \infty 21axx$, sive $x \infty 21a$. Deinde subrogando $21a$ ubique in locum x in æquatione Proposita $x^3 - 21axx - bbx + 20abb \infty 0$ (rejeciendo breviter $+ 20aa$

tatis causâ terminos, ex quibus æquatio Ficta est conflata, cum ipsi, dum nihilo sunt æquales positi, necessariò evanescant) obtineo pro terminorum omnium aggregato $- 21abb + 21$,

20a³

$20a^3 + 20abb$, vel $-abb + 21$, $20a^3$, quod quidem aggregatum voco *Fictum Terminum*, cujus divisores hi quatuor existunt $+a$, & $-a$; $-bb + 21$, $20aa$, & $+bb - 21$, $20aa$. Porro subducto hoc Ficto valore $21a$ ab utroque priorum; & ab utroque duorum sequentium ejusdem valoris quadrato, (quoniam ipsi duarum sunt dimensionum;) relinquuntur $-20a$, $-22a$; $-bb - 21aa/bb - 41$, $21aa$. Quo peracto, si videatur num aliqua horum Reliquorum consentiant cum divisoribus ultimi Termini $+20abb$ æquationis Propositæ, comperietur solummodo $-20a$ consentire. Quocirca ad $-20a$ additâ x unius dimensionis, siquidem $-20a$ unius tantum dimensionis existit, explorandum duntaxat restat num æquatio Proposita dividi possit per $x - 20a$. quod, si non contingat, erit ea per x , aut xx , $+$ vel $-$ quâvis aliâ quantitate cognitâ atque rationali indivisibilis, quemadmodum quoque si nulli divisores congruentes reperti fuissent. at verò hæc æquatio dividi poterit per $x - 20a$, orieturque pro quotientē $xx - ax - bb \infty 0$.

Hic autem quædam consideranda veniunt, quæ breviter saltem indicabo.

1. Per hanc viam omnes æquationes duorum terminorum, quibus æquatio Proposita dividi possit, eâdem operâ inveniuntur.

2. In formanda nova æquatione, aut cum ipsi x affingitur aliquis valor, observandum est, cum brevitatis causâ ita fingi posse, ut ipso in locum x subrogato resultet inde tale quantitatum aggregatum seu *Fictus terminus*, cujus divisores faciles sint inventu, ac pauci numero. id quod communiter levi negotio obtineri potest.

3. Sæpenumero supervacaneum est, ut omnes divisores ultimi Termini æquationis Propositæ quærantur; ut in superiore exemplo videre est, ubi quæ restabant Reliqua, ex divisoribus Ficti Termini & ex assumpto valore ipsius x & xx facta, hæc erant quatuor $-20a$, $-22a$, $-bb - 21aa$, $+bb - 41$, $21aa$, quorum duo posteriora non possunt congruere cum divisoribus ultimi Termini $20abb$ æquationis Propositæ, cum duo Membra habeant, atque hic terminus tantum unum. deinde apparet etiam, quod $22a$ divisor esse non possit ipsius $20abb$, quoniam numerus 22 major est numero 20 ; atque ea propter considerare tantum oportet

ter — 20 a, ita ut solummodo inquirendum sit num ultimus Terminus 20 a b b divisibilis sit per — 20 a. Possumus quoque eodem modo, quando divisores ultimi Termini æquationis Propositæ cogniti sunt, invenire divisores omnes *Ficti Termini*, qui nobis inservire queunt, reliquis qui inutiles sunt prætermisiss. Quin imò in multis casibus, præsertim cum æquatio indivisibilis est, parcere possumus labori, qui in quærendis divisoribus tam ultimi Termini æquationis Propositæ quàm *Ficti Termini* esset impendendus, si modò ipsos inter se comparaverimus, quod modicâ experientiâ longè clariùs, quàm multis verbis patescet.

4. Si fortè contingat ut divisores Congruentes multi adhuc numero existant, ita ut etiamnum nimis laboriosum foret omnibus istis divisoribus divisionem æquationis Propositæ tentare, poterimus aliam æquationem fingendo aut ipsi x alium valorem assignando rursus operari, & ut ante, *Reliqua* (quæ singulis divisoribus hujus ultimi *Ficti* termini, — ultimò ipsius x , aut xx , &c. fictis valoribus sunt æqualia, quemadmodum in Regula fuit dictum,) cum jam inventis Congruentibus comparare, & iterum congruentes, si qui sint, eligere, si verò nulli reperiantur, argumentum est æquationem per x , aut xx , &c. + vel — quâvis quantitate cognitâ atque rationali esse indivisibilem. Et si adhuc nimis multi fuerint, eodem modo denuo quidam rescindi possunt. Sed hoc rarò accidit in æquationibus literalibus.

5. Si æquatio Proposita Fractionibus carens sit divisibilis per aliam æquationem rationalem, duos tantùm Terminos habentem, non opus est, ad inveniendum hunc divisorem, omnia signa radicalia ex Proposita æquatione auferre, sed ea solummodo, quæ in ultimo Termino reperiuntur.

Potest etiam hæc Regula XVI dividi in duas partes, hoc modo:

Inquire primùm num Proposita æquatio sit divisibilis per aliam in qua unus pluresve termini defunt, secundùm XI Regulam; Si non sit, tantùm secundùm jam descriptam XVI Regulam inquirendum est, num sit divisibilis per x + vel — aliquo divisore ultimi Termini.

mini, omiffis omnibus reliquis diviforibus duarum pluriumve dimensionum.

XVII. REGVLA.

Quæ docet modum inveniendi omnes æquationes rationales, quibus æquatio quævis rationalis & Fræctione carens, fve literalis, fve numeralis fit, dividi poffit.

Æquatio talis erit divifibilis per aliam rationalem fræctione carentem, in qua vel unus pluresve termini deficiunt, vel nullus. Primò itaque inquirendum eft per X. I Regulam, num per rationalem fræctione carentem, in qua unus pluresve termini deficiant, dividi poffit; fi comperiat id fieri non poffe, erit ea divifibilis per æquationem nullo termino carentem, & quidem unius dimensionis, fi Propofita fit 3 dimensionum; vel per aliquam unius vel duarum dimensionum, fi Propofita fit 4 vel 5 dimensionum; vel per aliquam 1, 2, 3, fi Propofita fit 6 vel 7 dimensionum; vel per aliquam 1, 2, 3 vel 4 dimensionum, fi Propofita habeat 8 vel 9 dimensiones; & fic in infinitum.

Modum verò inquirendi an ea divifibilis fit per æquationem fimplicem fve unius dimensionis, antea oftendi: unde folummodo reftat, quo modo reliqui divifores, feu æquationes duarum, trium, &c. dimensionum inveniri queant.

Et fciendum, me quantitatem cognitam 2^{di} termini, adfectam fuis fignis + & — vocare p ; 3^{ti} termini q ; 4^{ti} r ; 5^{ti} s ; 6^{ti} t ; 7^{mi} v : at diviforem ultimi termini, fimiliter fignis fuis adfectum, h .

REGVLA PRO ÆQVATIONIBVS 4^{or} DIMENSIONVM.

Si æquatio Propofita divifibilis fit per æquationem

$$\begin{array}{r} Nnn \\ 3 \end{array} \quad \text{ratio}$$

rationalem, plures quàm unam dimensionem habentem, in qua nullus terminus deficiat; erit ea divisibilis per

$$xx + \frac{r-hp}{b}x + b \infty 0.$$

Excepto tantùm, cùm $\frac{r}{b}$ est ∞b , ac simul $r \infty hp$, id est; $b \infty 8 \sqrt{s}$, & $h \infty \frac{r}{p}$ tunc enim divisibilis erit per

$$xx + \frac{1}{2}p \ 8 \sqrt{\frac{1}{2}pp + 2b - q} \text{ in } x, + b \infty 0.$$

1. Et cum æquatio Proposita sit liberata ab omnibus fractis & surdis quantitibus, atque dividi queat

per æquationem rationalem: sequitur, $\frac{r-hp}{b}$ debere

integram esse quantitatem rationalem. Patet etiam f nunquam esse posse ∞bb , nisi f quadratum fuerit, ac r per p dividi possit.

2. Sufficiet etiam illos solùm divisores ultimi Termini qui ipsius $\sqrt{Q^m}$. non excedunt considerare, nimirum, si æquatio sit numeralis; sed si sit literalis, opus tantùm erit divisoribus uti duarum dimensionum, atque ex his semper alterutro tantùm duorum talium, quorum productum constituat ultimum Terminum.

Exempli gratiâ, si proponatur hæc æquatio numeralis $x^4 - 3x^3 + 12xx - 30x - 200 \infty 0$, quæ dividi potest per aliquam rationalem; & si compertum sit ipsam indivisibilem esse per x , + vel — aliquo divisore ultimi Termini, ut & per æquationem 2 dimensionum, in qua aliquis terminus deficit; dividi

poterit per hanc $xx + \frac{r-hp}{b}x + b \infty 0.$

Quia igitur hic p est $\infty - 3$

q , quâ non indigemus, prætereo,

$r \infty - 30$

$f \infty - 200,$

hinc

$$\text{hinc erit } xx + \frac{r-bp}{b-h}x + b \infty xx + \frac{-10+1b}{h}x + b \infty 0.$$

Sunt autem Divisores ultimi Terminii radicem Quadratam non excedentes; seu valores ipsius b , $\infty +1$ vel -1

$$\begin{array}{ll} +2 & -2 \\ +4 & -4 \\ +5 & -5 \\ +8 & -8 \\ +10 & -10 \end{array}$$

Vnde fumendo $b \infty +1$, erit $\frac{-10+1b}{h} - b$ fractio, similiterque

si sumatur $b \infty -1$; $\infty +2$; $\infty -2$; $\infty +4$; $\infty -4$, & $\infty +5$. At si sumatur $b \infty -5$, obtinebitur -1 , ac proinde tentanda erit divisio per $xx - 1x - 5 \infty 0$. Quoniam autem per hanc fieri nequit, transeo ad alium valorem ipsius b , puta $+8$. Sed cum sic rursus prædicta quantitas fractio evaderet; ut & quando pro b assumitur -8 , transeo ad $b \infty +10$. Quia verò r fit ∞bp , ac idcirco $xx + b \infty 0$, non poterit similiter hic valor nobis inservire; ita ut nobis solum restet $b \infty -10$. Vnde obtinetur æquatio $xx - 2x - 10 \infty 0$, per quam Proposita dividi potest.

Eodem modo, si proponatur æquatio literalis

$$\begin{array}{l} +4abb \\ x^4x - bb - a^3 - 4b^3 \\ +2abxx - 4b^3x + 2aabb \infty 0, \\ +aab \end{array}$$

Quoniam p est $\infty 0$

$$\begin{array}{l} r \infty 4abb - a^3 - 4b^3 + aab \\ f \infty 2aabb - 4b^3 \\ \text{erit } xx + \frac{r-bp}{b}x + b \infty xx + \frac{4abb - a^3 - 4b^3 + aab}{2aabb - 4b^3 - b}x + b \infty 0. \end{array}$$

Divisores ultimi Terminii, duas habentes dimensiones, seu valores ipsius b , sunt $+bb$, & $-4bb + 2aa$,

$$\begin{array}{ll} -bb, & +4bb - 2aa, \\ +2bb, & +2bb + aa, \\ -2bb, & -2bb - aa. \end{array}$$

Quorum tantum prioribus 4 indigemus, nimirum, $+bb$, $-bb$, $+2bb$,

+ 2^{ab}, — 2^{bb}: quoniam reliqui per hos multiplicati ultimum Terminum producent.

Sumendo autem $b \infty + bb$, 2^{us} terminus erit fractio. Hinc transeundo ad $b \infty + 2bb$, obtinebitur æquatio $xx - \frac{b}{a}x + 2bb \infty 0$. Per quam Proposita dividi potest, invenitur enim pro quotiente hæc $xx - \frac{a}{b}x + \frac{2bb}{aa} \infty 0$.

• REGULA PRO ÆQUATIONIBVS 5^{ta} DIMENSIONVM.

Si æquatio Proposita 5 dimensionum divisibilis sit per æquationem rationalem, plures quàm unam dimensionem habentem, in qua nullus terminus desit; poterit ipsa dividi per æquationem hanc

$$xx - \frac{1}{2b} + \frac{1}{2}p \sqrt{-\frac{1}{2b} + \frac{1}{2}p \square^{16}} - q + b + \frac{1}{b} \ln x, + b \infty 0.$$

Et cum æquatio hæc debeat esse rationalis quæ nullas admittat fractiones; sequitur 2^{um} terminum debere esse integram quantitatem rationalem.

Exemplum.

Proponatur hæc æquatio

$$\begin{array}{rcl} x^{16} & + & 8aabxx + 2ab^3x - b^5 \infty 0. \\ & - & 63a^3 \quad + 16a^3b \quad + a^4b \\ & + & 8abb \quad + 15aabb - ab^4 \\ & - & b^3 \quad - b^4 \quad + a^3bb \\ & & - 4a^4 \end{array}$$

Postquam constat, æquationem hanc dividi non posse per ullam aliam, 2 aut 3 dimensiones habentem, in qua unus aut plures termini deficiunt, nec per $x \sqrt{\quad}$ aliquo divisore ultimi termini; erit illa divisibilis per superiorem

$$xx - \frac{1}{2b} + \frac{1}{2}p \sqrt{-\frac{1}{2b} + \frac{1}{2}p \square^{16}} - q + b + \frac{1}{b} \ln x, + b \infty 0.$$

Quan-

Quantitates cognitæ sunt $p \propto 0$

$q \propto 0$

r nullius hîc est usus.

$f \propto 2ab^3 + 16a^3b + 15aabb - b^4 - 4a^4$

$t \propto -b^5 + a^4b - ab^4 + a^3bb,$

& divisores ultimi Termini, duas dimensiones habentes, seu valores ipsius h sunt $\propto ab + bb$, vel $-ab - bb$, vel $bb - aa$, vel $-bb + aa$

vel $ab - bb$, vel $-ab + bb$

vel $aa + ab + bb$, vel $-aa - ab - bb$:

hinc si h sumatur $\propto ab + bb$, obtinebitur

$$xx - \frac{t}{2b} + \frac{1}{2}p \sqrt{-\frac{t}{2b} + \frac{1}{2}p \square^u} - q + b + \frac{s}{b} \text{ in } x, + b$$

æquale $xx - 4ax + ab \propto 0$. Per quam si tentetur utrum Pro-

$+bb$

posita dividi queat, inveniatur divisionem fieri posse, atque pro quotientis oriri $x^3 + 4axx + 16aax - b^3 \propto 0$.

$- ab + a^3$

$- bb$

REGVLA PRO ÆQVATIONIBVS 6 DIMENSIONVM.

Si æquatio Proposita 6 dimensionum divisibilis sit per æquationem rationalem, plures quàm unam dimensionem habentem, in qua nullus terminus desit; erit ipsa divisibilis vel per æquationem 2 dimensionum, vel per aliquam 3 dimensionum. Si divisibilis sit per æquationem rationalem 2 dimensionum, poterit dividi per æquationem $xx + yx + b \propto 0$,

$$\text{existente } y \propto \frac{ph - \frac{t}{b}}{2b - \frac{2v}{b}} \sqrt{\frac{ph - \frac{t}{b}}{2b - \frac{2v}{b}}} \square^u + f - \frac{v}{b} + bb - qb.$$

Si divisibilis sit per æquationem rationalem 3 dimensionum, erit divisibilis

Ooo

per

per æquationem $x^3 + yxx + zx + b \propto 0$,
existente

$$y^3 \frac{-\frac{p}{b} - 2pb}{\frac{v}{b} + b} - \frac{p^2 b - 2t}{\frac{v}{b} + b} y \frac{-\frac{v}{b} + binr, -qb + tinp}{\frac{v}{b} + b} \propto 0,$$

$$+ qy \quad \frac{v}{b} - b$$

$$\& z \propto \frac{y^3 - p^2 y + qy + \frac{v}{b} + b - r}{2y - p}.$$

Porro ob eandem rationem atque in præcedentibus
Regulis sequitur y & z debere esse integras quantitates
rationales.

Atque in hoc ultimo casu, ubi divisio per $x^3 + yxx + zx + b \propto 0$ tentanda est, opus tantum est uti divisoribus ultimi Termini qui ejus radicem quadratam non excedunt, nimirum quando æquatio numeralis est; at ipsâ literali existente, sufficit uti divisoribus 3 dimensionum, atque ex his duntaxat alterutro duorum talium, quorum productum ultimum Terminum efficit, haud secus ac id in præcedenti Regula pro æquationibus 4^{or} dimensionum quoque annotatum fuit. Quæ porro animadversio locum etiam obtinet in omnibus æquationibus parium dimensionum, quas dividere tentamus per aliam dimidium præcedentium dimensionum numerum habentem.

DETERMINATIO 1^{ma} CASVS.

Cum $2b - \frac{2v}{b}$ est $\propto 0$, hoc est, $b^3 \propto v$, & $b \propto \sqrt[3]{C.v}$:

$$\text{erit } y \propto \frac{-f + q\sqrt[3]{C.v}}{p\sqrt[3]{C.v} - \sqrt[3]{C.v}}.$$

Cum

Cùm $2b - \frac{2v}{b}$ est $\infty 0$, ac simul $p\sqrt{C.v} - \frac{t}{\sqrt{C.v}} \infty 0$, &
 $-f + q\sqrt{C.v} \infty 0$, hoc est, $b\sqrt{C.v}, b\sqrt{\frac{t}{p}}$, & $b\sqrt{\frac{f}{q}}$:
 erit $y^3 - pyy + \frac{f}{\sqrt{C.v}}y + 2p\sqrt{C.v} - r \infty 0$.

DETERMINATIO 2^a CASVS.

Cùm $\frac{v}{b} + b$ est $\infty 0$, erit $yy + \frac{p}{\frac{v}{b} + b}y - \frac{2r}{p} + q - \frac{t}{b} \infty 0$.

Cùm p est $\infty 0$, ac simul $\frac{v}{b} + b \infty 0$, erit $y \infty \frac{r}{t}$.

Cùm t est $\infty 0$, & $r \infty 0$, ac simul $p \infty 0$, & $\frac{v}{b} + b \infty 0$,
 erit $y^3 + 2qyy - 8hy - 4\frac{f}{q} \infty 0$.

Cùm $2y$ est ∞p , & $y^3 - pyy + qy + \frac{v}{b} + b - r \infty 0$,
 erit $z \infty \frac{t + byy - qb}{\frac{v}{b} - b}$.

Sed cùm determinationes illæ manent, ac simul $\frac{v}{b} - b$ est
 $\infty 0$, & $t + byy - qb \infty 0$, erit $z \infty \frac{t}{2\sqrt{v}} \text{ R } \sqrt{\frac{t}{4v}} - f + p\sqrt{v}$.

Denique in omnibus determinationibus adverten-
 dum est, quòd, si reperiatur $2b - \frac{2v}{b} \infty 0$, & $p\sqrt{C.v} - \frac{t}{\sqrt{C.v}} \infty 0$, sed $-f + q\sqrt{C.v}$ non simul esse $\infty 0$; ut & si
 reperiatur $\frac{v}{b} + b \infty 0$, $p \infty 0$, & $t \infty 0$, sed r non simul $\infty 0$;
 itemque si reperiatur $2y \infty p$, & $y^3 - pyy + qy + \frac{v}{b} + b - r \infty 0$, & $\frac{v}{b} - b \infty 0$, sed $t + byy - qb$ non simul $\infty 0$;

Ooo 2

atque

atque similiter in Regula pro 4^{or} dimensionibus, si $\frac{f}{b} - b$ reperiatur $\infty 0$, sed non perinde $r - b p \infty 0$: quòd tum inquam valor assumptus ipsius b , quòd hoc contingit, nobis inservire non possit.

Exempla 1ⁿⁱ Casus.

Proponatur inquirendum, an hæc æquatio

$x^6 - 3x^5 + 7x^4 - 5x^3 + 4xx^2 + 8 \infty 0$
dividi possit per æquationem rationalem 2 dimensionum, in qua nulli termini deficiant.

Cum igitur hîc p sit $\infty - 3$

q	∞	7
r	∞	-5
s	∞	4
t	∞	0
v	∞	8

$$\text{erit } y \infty \frac{ph - \frac{t}{b}}{2b - \frac{2v}{b}} \text{ } \& \sqrt{\frac{ph - \frac{t}{b}}{2b - \frac{2v}{b}}} \square^{\text{te}} \frac{+s - \frac{v}{b} + hh - qh}{b - \frac{v}{b}}$$

æqualis

$$\frac{-3b}{2b - \frac{16}{b}} \& \sqrt{\frac{-3b}{2b - \frac{16}{b}}} \square^{\text{te}} \frac{4 - \frac{8}{b} + hh - 7b}{b - \frac{8}{b}}$$

Divisores autem ultimi Termini, seu valores ipsius b sunt

$$\begin{array}{ll} +1, & \text{vel } -1 \\ +2, & -2 \\ +4, & -4 \\ +8, & -8. \end{array}$$

Hinc si primò sumatur $b \infty +1$, poterit radix ex

$$\frac{-3b}{2b - \frac{16}{b}} \square^{\text{te}} \frac{4 - \frac{8}{b} + hh - 7b}{b - \frac{8}{b}} \text{ extrahi, inveniturque}$$

$y \infty -1$, sed æquatio proposita non poterit dividi per $xx - 1x$

— $1x + 1 \infty 0$, ac proinde transeo ad $b \infty + 2$, sed cum sic b fiat $\infty \sqrt{C.v}$, deberet, juxta determinationes superiores, y esse $\infty \frac{-f + q\sqrt{C.v}}{p\sqrt{C.v} - \frac{t}{\sqrt{C.v}}}$, hoc est, $\infty \frac{+10}{6}$. Id

quod cum fractio existat, transeo ad $b \infty + 4$, atque inde obtineo $y \infty \frac{-12}{+7} \frac{8}{7}$, hoc est, $y \infty -2$, aut $\infty -\frac{1}{7}$. Quorum quidem non nisi $y \infty -2$ retinendum est, adeoque divisio tentanda per $xx + yx + b \infty xx - 2x + 4 \infty 0$. Hæc autem procedere comperitur, oritur namque pro quotiente $x^2 - 1x^1 + 1xx + 1x + 2 \infty 0$.

Eodem modo, si examinare velimus hanc æquationem $x^6 + 1x^5 + 1x^4 - 2x^3 + 2xx + 4x + 8 \infty 0$: quoniam p est $\infty 1$, $q \infty 1$, $r \infty -2$, $f \infty 2$, $t \infty 4$, & $v \infty 8$, invenitur

$$y \frac{1b - \frac{4}{b}}{2b - \frac{16}{b}} \frac{8 \sqrt{\frac{1b - \frac{4}{b}}{2b - \frac{16}{b}}}}{\square^{\frac{10}{b - \frac{8}{b}}}} + 2 - \frac{8}{b} + bb - b$$

Sumendo autem $b \infty + 1$, non poterit \sqrt{Q} . extrahi; quocirca transeo ad $b \infty + 2$, invenioque b fore $\infty \sqrt{C.v}$, ac $b \infty \sqrt{\frac{t}{p}}$, ut & $b \infty \frac{f}{q}$. Vnde fit ut juxta dictam determinationem valorem quæram ipsius y per hanc æquationem

$$y^3 - py + \frac{f}{\sqrt{C.v}}y + 2p\sqrt{C.v} \infty 0, \\ - 3\sqrt{C.v} - r$$

hoc est, $y^3 - 1yy - 5y + 6 \infty 0$.

E qua æquatione pro y nullus valor rationalis invenitur præter 2, ac proinde divisio tentanda relinquitur per $xx + yx + b \infty xx + 2x + 2 \infty 0$. Comperitur autem fieri posse, oritur enim pro quotiente $x^2 - 1x^1 + 1xx - 2x + 4 \infty 0$.

Exempla 2^a Casus.

Esto examinandum, an hæc æquatio.

$$x^6 + 1x^4 + 3x^3 + 6xx + 3x - 4 \infty 0$$

dividi possit per æquationem rationalem 3 dimensionum, in qua nulli termini deficiant.

Cum hinc p sit ∞ 0

$$q \infty 1$$

$$r \infty 3$$

$$s \infty 6$$

$$t \infty 3$$

$$v \infty -4$$

$$\text{erit } y^1 \frac{-\frac{p}{b} - 2ph + pph - 2t - \frac{v}{b} + h \text{ in } r, -qh + t \text{ in } p}{\frac{v}{b} + b} y y \frac{\frac{v}{b} + b}{\frac{v}{b} + b} y \frac{\frac{v}{b} + h}{\frac{v}{b} + b} + q y \frac{\frac{v}{b} - h}{\frac{v}{b} - h}$$

 \propto qualis

$$y^1 * \frac{+1 y}{-6} \frac{\frac{4}{b} + h \text{ in } 3}{-\frac{4}{b} + b - \frac{4}{b} + b} \infty 0.$$

Divisores ultimi Termini, seu valores ipsius b , qui soli sunt considerandi, sunt $+1$, vel -1 , vel $+2$. Vnde fumendo $b \infty +1$, obtinebitur $y^1 * +3 y^1 * -10 \infty 0$. Sed cum y hujus \propto uationis nullum valorem rationalem admittat, transco ad alium, nempe $+2$.

Cum autem sic $\frac{v}{b} + b$ fiat $\infty 0$, atque etiam p sit $\infty 0$, erit, iuxta dictam determinationem, $y \infty \frac{r}{b}$, hoc est, $y \infty 2$. At quoniam

pro $z \infty \frac{y^1 - p y y + q y + \frac{v}{b} + b - r}{2y - p}$ invenitur fractio, transco

dum ad $b \infty -1$, atque hinc obtineo $y^1 * -1 y^1 * \infty 0$, hoc est, $y \infty +1$, & $y \infty -1$. E quibus tandem inveniendus superest valor ipsius z . Quocirca si primum sumatur $y \infty +1$, inveniatur inde $z \infty 1$, & $x^3 + y x x + z x + b \infty x^3 + 1 x x + 1 x - 1 \infty 0$. Per quam \propto uationem Proposita dividi potest, oritur enim pro quotiente $x^3 - 1 x x + 1 x + 4 \infty 0$. Quod si autem per eam dividi non potuisset, ut nec per aliam, ubi y est $\infty -1$, \propto uatio Proposita dicto modo non divisibilis fuisset, quandoquidem sic omnes ipsius b valores examini subjecissemus.

Simi-

Similiter examinaturi hanc æquationem

$$x^6 - 6x^5 + 25x^4 - 36x^3 + 3xx + 16x - 28 \infty 0,$$

in qua p est $\infty - 6, q \infty 25, r \infty - 36, s \infty 3, t \infty 16, v \infty - 28$, & $b \infty + 1$ vel -1 , aut $+2$ vel -2 , aut $+4$ vel -4 , (neglectis scilicet reliquis divisoribus, radicem quadratam ultimi termini excedentibus:) inueniemus, faciendo, ut ante, periculum cum unoquoque valore ipsius b , si pro b assumitur -2 , æquationem hanc $y^3 + 5yy + 16\frac{1}{2}y + 31 \infty 0$, in qua y admittit tantummodo unum valorem rationalem, qui integer numerus est nempe -3 . Per hunc autem quæro valorem ipsius z . Sed cum hic $2y$ sit ∞p , & $y^3 - pyy + qy + \frac{v}{b} + b - r \infty 0$, non possum eun-

dem per hanc æquationem $z \infty \frac{y^3 - pyy + qy + \frac{v}{b} + b - r}{\frac{2y - p}{t + byy - qb}}$ invenire, quo circa illum quæro per hanc $z \infty \frac{\frac{v}{b} - b}{b}$, atque

invenio $z \infty 3$, &

$$x^3 + yxx + zx + b \infty x^3 - 3xx + 3x - 2 \infty 0.$$

Per quam igitur examinando an Proposita dividi queat, compertitur divisionem fieri posse, oriaturque pro quotiente $x^3 - 3xx + 13x + 14 \infty 0$. Si verò in hoc ultimo exemplo, ubi $2y$ est ∞p , non fuisset $y^3 - pyy + qy + \frac{v}{b} + b - r \infty 0$, oportuisset transire ad alium valorem ipsius b .

Vbi notandum per has Regulas pro æquationibus 4, 5, & 6 dimensionum non solum sciri posse, an Proposita aliqua æquatio per aliam rationalem, in qua omnes Termini extant, divisibilis sit; sed etiam utrum ipsa divisibilis sit per rationalem, in qua aliquis Terminus deficiat. Verum cum idem facilius cognosci queat per XI Regulam, hanc iis duntaxat æquationibus, in quibus nulli termini deficiunt, applicare volui.

2. Quoniam autem usus harum Regularum vel eo major est, quo pauciores divisores ultimus Terminus Propositæ æquationis admittit, haud inconsultum fuerit hic adjungere modum, quo plerumque levi negotio Propositam æquationem in aliam transmutare licet, in qua ultimus Terminus pauciores habeat dimensiones, quæque indivisibilis sit si Proposita sit indivisibilis, at divisibilis.

visibilis, si Proposita divisibilis fuerit, & ex cujus æquationibus ipsam dividendis facile quoque inveniri possint æquationes, Propositam dividentes.

Assumpto in hunc finem valore aliquo pro x , ut lubet, eoque subrogato ubique in locum x , quærantur divisores omnes aggregati omnium terminorum; & si divisores hi non pauciores numero fuerint divisoribus ultimi Termini æquationis Propositæ, sumatur rursus alius valor pro x , exploreturque num hinc aggregatum pauciorum divisorum inveniatur; quod si non fiat, denud pro x alius valor assumendus est, idque tam diu continuetur, donec inde aggregatum resultet, quod pauciores divisores habeat. Quo peracto, ponatur $x \propto z$, + assumpto ipsius x valore, huiusmodi aggregatum pauciorum divisorum suggerente, atque hic valor z + &c. ubique in locum x substituatur, obtinebiturque alia æquatio, in qua z erit incognita quantitas, & ultimus Terminus dictum aggregatum inventum pauciorum divisorum; ita ut hæc æquatio talis futura sit, qualis requiritur, nimirum indivisibilis si Proposita indivisibilis sit, at divisibilis si Proposita divisibilis fuerit.

Exempli gratiâ, est invenienda ejusmodi æquatio loco hujus

$$x^5 + 2x^4 - 58x^3 - 49xx - 50x - 600 \propto 0.$$

Sumatur $x \propto 1$, fietque $x^5 \propto + 1$

$$\begin{array}{r} + 2x^4 \propto + 2 \\ - 58x^3 \propto \dots - 58 \\ - 49xx \propto \dots - 49 \\ - 50x \propto \dots - 50 \\ - 600 \propto \dots - 600, \end{array}$$

& $x^5 + 2x^4 - 58x^3 - 49xx - 50x - 600 \propto + 3 - 757$, hoc est, $\propto - 754$. cujus quidem numeri divisores multò pauciores existunt quàm ipsius $- 600$.

Hinc ponendo $x \propto z + 1$,

erit

$$\begin{array}{rcl}
 \text{erit} & x^5 \infty z^5 + 5z^4 + 10z^3 + 10zz + 5z + 1 & \\
 & + 2x^4 \infty + 2z^4 + 8z^3 + 12zz + 8z + 2 & \\
 & - 58x^3 \infty & - 58z^3 - 174zz - 174z - 58 \\
 & - 49xx \infty & - 49zz - 98z - 49 \\
 & - 50x \infty & - 50z - 50 \\
 & - 600 \infty & - 600,
 \end{array}$$

$$\& z^5 + 7z^4 - 40z^3 - 201zz - 309z - 75400.$$

Quæ æquatio per præcedentes Regulas examinata divisibilis reperitur per $zz + 3z - 58 \infty 0$, ac proinde cum x sit $\infty z + 1$, erit $z \infty x - 1$. Vnde si in locum z subrogetur $x - 1$, obtinebitur $zz + 3z - 58 \infty xx + 1x - 60 \infty 0$. per quam itaque Proposita quoque æquatio divisibilis erit.

Quòd si autem post primam positionem ipsius $x \infty + 1$ obtinuissemus aggregatum, quod nobis non inserviiſſet, id est, quod non pauciores aut adhuc nimis multos divisores admisisset, ponere potuissemus $x \infty - 1$; quòd si verò & hinc quæſitum aggregatum nondum invenissemus, ponere possemus $x \infty + 2$; deinde $x \infty - 2$, atque ita porro; vel etiam possemus nonnullos terminos supponere $\infty 0$, si aliqui fuerint è quibus idonea quantitas pro x inveniri posset. Exempli gratiâ, possemus in æquatione allata duos priores terminos $x^5 + 2x^4$ supponere $\infty 0$, atque sic invenire $x \infty - 2$, quærendo tantùm ulteriùs aggregatum reliquorum Terminorum $- 58x^3 - 49xx - 50x - 600$. Porro, quod hîc de æquationibus numeralibus diximus, idem quoque locum obtinet in literalibus. Si enim, verbi gratiâ, habeatur æquatio literalis hæc $x^5 * - 6abx^3 + 30aabxx - 24a^3bx + 120ab^4 \infty 0$,

$$+ 10a^4$$

ponere possumus $x \infty + a$, vel $x \infty - a$, vel $x \infty + b$, vel $x \infty - b$, & c. vel etiam supponere terminos aliquos $\infty 0$, ut $- 6abx^3 \infty + 30aabxx$, prout visum fuerit.

3. Verùm enimvero magnum hîc commodum in literalibus æquationibus elucet: Nam *non tantùm, cum hoc aggregatum nullos divisores præter unitatem ac se ipsum admittit* (quos quidem divisores in æquationibus literalibus, ubi omnia cujusque termini membra eundem dimensionum numerum habent, quemadmodum in his de quibus agimus, prætermittere soleo, cum nulla divisio per eos fieri possit), *manifestum est, æquationem*

Ppp nem

nem *Propositam per aliam rationalem*, in qua sive omnes sive non omnes termini extant, & sive unius sive plurium est dimensionum, penitus esse indivisibilem; Sed præterea etiam liquet, æquationem *Propositam* nunquam fore divisibilem per æquationem rationalem, cujus dimensionum numerus non congruit cum dimensionum numero alicujus ex divisoribus ultimi Termini vel dicti aggregati. Quocirca si æquatione existente 6 dimensionum diviores non nisi 1 & 5 dimensionum fuerint, erit ea indivisibilis per æquationem 2, 3, & 4 dimensionum; & si diviores tantum 2 & 4 dimensionum fuerint, erit ipsa indivisibilis per æquationem 1, 3, & 5 dimensionum, atque ita de omnibus aliis.

Ita ut per hanc considerationem non tantum multi casus rescari queant, quando æquatio per aliam rationalem divisibilis est; sed etiam si inquirere velimus, num Proposita aliqua æquatio rationalis per aliam rationalem divisibilis sit, poterit sæpissimè parvo admodum labore indivisibilitas, si ea sit indivisibilis, cognosci.

Si enim, exempli causâ, proponatur æquatio

$$\begin{array}{r}
 x^5 * - 6abx^3 + 30a^2bx - 24a^3bx + 120ab^2 \infty 0, \\
 \qquad \qquad \qquad + 10a^4 \\
 \text{ponaturque } x \infty a, \text{ obtinebitur } x^5 \infty + \quad a^5 \\
 \qquad \qquad \qquad - 6abx^3 \infty \dots - 6a^4b \\
 \qquad \qquad \qquad + 30a^2bx \infty + 30a^4b \\
 \qquad \qquad \qquad + 24a^3bx \infty \dots - 24a^4b \\
 \qquad \qquad \qquad + 10a^4x \infty + 10a^5 \\
 \qquad \qquad \qquad + 120ab^2 \infty + 120ab^2 \\
 \hline
 \text{\& fit aggregatum } + 11a^5 + 120ab^2.
 \end{array}$$

Cujus diviores (omissis unitate ac ipso aggregato) tantum sunt $+a$, $-a$, $11a^5 + 120b^2$, & $-11a^5 - 120b^2$, unius scilicet & 4^{or} dimensionum: ita ut *Proposita æquatio*, si per rationalem unius dimensionis divisibilis non fuerit, penitus per rationalem futura sit indivisibilis. Quoniam autem hic x est $\infty z + a$, addi debet a divisoribus $+a$, & $-a$, ad habendos valores ipsius x , idcirco tantummodo $x - 2a \infty 0$ pro diviore assumi posset. Sed
per

per hunc æquatio Proposita non est divisibilis, quare illa etiam per nullam æquationem rationalem dividi poterit. Quod si juxta unam positionem non ita accidisset, facile fuerit aliam instituere, ponendo $x \propto b$, vel $x \propto a$, vel $x \propto b$, &c. Et rarò continget, quin per hanc transmutationem æquationis Propositæ in aliam aliquod commodum consequuturi atque operæ plurimum sublevaturi simus.

XVIII. REGULA,

*Quæ modum docet reducendi omnem æquationem si-
ve. literalem siue numeralem, & quæ ex multiplicac-
tione duarum aliarum, quarum ultimi Termini sunt
quantitates rationales, fractioneque carentes, pro-
duci possunt.*

Hæc Regula parùm à præcedenti differt, nisi quòd se latius extendat, & per hanc quoque Reductiones ejusmodi æquatio-
num semper inveniri possint, quæ ex duabus aliis, siue rationales,
siue irrationales sint, produci possunt, hoc tantùm excepto, quòd
ultimi earum termini sint quantitates rationales: cum præcedens
Regula se solum extendat ad æquationes, quæ non nisi ex ratio-
nalibus produci possunt: ideoque tantùm opus est, ut solummo-
do iisdem Regulis utamur, omnibus illis particularibus relictis,
quæ originem duxerunt ex eo, quòd necesse sit, ut illæ æquatio-
nes, ex quibus Proposita æquatio produci potest, sint rationales,
quod hîc non requiritur. Exempli loco sit prima

REGULA PRO ÆQUATIONIBVS 4^{ta} DIMENSION-
VM.

Si æquatio Proposita divisibilis sit per aliam, plures
quàm unam dimensionem habentem, in qua nullus
terminus deficiat, & cujus ultimus terminus sit ratio-
nalis; erit ea divisibilis per

$$xx + \frac{r-bp}{b}x + b \propto 0.$$

Ppp 2

Ex.

Excepto tantum, cum $\frac{r}{b}$ est $\propto b$, ac simul $r \propto bp$, id est,
 $b \propto 8 \sqrt[3]{f}$, & $b \propto \frac{r}{p}$, tunc enim divisibilis erit per

$xx + \frac{1}{2}p \sqrt[3]{\frac{1}{2}pp + 2b - q}$, in $x + b \propto 0$.
 ubi patet f nunquam esse posse $\propto bb$, nisi f quadratum
 fuerit, ac r per p dividi possit.

2. Sufficit etiam illos solum divisores ultimi termini,
 qui ipsius radicem quadratam non excedunt, conside-
 rare, &c.

Exempli gratia, examinaturus hanc æquationem

$$x^4 - 2ax^3 + 2aaxx - 2a^3x + a^4 \propto 0:$$

quoniam $p \propto -2a$, $q \propto 2aa - cc$, $r \propto -2a^3$, $f \propto a^4$, hinc erit
 $xx + \frac{\frac{r}{b}}{\frac{r}{b} - bp}x + b \propto xx + \frac{-2a^3 + 2ab}{b}x + b \propto 0$.

Sunt autem divisores ultimi Termini, seu valores ipsius b , $+aa$ &
 $-aa$. Vnde sumendo $b \propto aa$, obtinebitur $\frac{a^4}{b} - b \propto 0$, ac etiam
 $-2a^3 + 2ab \propto 0$ (hoc est, $\frac{r}{b} \propto b$, & simul $r \propto bp$.) ac proinde
 tentanda erit divisio per $xx + \frac{1}{2}p \sqrt[3]{\frac{1}{2}pp + 2b - q}$, $x + b \propto 0$, hoc est, per $xx - ax + \sqrt{aa + cc}$, $x + aa \propto 0$, vel per
 $xx - ax - \sqrt{aa + cc}$, $x + aa \propto 0$: Quæ divisio per utram-
 que succedit.

Ita etiam se res habet in

REGULA PRO ÆQUATIONIBVS 5^{ta} DIMEN- SIONVM.

Si enim æquatio Proposita 5 dimensionum divisibi-
 lis sit per aliam plures quàm unam dimensionem ha-
 bentem, in qua nullus terminus deficiat, cujusque ul-
 timus terminus sit rationalis; erit ea divisibilis per

$$xx - \frac{1}{2b}x + \frac{1}{2}p \sqrt[3]{-\frac{1}{2b} + \frac{1}{2}p \square^{\frac{1}{2}}} - q + b + \frac{r}{b} \text{ in } x + b \propto 0.$$

Et

Et sic porro de cæteris Regulis, tantum, uti dictum est, omnibus illis particularibus relictis, quæ originem duxerunt ex eo, quod necesse sit, ut illæ æquationes ex quibus Proposita æquatio produci potest, illic sint rationales, quod solum hinc non requiritur.

Animadvertendum quoque est, hanc Regulam se non solum extendere ad æquationes, in quibus nec signa radicalia, nec Fractiones inveniuntur, (quemadmodum præcedens illis tantum quadrat,) sed quoque ad illas, in quibus & radicalia signa & Fractiones reperiuntur, hoc tantum excepto, quod non sint in ultimo Termino, ut antea dictum.

Denique notandum est, quod idem etiam sequenti modo inveniri possit.

REGVLA PRO ÆQVATIONIBVS 5 DIMENSIONVM.

Quære communem divisorem duarum æquationum,

$$yy + \frac{i}{hb}y + q \infty 0, \& yy - \frac{l}{i}y - \frac{hbp - t + rh}{b} \infty 0,$$

$$\begin{array}{r} -p \quad -b \\ + \frac{h^2}{i} \end{array}$$

$$- \frac{s}{b}$$

& per eum, valorem ipsius y ; eritque Proposita æquatio divisibilis per $xx + yx + b \infty 0$.

REGVLA PRO ÆQVATIONIBVS 6 DIMENSIONVM.

Si Proposita æquatio divisibilis est per

$$xx + yx + b \infty 0,$$

quærat communis divisor duarum æquationum,

$$byy - \frac{v}{hb}yy - phy - f \infty 0, \& y^3 - pyy + qy - r \infty 0,$$

$$\begin{array}{r} + \frac{i}{b} \quad + \frac{v}{b} \\ -hb \\ +qh \end{array} \quad \begin{array}{r} -2h + pb \\ - \frac{v}{b^2} + \frac{i}{b} \end{array}$$

& per eum, valor ipsius y .

Si Proposita æquatio est divisibilis per $x^3 + yxx + zx + b \propto 0$, possunt per eandem methodum, quâ priores æquationes inventæ sunt, etiam inveniri duæ aliæ, altera trium, altera 4^{or} dimensionum, quarum communi divisore invento, per eum valor incognitæ quantitatis y inveniri potest; valor verò ipsius z quærat^{ur} eodem modo, quò antea. Eadem est ratio in altioribus æquationibus.

Sed si nullus inveniat^{ur} communis divisor, assumptum valorem ipsius b relinquo, & alium assumo. Et si omnes termini alterius æquationis se invicem tollant, per alteram invenendus est valor ipsius y .

XIX. REGULA,

Quæ modum docet reducendi omnem æquationem rationalem Fractione & 2^a terminocarentem, quæ dividi possit per aliam cujus 2^{us} terminus sit rationalis, &c.

Primum inquiri per XI Regulam, an Proposita æquatio divisibilis sit per aliam in qua non omnes termini extant; quod si fieri nequit, erit divisibilis per aliam in qua omnes termini extant, quam sequenti modo invenio. 1^{mo}. Experiatur num dividi possit per $x + vel -$ aliquo divisore ultimi Termini; si neque hoc succedat, facio æquationem ejusdem formæ, quam multiplicatione deduco ex tot aliis paribus, quot paria ita sumi queunt, ut productum totidem habeat dimensiones quot Proposita æquatio, non annumerando æquationem unius tantum dimensionis. Exempli gratiâ, si æquatio Proposita habeat 8 dimensiones, considero duas æquationes, habentes 2 & 6, 3 & 5, 4 & 4 dimensiones; aut, si 9 dimensiones habeat, duas, quæ 2 & 7, 3 & 6, 4 & 5 dimensionum fuerint, ex quarum multipli-

plicatione Proposita posset produci. 3^{to}. Post hæc transmuto Propositam æquationem in aliam, cujus incognita quantitas designet quantitatem 2^{di} Terminum, unius harum duarum æquationum, quæ, (si inæqualium dimensionum fuerint,) pauciores dimensiones habeat, 4^{to}. Postremò inquirò num inventa æquatio divisibilis sit per incognitam quantitatem + vel — aliquo divisore ultimi sui Terminum. &c.

Sumamus, verbi gratiâ, hanc æquationem 6 dimensionum,

$$x^6 + q x^4 + r x^3 + s x x + t x + v \infty 0,$$

in qua q designet quantitatem cognitam tertii termini suis signis + & — adfectam; r quarti; s quinti; t sexti; & v ipsum ultimum terminum : Et quam suppono indivisibilem per aliam æquationem, in qua unus aut plures Termini deficiunt, ut & per x , + vel — aliquo divisore ultimi Terminum.

Primò itaque inquirò utrum ipsa divisibilis sit per æquationem 2 dimensionum, in qua omnes termini extant, hoc pacto:

$$\begin{array}{r} x^4 - y x^3 + z x x + k x + l \infty 0 \\ x x + y x + w \infty 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^6 - y x^5 + z x^4 + k x^3 + l x x \\ + y \quad - y y \quad + y z \quad + y k \quad + y l x \\ + w \quad - w y \quad + w z \quad + w k \quad + w l \end{array}$$

$$x^6 + q x^4 + r x^3 + s x x + t x + v \infty 0.$$

Vnde hæc 5 æquationes resultant

$$1^{\text{ma}}. z - y y + w \infty q$$

$$2^{\text{da}}. k + y z - w y \infty r$$

$$3^{\text{ta}}. l + y k + w z \infty s$$

$$4^{\text{ta}}. y l + w k \infty t$$

$$5^{\text{ta}}. w l \infty v.$$

Per 1^{am} fit $z \infty q + y y - w$, qui valor si in locum ipsius z in reliquis æquationibus subrogetur, habebitur

$$\text{pro } 2^{\text{da}}. k + q y + y^3 - 2 w y \infty r$$

$$3^{\text{ta}}. l + y k + q w + y y w - w w \infty s$$

$$4^{\text{ta}}. y l + w k \infty t$$

$$5^{\text{ta}}. w l \infty v.$$

Per

Per 2^{am} fit $k \infty r - qy - y^3 + 2wy$, qui valor in locum ipsius k in reliquis æquationibus substitutus dat

pro 3^{ia}. $l + ry - qyy - y^4 + 3wyy + qw - ww \infty f$

$$4^{ia}. y l + rw - qwy - y^3 w + 2wyy \infty t$$

$$5^{ia}. w l \infty v.$$

Per 3^{am} fit $l \infty f - ry + qyy + y^4 - 3wyy - qw + ww$, qui valor in reliquis æquationibus substitutus dat

pro 4^{ia}. $fy - ryy + qy^3 + y^5 - 4wy^3 - 2qwy + 3wyy + rw \infty t$

$$5^{ia}. fw - ryyw + qyyw + y^4w - 3wyy - qww + w^3 \infty v.$$

Per 4^{am} æquationem invento valore ipsius ww (aut ipsius $3wy$), substituo ipsum in locum ww (aut $3wy$) in 5^{ta} æquatione, obtineoque 6^{am} æquationem, in qua w tantum 1 dimensionem habet, nimirum:

$$w \infty \frac{y^3 + 6qy^4 - 4y^5 + 5y^6 + qqq^4 - 5y^7 - ryy + qff - 9yy - qy + fy - r}{14y^8 + 8qy^8 + 5ry^3 + 2qqyy - 6fy + qry - 3y - r}.$$

Qui valor si jam in 4^{ta} æquatione in locum w subrogetur, habebitur pro ipsa

$$\begin{aligned} y^{11} &+ 4qy^{10} - 12y^{11} + 6qqy^{11} + 101y^{10} - 2qfy^9 + 12qfy^9 - 3ry^9 + 10fy^9 \\ &- 2f - 6qr - 16v + 6rf - 14qv - 3orv \\ &+ 4q^3 - 6qqr - 7ff + 2qqf \\ &+ 2qqf + 4qrf \\ &+ q^4 + 2r^3 - 2q^4r \\ &- 121ly^9 + 2qfy^9 - 5q11y^9 - 6r11yy - qq11y - qm \infty o. \\ &+ 6qrf - 6qrv + 7rft + 2rf + 3ft + 3 \\ &- 18qqv - 6rrt + 3rv + 4qrf + rrft \\ &- 6qff + 8rff + qqrt + 3qrv - r^3v \\ &- 6rrf - 2qqf - 4q^3v - 9rlv \\ &+ 2q^3f + 2qr^3 + qqff - r^3t \\ &+ 54fv - 18lv + 18qfv - rrf \\ &- 4f^3 \\ &- 2qrf \\ &- r^4 \\ &- 17vv \end{aligned}$$

Hæc autem æquatio ea est, quæ juxta Regulam erat quærenda, nempe in qua y designat quantitatem secundi Terminii hujus æquationis $xx + yx + w \infty o$, quæ una est duarum, ex quarum multiplicatione Proposita supponitur esse producta, quæque pauciores habet dimensiones.

Nunc verò inquirendum restat, num hæc æquatio divisibilis sit per $y + v$ vel aliquo divisore ultimi Terminii $-qrzt + r^3 + rrf - r^3v$; Si enim divisibilis sit, erit quoque w cognita, poterit-

teritque Propofita æquatio dividi per $xx + yx + w \infty 0$. Invenitur namque valor ipsius w per quartam æquationem

$$\frac{fy - ryy + qy^2 + y^3 - 4wy^2 - 2qwy + 3wyy + rw \infty f}{ww \infty \frac{1}{3}yyw + \frac{1}{3} \frac{-f + ry - qyy - y^3}{3}}.$$

Vel ipsa inveniri quoque potest per 5^{am} ; ut & per 6^{am} , cùm 5^{a} per 4^{am} non est divisibilis.

Quòd si jam hæc æquatio 15 dimensionum non fuerit divisibilis per $y +$ vel — aliquo divifore ultimi Termini, poterimus rursus eodem modo æquationem ejusdem formæ facere, supponendo Propositam esse productam per multiplicationem duarum aliarum, quæ singulæ 3 dimensiones habeant, investigando æquationem, in quâ incognita quantitas rursus designet quantitatem 2^{di} termini alterutrius harum æquationum. Hæc autem ascendet ad 20 dimensiones, sed ubique parium erit dimensionum; ita ut hîc divisio tunc exploranda sit per incognitæ quantitatis quadratum + vel — aliquo divifore ultimi Termini.

Haud secus si Propofita æquatio sit 5 aut 4 dimensionum, atque constet ipsam dividi non posse per aliam æquationem in qua unus pluresve Termini deficiant, nec per $x +$ vel — aliquo divifore ultimi Termini, erit ea divisibilis per æquationem 2 dimensionum, in qua omnes Termini extant. Itaque ex hac æquatione 5 dimensionum

$$x^5 + qx^3 + rxx + fx + t \infty 0,$$

si solummodo in operatione præcedenti ponamus $l \& v \infty 0$, inveniemus

$$\text{pro } 3^{\text{ia}}. ry - qyy - y^2 + 3wyy + qw - ww \infty f,$$

$$\& \text{pro } 4^{\text{ta}}. rw - qwy - y^3w + 2wyy \infty t.$$

Per 3^{iam} autem valor ipsius ww est $\infty ry - qyy - y^2 + 3wyy + qw - f$, qui valor in locum ipsius ww substitutus in 4^{ta} dabit

$$\text{pro } 5^{\text{ta}}. w \infty \frac{-2ryy + 2qy^2 + 2y^3 + 2fy + t}{r + 5y^2 + qy}.$$

Porrò subrogato hoc valore ubique in locum ipsius w in 3^{ia} , obtinebitur

$$\begin{aligned}
 y^{10*} + 3yy^8 - ry^7 + 3qqy^6 - 2qry^5 - 2qsfy^4 + 4sfy^3 - 4sfy^2 - 4sfy - 11\infty\infty \\
 - 3f^2 + 11t - rr + 4qt + 7rt + r^2 - rrf \\
 + q^2 - qqr + qqf + tqg + tqr \\
 - qrr
 \end{aligned}$$

Et hæc est æquatio quæ inservit dividendis æquationibus 5 dimensionum, quæ quærebatur.

Pro æquationibus autem quatuor dimensionum, utpote $x^4* + qxx + rx + f\infty 0$, concipiendo $k, l, t, & v \infty 0$, invenio

$$\begin{aligned}
 \text{pro } 2^{\text{da}}. & qy + y^3 - 2wy \infty r, \\
 \& \text{ pro } 3^{\text{ta}}. & qw + yyw - ww \infty f.
 \end{aligned}$$

Ponendo jam valorem ipsius $w \infty \frac{qy + y^3 - r}{2y}$ in 3^{ta} , obtinebitur

$$y^5 + 2qy^4 + qqyy - rr \infty 0.$$

Quæ æquatio erit divisibilis per yy , + vel — aliquo divisore ultimi Termini, atque æquatio Proposita $x^4* + qxx + rx + f\infty 0$ per $xx + yx + w \infty 0$, ut & per $xx - yx + z \infty 0$; hoc est,

$$\text{per } xx + yx + \frac{1}{2}q + \frac{1}{2}yy - \frac{r}{2y} \infty 0,$$

$$\& \text{ per } xx - yx + \frac{1}{2}q + \frac{1}{2}yy + \frac{r}{2y} \infty 0.$$

Vbi notandum, hanc Regulam, quâ omnes reducibiles æquationes Quadrato-quadrata reduci possunt, esse planè eandem cum illa, quam D. des Cartes pag. 79, 80, & 81 suæ Geometriæ descripsit. Nec dubitare possum, quin ipsam eodem modo, vel certè non multùm absimili invenerit; præsertim si ea, quæ pagin. 84 in genere de æquationum Reductione docuit, conferantur cum ipsius Methodo secantium, & quæ deinceps pag. 49 exposuit. Aded ut, iudicio meo, ne quidem verisimile videatur, imprimis si concinnam præcedentium cum sequentibus coherentiam spectemus, ipsum ex ullis aliis authoribus, ut nonnulli opinantur, eam desumpsisse. Quippe pro excellenti, quâ pollebat, animi generositate, (ut novisti & tu & quotquot ejus familiaritate usi sunt,) non modò nunquam tantopere animo indulgebat, sed parvus etiam hîc ejus tractatus tam varia profundæ & admirandæ eruditionis specimina summique ingenii inventa exhibet, & quæ

& quæ præ Antiquorum monumentis adeò sunt generalia, utilia, ac à vulgo remota, ut nemo, qui illum intellexerit atque ipsorum scripta cum hujus scriptis comparaverit, in hæc cogitationes incidere unquam possit; Quemadmodum nemo tam præposito est ingenio, ut fulgentem solis lucem à micantibus stellis derivandam arbitretur. Non tamen hic quicquam Veteribus detractum volo, dum eos micantibus stellis assimilo; credo enim stellas dari, quæ in se sint ipso etiam sole majores ac fulgidiores, quanquam non quidem nostrum respectu, qui terram inhabitamus. Namque inter illos, Archimedes imprimis ac Diophantus, multi que alii, qui superiori & hoc nostro sæculo vixerunt, viri celebres, magni certè apud me nominis & æstimationis sunt, ac suis etiam monumentis immortalem in omnes Posteris nominis gloriam promeritos lubentissimè fateor. At majorem post illos lucem mundo exortam esse, ipsi etiam, si reviviscerent, in nostro Cartesio non tantum agnoscerent, sed etiam sibi ex ejus lumine majus lumen accendere satagerent, aliosque ut illo potius, quàm suo uterentur, monerent: quia non modò jucundius sed tutius etiam in solis lumine vivitur, & per compendiosiores vias ad multò plura objecta pervenitur, eaque multò luculentius ac distinctius quàm in stellarum lumine oculis patent. Sed quid nudam veritatem tot verbis palliare conor, idque apud te, qui incomparabilem illum Virum, non tantum ex ipsius scriptis, sed præsertim ex intima familiaritate, quæ tibi cum eo à multis retrò annis intercessit, penitus pernovisti, quemquæ interea non semel maximo cum stupore admiratus es, cum videres eum quæstiones in Mathesi difficillimas è vestigio tantà promptitudine resolvere, ac si non difficilliores, quàm omnium facillimæ, ipsi fuissent, quæ nihilominus à præstantissimis etiam Mathematicis in ea usque tempora, aut non, aut non nisi maximâ cum perplexitate inveniri potuerant. Et cum te pœniteat, (uti aliquando coram ipse factus es) quòd non omnia, quæ ullo unquam tempore ex ejus ore emanarunt, fideliter chartis mandata custodieris, id mihi satis amplum testimonium est, unde certus sim, tibi, ut mihi, ne quidem verisimile fieri posse, Illum hanc Reductionis Regulam ex aliorum scriptis ad se potius transulisse, quàm ex propriis fundamentis, sæcundissimis illis omnium scientiarum seminariis, eruisse atque invenisse. Sed de his satis.

Iam ad Regulam revertar, & paucis innuam, quòd ex operatione hìc factâ eluceat generalis Methodus tollendi ordine omnes, quæ quidem possunt, quantitates incognitas, vel eas quæ ut incognitæ considerantur; quod, meo quidem iudicio, magni usus est, cum sæpenumero quæstiones difficiliore, unam tantum incognitam quantitatem supponendo, aut non resolvi posse, aut multo majori labore, aut certè ad eas resolvendas alias vias quàm hactenus imitari consuevimus ineundas esse, deprehenderim; quod etiam Cartesium nostrum non latuisse ex pag. 4, aliisque passim locis luculenter constat. quod nihilominus haud ita pridem ab insigni Mathematico in dubium revocari comperi, cuius rei causam hanc conjicio, quòd in aliorum scriptis magis quàm in hujus versatus fuerit. Dixi autem hanc Regulâ tolli eas quantitates, quæ quidem tolli possunt: non enim semper omnes possunt, neque etiam unâ exceptâ, neque duabus, &c. Nam si quæstio non sit Theorema, omnes tolli nequeunt; & si determinata sit, omnes unâ exceptâ tolli possunt; si verò una deficiat conditio, quòd minùs determinata existat, omnes tolli queunt duabus exceptis, & sic deinceps, ut nosti. Neque, quod sedulò observo, etiam semper per quamlibet æquationem una quantitas incognita tolli potest. Exempli gratiâ, in duabus hisce æquationibus

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 3zx + bbx - zzb = 0, \\
 + bz - zbb \\
 + zzz \\
 \& x^3 - 4zx + zbx - zzb = 0, \text{ in quibus } x \& z \text{ duas} \\
 + 4zz - zbb \\
 + bb
 \end{array}$$

incognitas quantitates designant, potest x vel z per neutram ex altera tolli. Quod, ubi accidit, indicio est, Problema, è quo hæc duæ æquationes fuerunt deductæ, si omnes ejus conditiones includant, non determinatum esse, atque unam in eo conditionem, ut prorsus determinatum sit, deficere. Non rarò etiam licet in resolvendo aliquo Problemate determinato diversas invenire æquationes, unam eandemque incognitam quantitatem habentes, idque magno cum emolumento. Sed de his aliàs.

Porro quomodo easdem Regulas aliâ adhuc Methodo inveniam, breviter adjungam.

Sit

Sit æquatio Propofita, ut ante,

$$x^6 + qx^4 + rx^3 + fxx + tx + v \infty 0,$$

& inquiretur num dividi poffit per æquationem duarum dimensionum cui nullus terminus defit, pone per $xx + yx + w \infty 0$. fi itaque per eam divifibilis fit, erit $xx \infty -yx - w$, quo valore ipsius xx , ubique in locum xx fubrogato, refultabit æquatio in qua x unam tantum habebit dimensionem, nimirum

$$\begin{array}{rcl} -3wxyx - w^3 & \infty & 0. \\ -y^5 & - & wy^4 \\ +4wy^3 & + & 3wxyy \\ -qy^3 & + & qww \\ +2qwy & + & rwy \\ -rw & - & fw \\ +yyr & - & qwy \\ -fy & + & v \\ +t & & \end{array}$$

Deinde pono fingulos terminos $\infty 0$, aded ut tum habeas has duas æquationes,

$$-3wxy - y^5 \&c. \infty 0. \quad \&, \quad -w^3 - wy^4 \&c. \infty 0.$$

eafdem quæ præcedentes 4^a & 5^a; Ita ut w , eodem quo ibi modo, ablata, eandem tandem æquationem nancifcaris

$$y^{15} + 4qy^{13}, \&c. \infty 0$$

Eodem modo fe res habet in reliquis.

Illud verò notandum eft, hanc pofitionem $xx - yx - w \infty 0$ feu $xx \infty yx + w$ paulò faciliorem reddere operationem, cum in fubrogatione valoris ipsius xx non opus fit ut figna mutantur, quod alioqui fecundum priorem pofitionem $xx + yx + w \infty 0$ contingit: Itaque hæc pro illa potiùs eft eligenda. Et quod hanc non elegerim, ideo factum eft, ut idem effectus utriufque methodi evidentiùs pateret. Eodem modo, fi præcedens æquatio inquirenda effet, num dividi poffet per æquationem trium dimensionum, in qua nullus terminus deficiat, ponerem illam $x^3 \infty yxx + wx + z$, fed non $x^3 + yxx + wx + z \infty 0$, quemadmodum, fi aliam Methodum fequerer, facturus effem.

Supervacaneum verò est me dicere, has tres præcedentes Regulas æquationum 6, 5, & 4^{or} dimensionum, (quamvis illæ tanquam exemplum generalis Regulæ in medium allatæ sint) se extendere ad omnes casus: nam cum q denotet quantitatem cognitam tertii termini Propositæ æquationis, affectam suis signis + & —; manifestum est in Regulis valorem ipsius q tantum subrogandum esse in locum q ; vel si fortè tertius hic terminus in æquatione deficiat, omnes quantitates per q multiplicatas, cum etiam tum sint $\infty 0$, delendas esse. ita quoque se res habet in r , f , & t . Verbigratiâ, si hæc æquatio 5 dimensionum $x^{10} + 6xx - 25x - 39 \infty 0$ divisibilis esset per rationalem duarum dimensionum, in qua nullus terminus deest; Oportet, cum in hac æquatione q sit $\infty 0$, $r \infty 6$, $f \infty -25$, $t \infty -39$, loco huius $y^{10} + 3qy^8 - ry^7$ &c. $\infty 0$, scribere hanc $y^{10} + 6y^7 + 75y^6 - 429y^5 - 36y^4 - 600y^3 - 4138y^2 - 3684y - 621 \infty 0$. quâ invenitur $\infty -1$, ideoque $w \infty \frac{-2ry^7 + 2qy^1 \&c.}{r + 5y^1 + qy} \infty -3$; & pro

$xx + yx + w \infty 0$, hæc $xx - 1x - 3 \infty 0$, per quam Proposita æquatio erit divisibilis. atque ita in reliquis. Adeò ut hinc pateat, sicut etiam in 17^{ma} aliisque Regulis, quomodo omnes casus æquationum æqualium dimensionum, sive aliqui termini desint, sive non, vel quo tandem modo signis + & — affecti sint, sub una eademque Regula comprehendi possint, adeò ut sexcenti ejusmodi casus ad unum referri & multi labores rescindi queant. Quod satis superque Regula æquationum 4 dimensionum, cum omnibus casibus, quos aliqui elaborarunt, comparata, immensusque labor, quem illis hoc negotium peperit, demonstrant; præsertim si eâdem ratione omnes casus æquationum 5 & 6 dimensionum describere vellent.

Denique notandum, cum dico, primùm inquirendum esse num æquatio Proposita dividi possit per aliam in qua omnes termini non extant, non adeò rigidè illud sequendum esse; non enim id necessarium, sed plerumque brevissima via est ad æquationem Propositam reducendam.

XX. REGULA,

Quæ modum docet reducendi omnem æquationem rationa-

tionalem & dimensionum, fractioneque carentem, 2^a verò termino, si adsit, manente, ad aliam trium, & hanc iterum, si fieri potest, ad alias pauciorum dimensionum.

Postquam exploratum est æquationem Propositam non esse divisibilem per aliam, duos duntaxat terminos habentem, inveniendus est valor hujus æquationis

$$y^3 - qyy - 4sy - spp \infty 0. \\ + pr + 4qs \\ - rr$$

ubi p designat quantitatem cognitam, suis signis + vel - adfectam 2^{di} termini; q , tertii; r , quarti; s , quinti. Invento autem valore ipsius y , poterit æquatio Proposita ejusdem ope dividi in duas æquationes sequentes, quæ singulæ duas dimensiones habent, nimirum in

$$xx + \frac{1}{2}px + \sqrt{\frac{1}{2}pp - q + y} \text{ in } x, + \frac{1}{2}y + \frac{\frac{1}{2}yp - r}{2\sqrt{\frac{1}{2}pp - q + y}} \infty 0,$$

$$\& xx + \frac{1}{2}px - \sqrt{\frac{1}{2}pp - q + y} \text{ in } x, + \frac{1}{2}y - \frac{\frac{1}{2}yp - r}{2\sqrt{\frac{1}{2}pp - q + y}} \infty 0.$$

Quòd si verò valor ipsius y non sit æqualis alicui ex divisoribus ultimi termini $- spp + 4qs - rr$, non poterit æquatio Proposita ulterius quàm ad tres dimensiones reduci.

Exempli gratia, si reducere velimus æquationem $x^4 - 2x^3 - 2xx - 2x + 1 \infty 0$, quæ per æquationem, duos solummodo terminos habentem, est indivisibilis, invenio

$$y^3 - qyy - 4sy - spp \infty y^3 + 2yy^* - 16 \infty 0. \\ + pr + 4qs \\ - rr$$

(nam $p \infty -2$; $q \infty -2$; $r \infty -2$; $s \infty 1$). quæ dividi potest per $y - 2 \infty 0$, ita ut loco duarum æquationum habeantur hæ duæ $xx - 1x + 1 \infty 0$, & $xx - 1x + 1 \infty 0$.

$$+ \sqrt{5} \quad - \sqrt{5}$$

Eodem modo si habeatur æquatio $x^{**} - 12x - 5 \infty 0$, ob-
tineo

$$\begin{aligned} \text{tineo } y^4 + 20y - 144 \infty 0, \text{ pro } y^4 - qyy - 4fy - spp \infty 0 \\ + pr + 4qf \\ - rr \end{aligned}$$

(nam $p \infty 0, q \infty 0, r \infty -12, f \infty -5$.) quæ divisibilis est per $y - 4 \infty 0$, ita ut loco duarum æquationum habeas has duas

$$\begin{aligned} xx + 2x + 5 \infty 0, \\ \& xx - 2x - 1 \infty 0. \end{aligned}$$

Similiter si proponatur æquatio literalis

$$x^4 - 2ax^3 + 2aaxx - 2a^3x + a^4 \infty 0, \text{ erit } p \infty -2a;$$

$$\begin{aligned} q \infty 2aa - cc; r \infty -a^3; f \infty a^4, \text{ ideoque in locum æquationis} \\ y^4 - qyy - 4fy - spp \infty 0, \text{ scribenda } y^4 - 2aayy^2 - 4a^4cc \infty 0, \\ + pr + 4qf \\ + cc \\ - rr \end{aligned}$$

quæ dividi potest per $y - 2a \infty 0$, ita ut loco duarum æquationum habeantur hæ duæ

$$\begin{aligned} .xx - ax + x\sqrt{aa + cc}, + aa \infty 0, \\ \& xx - ax - x\sqrt{aa + cc}, + aa \infty 0. \end{aligned}$$

Si verò hæ æquationes per $y + \text{vel} -$ aliquo divisore ultimi Termini non fuissent divisibiles, non potuissent etiam æquationes Propositæ ulterius quàm ad 3 dimensiones reduci.

XXI. REGULA.

Hactenus Regulæ, quas tradidi, respexerunt æquationes, in quibus una tantum incognita quantitas, quam x nominavi, inveniebatur, ut meos conceptus distinctius exprimerem. Iam uno adhuc verbo adjiciam: *Quod in Proposita æquatione quamlibet cognitam pro incognita & vice versa quamlibet incognitam pro cognita respectu Reductionis considerare liceat; & quod sæpe compendio sit incognitam tanquam cognitam & unam ex cognitis tanquam incognitam considerare & sic Reductionem inquirere.* Nam primò in omnibus æquationibus, quæ ex duabus rationalibus oriri possunt, quæ per quamlibet cognitam, eam tanquam incognitam considerando, quàm per incognitam reductio inveniri potest, & sæpe etiam brevius, si ex solis irrationalibus produci possunt. Dein quòd hoc sæpe compendio sit, vel
hinc

hinc manifestum sit, quia rarò admodum omnes literæ eundem dimensionum numerum habent, atque adco, si aliquam ex cognitis pro incognita consideres, sæpe quoque aliqua æquatio exturget, quæ pauciorum sit dimensionum quàm Proposita; & adhuc pauciorum, si etiam inter ipsas cognitæ delectum instituas; aut saltem reduciò hoc vel illo modo facilius evadet.

Considerando itaque omnes sine discrimine literas ut cognitæ, ejusmodi ex illis eligere & pro incognita supponere integrum erit, quæ ad reductionem facillimè expediendam (per præcedentes Regulas) maximè conducere judicabitur. Et hæc omnium, quas tradidi, Regularum, respectu Reductionum, utilissima est.

Et per eam non tantum Reductiones ultimarum æquationum, quæ omnes Propositi Problematis conditiones includunt, ope Regularum supra explicatarum sæpe compendiosissimè inveniuntur, sed etiam priusquam ad ultimam deveniatur, quam plurimæ reductiones rescindi & simplicissimæ sæpe æquationes haberi possunt. Et quidem operæ pretium foret, rem hanc aliquot exemplis clariorem reddere, sed ne te atque etiam me diutius remorer, unum tantum & alterum exemplum adjungam.

Quo modo reducere possis omnem rationalem æquationem, quæ per aliam rationalem, non cognitæ ultimi Termini divisoribus, dividi queat, remanente etiam, si placet, omni Fractione, quæ in illa reperitur; nimirum, si in æquatione illa aliqua litera, sive cognita, sive incognita reperiatur, secundum quam æquatio ordinata non plures quàm quatuor dimensiones habeat; seu in qua litera aliqua reperitur non plures habens quàm 1, vel 1 & 2, vel 1, 2, & 3, vel 1, 2, 3 & 4 dimensiones, vel etiam plures, sed quæ ex his derivari possint: Id quod semper ex investigatione valoris hujus literæ, quæ vel incognita est, vel ut incognita consideratur, innotescit, uno tantum casu excepto, quem postea indicabo.

1. *Exemplum*, in quo litera *b* ubique unam tantum dimensionem habet.

Est α quatio Proposita $x^4 - 2ax^3 + 4axx + a^3x - a^4 \infty 0$
 $\quad \quad \quad + b \quad \quad - ab \quad \quad \quad + ba^3$

Ergo $bx^3 - abxx + ba^3 \infty -x^4 + 2ax^3 - aaxx - a^3x + a^4$
 div. per $x - ax + a^3$. $\quad \quad \quad$ fit $b \infty -x + a$
 $\quad \quad \quad$ & $x - a + b \infty 0$. Aequatio, per
 quam Proposita dividi potest.

2 *Exemplum*.

Est α quatio Proposita $x^3 - 20bxx + 60aax - 120a^3 \infty 0$
 $\quad \quad \quad - 2a \quad + 70ab \quad - 60aab$

Ergo $-20bxx + 70abx - 60aab \infty -x^3 + 2axx - 60aax + 120a^3$
 div. per $-10xx + 70ax - 60aa$. $\quad \quad \quad$ fit $b \infty \frac{-x^3 + 2axx - 60aax + 120a^3}{-10xx + 70ax - 60aa}$. Hujus

autem maximus communis divisor, per Methodum ante descri-
 ptam, est $x - 2a$, per quem si fractio abbreviatur,

$$\text{fiet } b \infty \frac{-xx - 60aa}{-10x + 30a}, \text{ vel } \frac{xx + 60aa}{10x - 30a}$$

feu, quod idem est, $xx - 20bx + 30ab \infty 0$. Ita ut α quatio
 $\quad \quad \quad + 60aa$

Proposita in hanc, & praecedentem $x - 2a \infty 0$ divisa sit.

- 3 *Exemplum*, in quo quantitas *c* tantum
 1 & 2 habet dimensiones.

Est α quatio Proposita $x^4 + 8acxx - 4aacx + 12aac \infty 0$
 $\quad \quad \quad - aa$

Ergo $12aac \infty -8acxc - x^4$
 $\quad \quad \quad + 4aacx + aaxx$
 div. per $12aa$. $\quad \quad \quad$ fit $c \infty \frac{4ax - 8xx}{12a}$ in c , $+$ $\frac{aaxx - x^4}{12aa}$

Vnde extracta radice invenietur

$$c \infty \frac{ax - xx}{1a}, \text{ hoc est, } xx - ax + 2ac \infty 0$$

$$\text{vel } c \infty \frac{-ax}{6a}, \text{ hoc est, } xx + ax + 6ac \infty 0.$$

Ita ut α quatio Proposita in hasce duas sit divisa. Quoniam au-
 tem

tem in ea a quoque 1 & 2 tantum dimensiones habet, potuisset idem etiam querendo valorem ipsius a investigari.

Vbi notari potest, quod, ad inveniendas radices alicujus æquationis, in quâ litera, cujus valor queritur, non plures habet dimensiones quàm 1 & 2, vel 2 & 4, vel 3 & 6, &c. scire non sit necesse, cujusnam illa sequentium formularum existat.

$$xx - ax + bc \infty 0$$

$$xx + ax + bc \infty 0$$

$$xx + ax - bc \infty 0$$

$$xx - ax - bc \infty 0.$$

Etenim posita $xx, px, q \infty 0$, si p statuatur pro z^6 , & q pro ultimo termino, erit semper $x \infty -\frac{1}{2}p \sqrt[3]{\frac{1}{2}pp - q} \infty 0$.

4 Exemplum.

Porro quoniam æquationes omnes quatuor dimensionum reduci possunt ad æquationes trium dimensionum, & in omnibus quidem æquationibus secundus terminus tolli potest, ostendendum solummodo restat, quò pacto divisores æquationis inveniri queant, in quâ incognita quantitas, vel alia quævis litera, quæ ut incognita consideratur, tantum 1 & 3 dimensiones habet. In quem itaque finem proponatur æquatio $x^3 \infty * qx.r$.

In qua x designet quantitatem, cujus valor queritur; q & r autem quantitates cum suis signis, quales illæ in æquatione reperiuntur.

Esto etiam $x \infty y + z$

Eritque $x^3 \infty y^3 + 3zyy + 3zzz + z^3 \infty qx + r$.

Ex hac autem æquatione fiant jam duæ aliæ, ponendo

$$\begin{array}{ll} 3zyy + 3zzz \infty qx, & \& y^3 + z^3 \infty r \\ \text{div. per } y + z. & \text{fit } 3zy \infty q \quad \text{vel } y^3 \infty r - z^3 \end{array}$$

$$y \infty \frac{\frac{1}{3}q}{z}$$

$$y^3 \infty \frac{\frac{1}{27}q^3}{z^3} \infty r - z^3$$

$$\begin{array}{l} z^3 \infty \frac{1}{27}r \sqrt[3]{\frac{1}{2}rr - \frac{1}{27}q^3}, \\ \& y^3 \infty \frac{1}{27}r \sqrt[3]{\frac{1}{2}rr - \frac{1}{27}q^3}, \text{ quia } y^3 \infty r - z^3 \\ \text{R r r } 2 \quad \quad \quad \text{vel} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \text{vel } y &\propto \frac{\frac{1}{2}q}{\sqrt{C. \frac{1}{2}r 8 \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}}}, \text{ quia } y \propto \frac{\frac{1}{2}q}{z} \\ &\& x \propto \sqrt{C. \frac{1}{2}r 8 \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}} + \sqrt{C. \frac{1}{2}r 8 \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}}, \\ &\quad \text{quia } x \propto z + y \\ \text{vel } x &\propto \sqrt{C. \frac{1}{2}r 8 \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}} + \frac{\frac{1}{2}q}{\sqrt{C. \frac{1}{2}r 8 \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}}}. \end{aligned}$$

Quoniam verò in prima parte prioris valoris ipsius x reperitur signum 8 , & in secunda signum contrarium 8 , atque quantitates per ea conjunctæ omnino eadem existunt; & quoniam ad obtinendum valorem ipsius x , duæ illæ partes simul addi debent; poterunt ipsa determinari, ponendo pro uno $+$, & pro altero $-$, ita ut habeatur

$$\begin{aligned} x &\propto \sqrt{C. \frac{1}{2}r + \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}} + \sqrt{C. \frac{1}{2}r - \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}}, \\ \text{vel } x &\propto \sqrt{C. \frac{1}{2}r + \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}} + \frac{\frac{1}{2}q}{\sqrt{C. \frac{1}{2}r + \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}}}. \end{aligned}$$

Quocirca querendo juxta hanc Regulam valorem quantitatis x , licebit ipsius beneficio æquationem, si reducibilis sit, in duas rationales dividere: quoniam tunc $\sqrt{C. ex \frac{1}{2}r + \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}}$ extrahi poterit, excepto tantum, quando quantitate q signo $+$ affecta, $\frac{1}{4}rr$ minor est quam $\frac{1}{27}q^3$.

Vbi difficultas aliqua superesse videtur in radicis Cubicæ ex binomiis hisce extractione; sed cum $\sqrt{C.}$ ex binomio numerali ope Regulæ pag. 389 extrahiqueat, poterit etiam ejusdem beneficio radix ex binomio literali inveniri, cum pro literis numeros ad arbitrium assumere liceat, &c.

Quantquam autem sæpenumero in reducendis æquationibus hujus quarti exempli contingat, ut Quæsitum per aliquam ex aliis Regulis facilius inveniatur, poterit tamen interdum hæc Regula, præsertim in æquationibus numeralibus, ubi divisores ultimi Terminii complures existunt aut difficiles sunt inventu, cum fructu usurpari.

Quibus præmissis, potero generalem Regulam commodiùs exprimere, quæ talis est:

Si in æquatione Proposita, quæ in duas alias rationales est divisibilis, quærat^{ur} valor quantitatis incognitæ
vel

vel alicujus alterius, quæ ut incognita consideratur, poterimus ipsam aut dividere (sicut in 1^{mo} exemplo); aut fractionem inde ortam per communem aliquem divisorem abbreviare (sicut in 2^{do} exemplo) aut denique radicem quadratam (sicut in 3^{io} exemplo) aut radicem cubicam extrahere, excepto tantum, ut diximus, uno casu, ubi q designat quantitatem signo + adfectam, existente $\frac{1}{4}rr$ minore quàm $\frac{1}{27}q^3$.

Vbi tandem id advertendum, Regulam hanc in resolvendis æquationibus trium & quatuor dimensionum eandem esse cum illa Cardani, cujus inventionem Scipioni Perreo tribuit; ita ut ex superiori calculo manifestum sit quòd ea Regula, quamvis ille author ex alio fortè fundamento eam eruerit, hoc tamen etiam modo inveniri possit. Hanc verò eandem esse, vel hinc evidens fit, si ex illa sola conficiamus hasce quatuor, quippe ponendo quantitates q & r signo + adfectas esse, obtinebimus, existente $x^3 \infty + qx + r$,

$$x \infty \sqrt[3]{C. \frac{1}{2}r + \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}} + \sqrt[3]{C. \frac{1}{2}r - \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}}.$$

Si q designet quantitatem signo +, r autem quantitatem signo — adfectam, obtinebimus, existente $x^3 \infty + qx - r$, (mutando tantum in Regula signa, quæ ipsi r impares dimensiones habenti præfiguntur)

$$x \infty \sqrt[3]{C. -\frac{1}{2}r + \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}} + \sqrt[3]{C. -\frac{1}{2}r - \sqrt{\frac{1}{4}rr - \frac{1}{27}q^3}}.$$

Si q designet quantitatem signo —, & r signo + adfectam, obtinebimus, existente $x^3 \infty - qx + r$, (mutando signa, quæ ipsi q impares dimensiones habenti præfiguntur)

$$x \infty \sqrt[3]{C. \frac{1}{2}r + \sqrt{\frac{1}{4}rr + \frac{1}{27}q^3}} + \sqrt[3]{C. \frac{1}{2}r - \sqrt{\frac{1}{4}rr + \frac{1}{27}q^3}}.$$

Denique si q & r signo — sint adfectæ, obtinebimus, existente $x^3 \infty - qx - r$, (mutando signa, ut supra)

$$x \infty \sqrt[3]{C. -\frac{1}{2}r + \sqrt{\frac{1}{4}rr + \frac{1}{27}q^3}} + \sqrt[3]{C. -\frac{1}{2}r - \sqrt{\frac{1}{4}rr + \frac{1}{27}q^3}}.$$

Et nota, quòd eodem modo operando similes regulæ pro altioribus æquationibus inveniri possint.

2. Sed cum Methodus hæc reducendarum æquationum, ubi incognita quantitas, vel quæ ut incognita consideratur, trium vel

quatuor dimensionum est, aliquando paulò longior sit, præstat
tunc ejus loco vigesima Regulâ uti, per quam omnes casus trium
vel quatuor dimensionum, nullo excepto, reduci possunt; Vel
etiam regulâ 17, ubi non adstringeris æquationibus quatuor di-
mensionum, sed omnes rationales, quæ per aliquam rationalem
æquationem dividi queunt, reducere poteris, atque aded etiam
omnem Propositam rationalem æquationem, quæ per aliquam
rationalem divisibilis est, si modo aliqua litera, quam libuerit,
tanquam incognita, & reliquæ omnes ut cognitæ considerentur.

3. Sæpe autem satis breviter Reductio æquationum, quæ tan-
tummodo per irrationales reduci possunt, inveniri potest. exem-
pli gratiâ, si habeas hanc æquationem,

$$x^4 - 2ax^3 + 2aaxx - 2a^3x + a^4 \infty 0$$

$$\text{vel } x^4 - 2ax^3 + 2aaxx - 2a^3x + a^4 \infty ccxx$$

addas utrimque quantitatem aliquam per xx multiplicatam, (cum
ab altera parte habeas cc in xx) talem nempe ut $\sqrt{\text{quadrata ex}}$
altera parte extrahi possit, quod statim per extractionem reperies
esse $+aaxx$, ideoque utrimque hac $+aaxx$ addita, & radice
quadrata extractâ invenies

$$xx - ax + aa \infty x \sqrt{aa + cc}$$

atque ideo Proposita æquatio ex multiplicatione duarum sequen-
tium æquationum resultare poterit

$$xx - ax + aa \infty 0.$$

$$- \sqrt{aa + cc}$$

$$xx - ax + aa \infty 0.$$

$$+ \sqrt{aa + cc}$$

4. Magnum quoque usum habent aliz quædam Regulæ, tam
in reducenda æquatione, quæ per rationales, quam quæ tantum-
modo per irrationales reduci possunt. ex. gr. per 11 Regulam,
omnes æquationes reduci poterunt, quæ non tantum ex duabus
aliis per multiplicationem produci possunt, in quarum alterutra,
unus pluresve termini deficiunt, si æquatio consideretur secun-
dum incognitam quantitatem, sed etiam si tantum quævis alia li-
tera, sive cognita, sive incognita, reperitur, quæ ut incognita
consideratur, & æquatio secundum illam in ordinem redacta ta-
lis sit, ut ex duabus aliis produci possit, in quarum alterutra unus

plu-

pluresve termini deficiunt. sic quamvis sequens æquatio 6 dimensionum

$$\begin{array}{r} x^3 - 2axx + 3abx + 6a^3 \propto 0 \\ \quad \quad \quad + 6abb \\ \text{per } x^3 + 2axx + 4aa - 4a^3 \propto 0 \\ \quad \quad \quad + 2ab - 8b^3 \end{array}$$

Product. x^6 , &c.

produci non possit ex duabus alijs, in quarum alterutra unus vel plures termini deficiunt, si scilicet x ut incognita quantitas consideretur, poterit tamen ex duabus talibus produci, si vel a vel b ut incognita quantitas consideretur, ut ex æquationibus, ex quibus producta est, patet; ac proinde æquatio illa Proposita per XI Regulam reduci poterit.

Hic ergo hanc Regulam abrumpam, & celeriori in sequentibus gradu ad finem, quem jam dudum desidero, festinabo.

Diversas adhuc alias Regulas in paratu habeo, quas hic simul adjungerem, si non aliquid in futurum reservare animus esset: Nimirum inter cæteras una est, per quam omnes irracionales radices tam numeralium, quàm literalium æquationum invenio; una per quam omnes æquationes numerales, quæ ex duabus rationalibus produci possunt, ad easdem reduco, non cognitis divisoribus ultimi termini; item alia, per quam sæpe literales æquationes reduco, quæque in eo consistit, quòd unam aut alteram literam ponam $\propto 0$, vel \propto alii alicui quantitati, quam libuerit, & quòd hanc æquationem inde resultantem priùs reducere coner, & postea etiam Propositam per hanc. Exempli loco adjungam hanc

REGVLA M,

Quæ omnes rationales æquationes, quæ nullas fractiones continent & reduci possunt, reducuntur, si ponendo unam aut plures literas $\propto 0$, aut \propto alii quam libuerit quantitati, talis inde æquatio resultet, quæ una tantùm dimensione minor & irreducibilis sit.

Ex. gr. habeatur hæc æquatio $x^3 - 5axx + 6bbx - 18abb \propto 0$,
 $- 9bc - 9a^3$
 $- 9aa + 27abc$

in

in qua si a ponatur $\infty 0$, exsurgit hæc

$$x^3 + 6bbx - 9bcx \infty 0$$

seu $xx + 6bb = 9bc$ $\infty 0$, quæ non potest reduci.

Regula verò per quam reductionem Propositæ æquationis jam instituo, talis est:

Dividantur per ultimum terminum exortæ æquationis, si non ex diversis partibus aut Membris constet, (partes aut Membra eas nōmino quantitates, quæ in eodem termino signis + vel — cæteris connectuntur) vel aliàs per unum membrum ultimi termini quodcunque libuerit, (quemadmodum hic per + 6bb, vel — 9bc) omnia Membra ultimi termini Propositæ æquationis, quæcunque per illud dividi possunt, atque illud quotiens, sive unum sive plura fuerint, addatur quantitati x, & per hanc summam Propositæ æquatio dividi poterit.

Vt in hoc exemplo, dividendo — $18abb$ per + $6bb$, exsurgit quotiens — $3a$, quod additum ipsi x , quia in Propositæ æquatione inter membra ultimi termini nullum aliud habetur, quod per + $6bb$ sit divisibile, exsurgit $x - 3a$, quod Propositam æquationem dividere poterit. Vel si alterum exortæ æquationis Membrum assumptum fuisset, nimirum — $9bc$, similiter prodiiisset — $3a$, quia solum + $27abc$ inter Membra ultimi termini in Propositæ æquatione reperitur, quod per — $3a$ dividi potest.

Nota, quòd per hanc methodum, dum literam unam aut plures pono $\infty 0$, vel ∞ alicui quantitati, quam libuerit, non tantum rationales literalium æquationum radices, sed etiam irrationales tam literalium quàm numeralium æquationum inveniri possint. Nam etiam Regulæ, quarum ope quarundam Cubicarum æquationum radices investigantur, quas Cardanus Authori Scipioni Ferro asseribit, hæc etiam methodo inveniri possunt, quæ alia est, quàm quæ in 21 Regula ostensa fuit.

Hactenus æquationes absolutè tantum consideravi, nunc superest, ut eas etiam relativè, quatenus referuntur ad Problema, ex quo educuntur, considerem.

Sed priusquàm hoc aggrediar pauca quædam de iis Regulis, quas hucusque tradidi, dicenda restant. Illæ verò sunt duorum generum, quædam enim aliquibus in casibus docent Propositam æqua-

æquationem *vel non esse reducibilem, vel in quantum, vel per quales non sit reducibilis*, ut Regula 1, 2, 12, 13, & 14, & 15. quædam etiam docent, *quo pacto æquationes reduci debeant, quas scimus reducibiles esse, vel per aliquam in qua aliquis terminus datus, aut ∞ est, quales sunt 9 & 11, vel per aliquam rationalem*, ut sunt 16 & 17, *vel denique per alias*. Sed quia sæpe latet, utrum Proposita æquatio, vel quæ ex Problemate quodam educta est, reducibilis sit, nec ne, ad hoc inquirendum aliquis ordo observandus est. Et quem harum Regularum respectu optimum judico, talis est: Inquirerem primò ope priorum Regularum annc æquatio sit irreducibilis; quod in æquationibus irreducibilibus primo plerumque intuitu apparet, aut saltem magna ex parte; adeo, ut multi labores tali in casu præscindantur. At si hoc non ita apparet, transirem ad Regulam XI, (imprimis si Ultimæ æquationis terminus multos divisores, vel qui inventu difficiles sint, admittat, vel si æquatio surdas quasdam aut fractas quantitates contineat) per quam omnes æquationes reduci possunt, quæ divisibiles sunt ope alterius in qua una aut plures quantitates desunt, sive æquationem in ordinem redigas respectu incognitæ, sive respectu alicujus cognitæ, quæ ut incognita consideratur.

Et sic omnes præne literales & reducibiles æquationes, ut & quàm plurimæ numerales reduci possunt. Si verò nec hoc pacto succedat Reductio, eam per cæteras Regulas inquirerem.

Possunt etiam hîc quædam adjungi de signis, ex quibus cognoscitur sitne aliqua æquatio reducibilis nec ne; Verùm cum hoc unum sit ex primariis rei capitibus, plus otii & patientiæ, quam quidem in præsentiarum mihi suppetit, ad id requiritur.

Quod igitur alteram partem Reductionum concernit, quæ refertur ad Problema, ex quo æquatio est deducta, multa adhuc dici possent, tam de ultimæ æquationis (in qua omnes Problematis conditiones includuntur) Inventione, quâ omnes aut saltem multæ Reductiones rescindi queunt; quàm de aliis Reductionibus, quæ sæpe illis supra descriptis breviores existunt. Nam quod primum attinet, experientia docet in omnibus ferè Problematis multos esse, eosque diversos modos ultimam æquationem inveniendi, & ad pauciorum dimensionum æquatio-

nem, si hunc, quàm si alium modum sequaris, perveniendi. Imò non tantum diversâ, sed etiam eâdem methodo utendo, tandem in æquationem plurium aut pauciorum dimensionum pervenies. Atque ita breviori ac faciliori viâ non tantum multum laboris inveniundo postremam æquationem præteribis, sed etiam reductiones valde inventu difficiles, quæ alioqui, si ad altiores æquationes delabaris, quærendæ essent, rescindes.

*Vide Sectionem
XXI
tuarum
Exercitationum
Mathematicarum.*

Quod alterum spectat, ejus à me specimen habes, ubi nempe æquationes omnium figurarum ordinatarum circulo inscriptarum inveniuntur, in eo nempe consistens, quòd cum ultimam æquationem, quæ omnes Problematis conditiones includit, habeas, præterea adhuc aliam, sed aliâ methodo, investiges, quæ itidem omnes conditiones comprehendat, ad eò ut, cum duas æquationes eandem incognitam quantitatem includentes obtinueris, ipsas à se invicem tam diu, quàm fieri possit, subtrahas, vel quòd eodem redit, earum communem divisorem invenias, quemadmodum tunc in inveniendis illis æquationibus satis fuscè ostendi.

Et hujus Methodi utilitas se longè lateque diffundit, præsertim ad Problemata difficiliora, quorum æquationes ad plures dimensiones excurrunt. Nam sæpe numero, si earum reductionem per præcedentes Regulas investigares, ætatem consumeres, quòd alioquin, si hanc viam sequaris, breviter, & ut ita dicam, uno momento absolvere posses.

Cum igitur utrumque & Reductiones in principio in totum vel ex parte rescindendi, & eas in multis casibus adhuc commodius quàm per præscriptas Regulas inveniendi, majoris momenti sit, quàm ut hic dignè pertractari possit; atque ego etiam scribendo, tu verò legendo, defessi simus: præstat, ut hic substitamus atque aliquantulum respiremus, reliquæque opportuniore tempore reservemus.

Interim vale & me ama.

*Datum Amstelædami Pridiæ
Iduum Julii A° 1657.*

IOHANNIS HVDDENII
EPISTOLA SECVNDA,

D E

MAXIMIS ET
MINIMIS.

Clarissime Vir,



*Vod attinet meam Methodum de Maximis
& Minimis, cam breviter hic describere
conabor; & in antecessum demonstrabo hoc*

T H E O R E M A.

Si in æquatione duæ radices sint æquales, atque ipsa multiplicetur per Arithmeticam Progressionem, quam libuerit; nimirum, primus terminus æquationis per primum terminum Progressionis, secundus terminus æquationis per secundum terminum Progressionis, & sic deinceps: dico Productum fore æquationem, in qua una dictarum radicum reperietur.

In hunc finem assumatur æquatio quælibet, in qua x designet quantitatem incognitam, ut, verbi gratiâ, hæc æquatio

$$x^3 + px + qx + r = 0$$

ipsaque multiplicetur per $xx - 2yx + yy = 0$, id est, per æquationem, in qua duæ radices sunt æquales, & habebitur hæc æquatio

$$\left. \begin{array}{l} xx - 2yx + yy \text{ in } x^3 \\ xx - 2yx + yy \text{ in } px \\ xx - 2yx + yy \text{ in } qx \\ xx - 2yx + yy \text{ in } r \end{array} \right\} = 0$$

S s s 2

in

in qua etiam duæ radices æquales comprehenduntur, videlicet $x \infty y$, ac denuo $x \infty y$. Vel si illam multiplicassemus per $xx + 2yx + yy \infty 0$, obtinuissimus duas falsas radices æquales: utcunque autem hæc multiplicatio fiat, si pro y ponatur ejus valor, habebitur

$$\left. \begin{array}{l} xx - 2xx + xx \text{ in } x^1 \\ xx - 2xx + xx \text{ in } pxx \\ xx - 2xx + xx \text{ in } qx \\ xx - 2xx + xx \text{ in } r \end{array} \right\} \infty 0.$$

Si jam unumquodque horum quatuor productorum, seu, quod eodem redit, $+1, -2, +1$ (quoniam dividi potest per xx , & multiplicatores x^1, pxx, qx , & r nullam mutationem efficiunt) multiplicetur per Arithmeticam Progressionem: erit productum hujus multiplicationis $\infty 0$.

Nam

Mult. $+1, -2, +1$	Mult. $+1, -2, +1$
per $a, a+b, a+2b$	per $a, a-b, a-2b$
fit $a, -2a-2b, +a+2b$	fit $a, -2a+2b, a-2b$
seu $+2a-2a, +2b-2b \infty 0$.	seu $2a-2a, +2b-2b \infty 0$.

Hæc usque universaliter consideravi omnes æquationes, duas æquales radices habentes, quomodocunque ipsæ proponantur, hoc est, sive in iis termini quidam desint sive non, ut & quomodocunque signa $+$ & $-$ sese habuerint. Quod manifestum erit consideranti nobis solummodo rem esse cum hisce numeris $+1, -2, +1$, non autem cum multiplicatoribus x^1, pxx, qx , & r .

Similiter respectu Arithmeticæ Progressionis res etiam generalis manet, quandoquidem duo priores termini $a, a+b$, & $a, a-b$ indeterminati sunt. Quod restat, ex sola inspectione præcedentis exempli, conferendo duas sequentes multiplicationes, perspicuum fiet.

$x^1 + pxx + qx + r \infty 0$	$x^1 + pxx + qx + r \infty 0$
$xx - 2xx + xx \infty 0$	$xx - 2yx + yy \infty 0$
$xx - 2xx + xx \text{ in } x^1$	$x^1 - 2yx^2 + yyx^1$
$xx - 2xx + xx \text{ in } pxx$	$+ px^4 - 2pyx^3 + ppyxx$
$xx - 2xx + xx \text{ in } qx$	$+ qx^3 - 2qyx^2 + qyyx$
$xx - 2xx + xx \text{ in } r$	$+ rxx - 2ryx + ryy$
$\left. \begin{array}{l} \text{Mult. per } a. a \quad 8 \quad b. a \quad 8 \quad 2b. a \quad 8 \quad 3b. a \quad 8 \quad 4b. a \quad 8 \quad 5b. \end{array} \right\} \infty 0.$	$\left. \begin{array}{l} \text{Mult. per } a. a \quad 8 \quad b. a \quad 8 \quad 2b. a \quad 8 \quad 3b. a \quad 8 \quad 4b. a \quad 8 \quad 5b. \end{array} \right\} \infty 0.$

Nam

Nam quoniam hæc producta $x^5 - 2yx^4 + yyx^3$, & $xx - 2xx + xx$ in x^5 eadem existunt, erit etiam $x^5 - 2yx^4 + yyx^3$ multiplicatum per a, a § b, a § $2b$ æquale 0; sic & quoniam $+px^4 - 2pyx^3 + pyyxx$ idem est quod $xx - 2xx + xx$ in pxx , erit quoque $px^4 - 2pyx^3 + pyyxx$ multiplicatum per a § b, a § $2b, a$ § $3b$ (siquidem, ut ex præcedentibus liquet, primus terminus Progressionis ad libitum sumi potest) æquale 0; atque sic deinceps. Vnde fit, ut etiam Productum totius æquationis per hanc seriem proportionalium sit $\infty 0$, nec non ut unus valor ipsius $x \infty y$, quæ una duarum radicum æqualium est, necessariò includatur. Et cum hic rursus nulla habeatur ratio multitudinis aut paucitatis aut etiam qualitatis multiplicatorum: erit Propositum Theorema universaliter demonstratum de quibuscunque æquationibus, duas radices æquales habentibus.

Hinc emanat

Si in æquatione aliqua 3 sint radices æquales, & ipsa multiplicetur per Arithmeticam Progressionem, quam libuerit, eo modo quo jam dictum est, remanebunt in Producto duæ adhuc æquales radices istarum trium; ac proinde Productum hoc denuo per Arithmeticam Progressionem multiplicari poterit. Quod si autem in Proposita æquatione quatuor radices æquales fuerint, atque ipsa multiplicetur per Arithmeticam Progressionem, relinquentur in hoc Producto adhuc 3 æquales radices istarum 4, & sic porro, quocunque æquales radices æquatio habuerit, semper per singulas ejusmodi multiplicationes una tantum istarum æqualium radicum tollitur.

Hoc itaque demonstrato, transco ad meam Methodum de Maximis & Minimis, quæ sic se habet:

Positis quocunque quantitibus Algebraicis, maximum aut minimum designantibus, ponantur ipsæ ∞z ; & ordinatæ æquatione multiplicetur ea per Progressionem Arithmeticam, eo modo, quo dictum est: & Pro-

Sss 3 ductum

ductum erit æquatio, quæ communem cum præcedenti radicem habebit.

Ita ut ad hujus Methodi demonstrationem tantummodo probandum restet, æquationem illam primam duas æquales radices comprehendere. Quod equidem demonstratu adeò facile est, ut huic rei ulterius insistere nihil aliud sit, quàm operam & oleum perdere.

Et hæc quidem generalis mea Methodus est. Particulares vero, quas antehac in aliquibus exemplis vidisti, hinc resultant. quemadmodum ex subjunctis operationibus, utroque modo factis, perspicere licebit.

1. Cum Algebraïci termini, maximum aut minimum designantes, non nisi unam incognitam quantitatem continent, & nullas habent fractiones, in quarum denominatore incognita quantitas reperitur, multiplico tantum unumquemque terminum per numerum dimensionum incognitæ quantitatis, neglectis quantitativis omnibus, in quibus incognita non reperitur, & suppono Productum ∞ o.

Ex.gr. fit $3ax^3 - bx^3 - \frac{2bba}{3c}x + aab \infty$ alicui maximo.

mult. per $\frac{3}{3} \quad \frac{3}{3} \quad \frac{1}{1}$
fit $9ax^3 - 3bx^3 - \frac{2bba}{3c}x \infty o$, vel $9axx - 3bxx - \frac{2bba}{3c} \infty o$.

Iuxta generalem Methodum erit

$$3ax^3 - bx^3 - \frac{2bba}{3c}x + aab \infty o.$$

mult. per Arithm. Progr. $\frac{3. \quad 3.2. \quad 1. \quad 0.}{-2}$

& fit, ut ante, $9ax^3 - 3bx^3 - \frac{2bba}{3c}x \infty o$, seu

$$9axx - 3bxx - \frac{2bba}{3c} \infty o.$$

2. Si Algebraïci termini, maximum aut minimum designantes, unam tantum incognitam quantitatem comprehendunt, atque aliquot fractiones admittunt, in quarum denominatore incognita quantitas reperitur, operatio institui poterit, hoc pacto:

Primò deleo omnes quantitates cognitæ. Deinde si reliquæ quan-

quantitates non ejusdem denominationis fuerint, ipsas sub eundem denominatorem reduco. Quo peracto, considero hujus fractionis integrum Numeratorem cum unoquoque Membro seu parte separata Denominatoris (si ex diversis partibus constet) tanquam unam quantitatem, Maximum aut Minimum designantem, ac unumquodque membrum seu partem separatam Numeratoris multiplico per dimensionum numerum quantitatis incognitæ istius Membri, postquam ab eodem numero est ablatus dimensionum numerus incognitæ quantitatis, qui in hoc Membro Denominatoris reperitur; productoque per hoc Membrum Denominatoris multiplicato, erunt omnia ejusmodi producta simul $\infty 0$, ut ex sequentibus exemplis clariùs patebit.

1 Exemplum.

Esto $\frac{4aab^3 + 5a^3x + x^5}{x^3} - ax + bx + ab \infty$ alicui maximo.

Deletâ quantitate cognitâ ab , reliquisque terminis sub comuni Denominatore reductis, obtinebitur

$$\frac{4aab^3 + 5a^3x + x^5 - ax^4 + bx^4}{x^3}$$

Mult. num. per $-3, -2, +2, +1, +1$:

$$\text{fit } -12aab^3 - 10a^3x + 2x^5 - ax^4 + bx^4 \text{ mult. per } x^3 \infty 0.$$

&c, dividendo per x^3 ,

$$-12aab^3 - 10a^3x + 2x^5 - ax^4 + bx^4 \infty 0.$$

Iuxta generalem Methodum

$$\text{est } \frac{4aab^3 + 5a^3x + x^5}{x^3} - ax + bx + ab \infty 0,$$

$$\text{id est, } \frac{4aab^3 + 5a^3x + x^5 - ax^4 + bx^4 + abx^3 \infty 0}{-2}$$

Seu, ordinatâ æquatione, $x^5 - ax^4 + abx^3 + 5a^3x + 4aab^3 \infty 0$.

$$\begin{array}{r} +b^3 - 2 \\ +2, +1, \quad 0, -1, -2, -3 \\ \hline 2x^5 - ax^4 \quad * \quad * - 10a^3x - 12aab^3 \infty 0. \\ +b^3 \end{array}$$

2 Exemplum.

Esto $\frac{baax + aaxx - bx, -x}{baa + x} - a + x \infty$ alicui maximo,

De-

Deletâ quantitate cognitâ, & reliquis sub communi divifore
reductis, habebitur $\frac{2baax + aaxx - bx^3}{baa + x^3}$.

Porro pro $\frac{+1, +2, +3}{2baax + aaxx - bx^3}$, scribo $2baax + 2aaxx - 3bx^3$ in baa
 $-2, -1, 0$
 pro $\frac{2baax + aaxx - bx^3}{x^3}$, scribo $-4baax - aaxx$ in x^3 } ∞

Divifis per aax , habebitur $\frac{2baa + 2aax - 3bxx \text{ in } b}{-4bx - xx \text{ in } xx}$ } ∞
 adeoque $-x^4 - 4bx^3 - 3bbxx + 2aabx + 2bbaa \infty$.

Sic & si fuerit $\frac{2baax + aaxx - bx^3 + a^4}{4x^3 + 2bxx - 3aax - c^3} \infty$ alicui maximo,

pro $\frac{-2, -1, 0, -3}{2baax + aaxx - bx^3 + a^4}$, scribo $-4baax - aaxx - 3a^4$ in $4x^3$ }
 $-1, 0, +1, -2$
 pro $\frac{2baax + aaxx - bx^3 + a^4}{2bxx}$, $-2baax - bx^3 - 2a^4$ in $2bxx$ } ∞
 $0, +1, +2, -1$
 pro $\frac{2baax + aaxx - bx^3 + a^4}{-3aax}$, $+aaxx - 2bx^3 - a^4$ in $-3aax$ }
 $1, 2, 3, 0$
 pro $\frac{2baax + aaxx - bx^3 + a^4}{-c^3}$, $+2baax + 2aaxx - 3bx^3$ in $-c^3$ }

Iuxta generalem Methodum

est $\frac{2baax + aaxx - bx^3}{baa + x^3} \infty z$

vel $\frac{2baax + aaxx - bx^3}{baa + x^3} \infty baa + x^3 z$

feu $\frac{-bx^3 + aaxx + 2baax - baa z}{-z} \infty 0$

Arith. Prog. $\frac{3}{-3bx^3 + 2aaxx + 2baax} \infty 0$, hoc est,
 $\frac{-3bx^3 + 2aaxx + 2baax}{3x^3} \infty z$

ac proinde $\frac{2baax + aaxx - bx^3}{baa + x^3} \infty \frac{+2baax + 2aaxx - 3bx^3}{3x^3}$

& ut supra, $x^4 + 4bx^3 + 3bbxx - 2aabx - 2bbaa \infty 0$.

Patet

Patet itaque, duas has speciales Regulas in generali illa Methodo esse fundatas respectu hujus Progressionis 0, 1, 2, 3, 4, &c. multiplicando scilicet terminum, in quo incognita quantitas x non reperitur per 0; ubi x unam habet dimensionem per 1; & sic porro. Sed in genere notandum, quòd, dum operando juxta generalem Methodum Progressionem illam Arithmeticam ad libitum sumere licet, semper is terminus æquationis, quem libuerit, tolli possit, multiplicando illum tantum per 0. Atque ita valor ipsius z per unam Progressionem simplicius obtineri poterit, quàm per aliam: ut, si in præcedenti exemplo, ubi multiplicavimus per 3, 2, 1, 0, multiplicassemus per 0, 1, 2, 3, obtinuissemus $aaxx + 4baax - 3baaz \propto 0$, seu $\frac{xx + 4bx}{3b} \propto z$.

Vnde apparet, ipsam quantitatem z (sive maximum vel minimum), si x cognita supponatur, inveniri atque exprimi posse multis diversis modis, è quibus faciliores pro Constructione eligere licebit: Aut si z cognita supponatur, poterit x totidem diversis modis inveniri. Porro considerando z & x , ut incognitas, poterimus ad alterutram tollendam æquationem instituere inter duos ex simplicissimis valores: ut, in superiori exemplo, inter $z \propto \frac{3bxx + 2aax + 2baa}{3xx}$ & $z \propto \frac{xx + 4bx}{3b}$.

3. Si termini Algebraïci, Maximum aut Minimum designantes, plures unâ quantitate incognitâ includunt, suppono ipsos $\propto z$; & per hanc æquationem & per cæteras datas, seu quæ ex natura Problematis manant, (quæque semper simul, si omnes Problematis conditiones includunt, tot numero existunt, quot incognitæ quantitates, unâ exceptâ, habentur, nimirum si unum tantum Maximum aut Minimum inter infinitas magnitudines quæritur, non autem inter infinita Maxima;) reduco æquationes omnes ad unam, in qua necessariò duæ quantitates incognitæ continebuntur, & inter eas z . Cumque tunc sola z ad Maximi vel Minimi inventionem nota esse debeat, manifestum est in eum finem duntaxat concipiendum esse; alteram quantitatem incognitam duas æquales radices habere.

Sumamus, exempli gratiâ, tres æquationes, quibus maximam latitudinem curvæ determinavi, quales illæ pag. 498 Exercitationum tuarum Mathematicarum reperiuntur; excepto tantum

T t

quòd

514 IOHANNIS HVDDENII EPIST. II.

quòd Maximum hîc appellem z , & quod ibi z nominatum est, hîc appellem v .

$$1^{\text{ma}} \text{Æq. } y^3 - nyx + x^3 \infty 0$$

$$2^{\text{da}} \text{Æq. } v - x \infty y$$

$$3^{\text{tia}} \text{Æq. } \frac{1}{2}v - y \infty z \text{ maximo.}$$

Substituto valore ipsius y 2^{da} æquationis in locum ipsius y 1^{ma} & 3^{tia} , habebitur

$$\text{pro } 1^{\text{ma}} \text{Æq. } v^3 - 3vvx + 3vxx \infty vnx - nxx$$

$$\& \text{pro } 3^{\text{tia}} \text{Æq. } x \infty z + \frac{1}{2}v.$$

Subrogato autem valore ipsius x 3^{tia} æquationis in ejusdem locum in 1^{ma} , fiet pro

$$1^{\text{ma}} \text{Æq. } \frac{1}{4}v^3 + 3vzz \infty \frac{1}{2}nvv - nzz$$

$$\text{vel } \frac{1}{4}v^3 - \frac{1}{4}nvv + 3zzv + nzz \infty 0.$$

Atque hæc quidem æquatio jam sola relicta est, in qua igitur ut ultimæ conditioni Problematis satisfiat, hoc est, ut ea ita determinetur, ut z fiat Maximum, multiplico (quemadmodum ibi factum fuit) eandem æquationem

$$\frac{1}{4}v^3 - \frac{1}{4}nvv + 3zzv + nzz \infty 0$$

per Arith. Prog. $\begin{array}{cccc} 3, & 2, & 1, & 0; \\ \hline \text{obtineoque } \frac{1}{4}v^3 - \frac{1}{2}nvv + 3zzv & * & \infty 0 \\ \hline \text{vel } 3zz \infty \frac{1}{2}nv - \frac{1}{4}vv. \end{array}$

Hinc subrogato valore ipsius z , per hanc æquationem invento, in ejus locum in præcedenti $\frac{1}{4}v^3 - \frac{1}{4}nvv + 3zzv + nzz \infty 0$, obtinebitur $\frac{1}{4}v^3 - \frac{1}{2}nvv + \frac{1}{2}nvv - \frac{3}{4}v^3 + \frac{1}{2}nnv - \frac{1}{2}nvv \infty 0$

$$\text{hoc est, } -\frac{1}{2}v^3 + \frac{1}{2}nnv \infty 0$$

$$\text{vel } vv \infty \frac{1}{2}nn.$$

Si Arithmetica Progressio fuisset 0, 1, 2, 3, invenissemus

$$3zz \infty \frac{nnv}{8v+4n}; \text{ si } 2, 1, 0, -1, \text{ habuissimus } 3zz \infty \frac{\frac{3}{2}v^3 - \frac{3}{2}vv n}{n}$$

Et siue valor ipsius z , per utramlibet harum æquationum inventus, in præcedenti subrogetur æquatione $\frac{1}{4}v^3 - \frac{1}{4}nvv + 3zzv + nzz \infty 0$, siue alter alteri adæquetur, ponendo $\frac{1}{2}nv - \frac{3}{4}vv \infty \frac{nnv}{8v+4n}$, vel $\infty \frac{\frac{3}{2}v^3 - \frac{3}{2}vv n}{n}$, obtinebitur semper $vv \infty \frac{1}{2}nn$.

Quamvis autem operationes uno aut alio modo factæ hîc parum inter

inter se differant, potest tamen sæpe numero, ut supra monui, contingere, ut una multo prolixior ac difficilior sit quàm alia, quo quidem casu commodiorem viam, quæ faciliè perspicitur, eligere satius erit.

Cæterùm notandum, ultimam hanc æquationem $\frac{1}{4}v^3 + 3vz - \infty \frac{1}{4}nvv - nz$ determinari etiam posse per secundum modum præcedentem. Etenim existente $z \propto \frac{\frac{1}{4}nvv - \frac{1}{4}v^3}{3v + n}$, & $z \propto$ maximo: erit etiam hic valor ipsius z omnium maximus, ideoque

$$\begin{aligned} \text{div. per } vv. \quad & \frac{\frac{1}{4}nvv - \frac{1}{4}v^3 \text{ in } 3v}{\frac{1}{4}nvv - \frac{1}{4}v^3 \text{ in } n} \} \infty 0 \\ & \text{vel } \frac{\frac{1}{4}n - \frac{1}{4}v \text{ in } 3v}{\frac{1}{4}n - \frac{1}{4}v \text{ in } n} \} \infty 0, \text{ id est, } \frac{\frac{3}{4}nv - \frac{1}{4}vv}{\frac{1}{4}nn - \frac{1}{4}nv} \} \infty 0 \\ & \text{vel } \frac{\frac{1}{4}nn - \frac{1}{4}vv}{\frac{1}{4}nn - \frac{1}{4}vv} \infty 0 \\ & \text{scu } \frac{1}{4}nn \infty vv. \end{aligned}$$

Quoniam verò in multis casibus æquatio ultimò relicta non finit ut valor ipsius z vel z , aut z^3 , &c. in ejusmodi terminis, in quibus ipse z non invenitur, exprimi possit, visum fuit in exempli hujus operatione generalem Methodum indicare.

Atque hîc, Vir Amicissime, multa adhuc dicenda restarent, sed ne rursus epistola mea voluminis instar se extendat, scriptio- nis meæ filum abrumpam; præsertim cum id, quod hîc desidera- tur, non difficile sit ex præcedentibus colligere. At verò ne te lateat, quid hîc desiderari putem, adjungam argumentum tra- ctatus, quem de hac materia ante 2 aut 3 annos in proprios usus adornavi, quemque nuper obiter & quasi per transennam inspe- xisti. In eo autem pertractantur

1. *Methodus de Maximis & Minimis.* Termini verò Algebraici, Maximum vel Minimum designantes, considerantur

1. *Vel respectu cognitionis nostræ, sic ut certi sumus in iis Maximum esse comprehensum, si aliquod detur Maximum; aut Minimum, si aliquod Minimum detur.*

Termini autem hi Algebraici in se continent

Vel unam duntaxat incognitam quantitatem, habentem

1. *Vel fractionem nullam, in cujus Denominatore incognita reperitur quantitas.*
2. *Vel fractiones, in quarum Denominator ipsa reperitur.*

Vel plures unâ incognitâ quantitate, quæ duplices sunt

1. *Vel tot simul cum iis æquationes dantur, seu in natura Problematis includuntur, quot sunt incognitæ quantitates una exceptâ;*
2. *Vel non totidem, aut etiam nullæ.*
2. *Vel respectu nostræ inscientiæ, id est, cum incerti sumus, utrum in iis aliquod Maximum aut Minimum, aut utrumque, aut etiam neutrum contineatur, ipsos autem rursus considero vel absolutè, vel relativè ad aliquod Problema.*
2. *Ejusdem usus atque utilitas, quæ quidem se longè lateque extendit, ac præsertim ad ea Problemata, quæ aliàs difficulter ad æquationem revocari possunt. Cujus exemplum illustre est Determinatio omnium æquationum, quæ res ad eò generalis atque utilis, hujus Methodi tantum corollarium existit.*

Vale, Vir Amicissime, & me amare perge.

Dabam Amstelædami
6 Cal. Februarii.
1658.

Tui

Observantissimum

IOHANNEM HVDD.

F I N I S.

517

HENRICI van HEVRAET
EPISTOLA
DE
TRANSMUTATIONE
CURVARVM LINEARVM
IN RECTAS.

Clavissimo Viro

D. FRANCISCO à'SCHOOTEN
HENRICVS van HEVRAET
S. D.

C*um nuperrimè ex tuis ad me datis, Vir Clarissime, intellexerim, desiderio te teneri videnti Methodum à me inventam, cujus beneficio complures curvæ lineæ (ut tibi indicavit D. Huddenius) in rectas possunt transmutari: non omit-
tendum duxi, quin eandem tibi ocys transmitterem, tuo-
que imprimis iudicio exponerem. Verùm pramonere te
volui, eam à me tunc temporis excogitatam esse, cùm iter
in Galliam meditarer, quo nec omnia, quæ ea de re dici-
queunt, perpendere, nec quæ ante discessum inveneram,
chartis committere valui. In Gallia verò nunquam rebus
Mathematicis vacare, sed me totum aliis studiis applica-
re constitui, adè ut vix quicquam prælo dignum me scri-
bere posse confidam. Attamen ut petitioni tuæ utcunque
satisfaciam, habitâ ratione temporis, quod mihi valde ca-
rum est: visum fuit in memoriam revocare, ac breviter
conscribere, quæ ante circa hanc rem meditatus sum, ea-
que paucis hic subjicere. Quæ, si Mathematicis non dis-
splicitura iudices, Commentariis tuis adjungere poteris:*


Dat. Salmurii, die 13
Ianuarii. A. 1659.

Huddenius voster te
salutat diligenter.

*Vale, & perge amare
ex asse tuum*

HENRICVM van HEVRAET.
Ttt 3 Si

Si dentur duæ lineæ curvæ, exempli gratia, $ABCDE$, $GHIKL$, & recta AF , ejus naturæ, ut, (ductâ ex puncto M , in linea AF pro libitu assumpto, perpendiculari MI , secante datas curvas in C & I , uti & CQ perpendiculari ad curvam $ABCDE$,) MC sit ad CQ , sicut linea aliqua data Σ ad MI : erit superficies $AGHIKLF$ æqualis rectangulo comprehenso sub data linea Σ & alia recta æquali curvæ $ABCDE$.



Dividatur linea
 AF in partes quot-
 cunque, verbi gra-
 tiâ, in punctis O ,
 M , & P , ducantur-
 que perpendicula-
 res OH , MI , & PK ,
 secantes curvam
 $ABCDE$ in pun-
 ctis B , C , & D , at
 curvam $GHIKL$ in punctis H , I , &
 K ; & per puncta
 A , B , C , D , & E
 agantur tangentes,
 quæ sibi mutuo oc-
 currant in R , S , T ,
 & V ; & per hæc
 puncta ducantur lin-
 eæ Ra , Yb , Zc ,
 & perpendiculares
 ipsi AF ; & per
 puncta G , H , I , K ,
 & L agantur lineæ
 ipsi AF parallelæ,
 secantes Ra in f &
 a , Yb in g & b , Zc
 in

in b & c , e & d in i & d ; denique ex S ducatur SX parallela lineæ AF , producaturre tangens TS usque in N .

Propter rectum angulum NCQ , erit CM ad CQ , ut MN ad NC . Atqui MN est ad NC , ut SX ad ST . Quare erit SX ad ST , ut CM ad CQ . Et quia CM est ad CQ , ut Σ ad MI , erit & SX ad ST , ut Σ ad MI , ac proinde rectangulum sub SX five YZ & MI five Yb æquale rectangulo sub ST & Σ . Eodem modo demonstrabitur, rectangulum ce esse æquale \square^{10} sub TV & Σ , & $\square^{10} dF \propto \square^{10} VE$, Σ , & $\square^{10} aY \propto \square^{10}$ sub RS & Σ . Quapropter omnia hæc rectangula simul sumpta æqualia erunt rectangulo sub Σ & alia recta æqualia omnibus tangentibus simul sumptis. Vnde cum illud verum sit, quocunque rectangula atque tangentes extiterint, & figura ex parallelogrammis constans, si eorum numerus in infinitum augeatur, desinat in superficiem $AGHIKLF$, ac tangentes similiter in lineam curvam $ABCDE$, liquet superficiem $AGHIKLF$ æqualem esse rectangulo sub Σ & recta æquali curvæ $ABCDE$. Quod erat demonstrandum.

Quomodo autem hinc longitudo datæ curvæ lineæ investigari possit, sequentibus exemplis patebit.

Sit primò curva $ABCDE$ ejus naturæ, ut, sumpto in linea AF prohibitu puncto M , ductâque perpendiculari MC , si AM vocetur x , & MC vocetur y , semper yy sit $\propto \frac{x^3}{a}$. Deinde positus $AQ \propto f$, $CQ \propto v$, & $MI \propto z$: erit $QM \propto f - x$, & ejus quadratum $\propto ff - 2fx + xx$. Cui si addatur quadratum ex MC , hoc est, yy five $\frac{x^3}{a}$, inveniatur $ff - 2fx + xx + \frac{x^3}{a} \propto vv$.

Propter duas æquales radices mult. juxta meth. Huddenii per $\frac{0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 0}{\quad}$,
& inveniatur $-2fx + 2xx + \frac{3x^3}{a} \propto 0$.

Vnde AQ five $f \propto x + \frac{3x^3}{1a}$. à qua si subtrahatur $AM \propto x$, remanebit $MQ \propto \frac{3x^3}{1a}$, cujus quadratum est $\frac{9x^6}{4a^2}$. cui adde $\square^{10} CM$ seu $\frac{x^3}{a}$, & proveniet $\square^{10} CQ \propto \frac{9x^6}{4a^2} + \frac{x^3}{a}$. Erit jam ut $CM \sqrt{\frac{9x^6}{4a^2} + \frac{x^3}{a}}$ ad $CQ \sqrt{\frac{9x^6}{4a^2} + \frac{x^3}{a}}$, ita cognita aliqua linea, puta $\frac{1}{2}a$, (licet enim

enim eam pro libitu assumere) ad $MI \propto z$, eritque $z \propto \sqrt{\frac{1}{4}ax + \frac{1}{4}aa}$. Id quod arguit, lineam $GHIKL$ esse Parabolam, cujus vertex est in Δ , existente $A \Delta \propto \frac{1}{2}a$, & latere recto $\propto \frac{1}{2}a$. ac proinde longitudo lineæ curvæ $ABCDE$ est $\sqrt{\frac{1}{2}a} - \frac{1}{2}a$, existente $\Delta F \propto v$.

Similiter si loco $y \propto \frac{x^3}{a}$ ponatur hæc æquatio $y^4 \propto \frac{x^7}{a}$, aut $y^6 \propto \frac{x^7}{a}$, atq; $y^8 \propto \frac{x^9}{a}$, atque sic porro in infinitum: invenietur semper superficies $AGHIKLF$ ejus naturæ ut quadrari possit, ac proinde omnes hæ curvæ in rectam sunt permutabiles.

Si verò $ABCDE$ sit Parabola, cujus axis AG , & latus rectum $\propto a$: invenietur $MQ \propto \frac{2x^3}{a^2}$, & ejus quadratum $\propto \frac{4x^6}{a^4}$. cui adde quadratum CM , & habebitur $\frac{4x^6}{a^4} + \frac{x^4}{a^2}$ pro $\square CQ$. Hinc ut $CM \frac{xx}{a}$ ad $CQ \sqrt{\frac{4x^6}{a^4} + \frac{x^4}{a^2}}$, sic cognita aliqua linea, puta a , ad $MI \propto z$: eritque $z \propto \sqrt{4xx + aa}$, & linea $GHIKL$ Hyperbola, cujus axis linea AG , centrum punctum A , latus rectum $\propto \frac{1}{2}a$, & transversum $\propto 2a$.

Quod ipsum docet, longitudinem curvæ Parabolicæ inveniri non posse, quin simul inveniatur quadratura Hyperbolæ, & vice versâ.

F I N I S.

XXXIII

F

48



